

Chapter-7

साम्यावस्था

(Equilibrium)

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 7.1. एक द्रव को सीलबन्द पात्र में निश्चित ताप पर इसके वाष्प के साथ साम्य में रखा जाता है। पात्र का आयतन अचानक बढ़ा दिया जाता है।

(क) वाष्प-दाब परिवर्तन का प्रारम्भिक परिणाम क्या होगा?

(ख) प्रारम्भ में वाष्पन एवं संघनन की दर कैसे बदलती है?



(ग) क्या होगा, जबकि साम्य पुनः अन्तिम रूप से स्थापित हो जाएगा, तब अन्तिम वाष्प दाब क्या होगा?

उत्तर—(क) पात्र का आयतन बढ़ाने से द्रव के घरातल का वाष्प दाब कम होगा।

(ख) अचानक पात्र का आयतन बढ़ाने से प्रारम्भिक वाष्प दर स्थिर रहेगी; क्योंकि पात्र का आयतन बढ़ता है, संघनन दर घटती है।

(ग) साम्यावास्था पर वाष्पन दर संघनन दर के बराबर होती है, प्रारम्भिक दाब में अन्तिम वाष्प दाब समान होगा।

प्रश्न 7.2. निम्न साम्य के लिए K_c क्या होगा, यदि साम्य पर प्रत्येक पदार्थ की सान्द्रताएँ $[\text{SO}_2] = 0.6 \text{ M}$, $[\text{O}_2] = 0.82 \text{ M}$ एवं $[\text{SO}_3] = 1.90 \text{ M}$



$$\therefore K_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]} = \frac{[1.90]^2}{[0.6]^2[0.82]} = \frac{3.61}{0.2952} = 12.229$$

अतः K_c का मान = 12.229

उत्तर

प्रश्न 7.3. एक निश्चित ताप एवं कुल दाब 10^5 Pa पर आयोडीन वाष्प में आयतानुसार 40% आयोडीन परमाणु होते हैं।



साम्य के लिए K_p की गणना कीजिए।



$$\text{कुल दाब} = 10^5 \text{ Pa}$$

तथा क्योंकि कुल आयतन का 40% आयोडीन परमाणु होते हैं।

$\therefore 60\% \text{ I}_2$ अणु हैं।

\therefore I के लिए आंशिक दाब = $\frac{40}{100} \times 10^5 \text{ Pa}$






तथा I_2 का आंशिक दाब = $\frac{60}{100} \times 10^5 \text{ Pa}$

$$\therefore K_p = \frac{(P_I)^2}{P_{\text{I}_2}} = \frac{\left(\frac{40}{100} \times 10^5\right)^2}{\left(\frac{60}{100} \times 10^5\right)} = \frac{16 \times 10^8}{6 \times 10^4} = 267 \times 10^4$$

अतः K_p का मान = 2.67×10^4

उत्तर

प्रश्न 7.4. निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K_c का व्यंजक लिखिए।



$$\text{उत्तर—(i) } K_c = \frac{[\text{NO}]^2 [\text{Cl}_2]}{[\text{NOCl}]^2}$$


$$\text{(ii) } K_c = \frac{[\text{CuO}]^2 [\text{NO}_2]^4 [\text{O}_2]}{[\text{Cu}(\text{NO}_3)_2]^2}$$

$$\text{(iii) } K_c = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]}{[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5][\text{H}_2\text{O}]}$$

$$\text{(iv) } K_c = \frac{[\text{Fe}(\text{OH})_3][\text{O}_2]}{[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3}$$

$$\text{(v) } K_c = \frac{[\text{IF}_5]^2}{[\text{I}_2][\text{F}_2]^5}$$

प्रश्न 7.5. K_p के मान से निम्नलिखित में से प्रत्येक साम्य के लिए K_c का मान ज्ञात कीजिए—



$$500 \text{ K ताप पर, } K_p = 1.8 \times 10^{-2}$$

$$\Delta n = [2 + 1] - 2 = 1$$

तथा $R = 0.0821 \text{ atm/K mol}$


$$K_p = K_c \times (RT)^{\Delta n}$$

या $1.8 \times 10^{-2} = K_c \times (RT)^1$

या $K_c = \frac{1.8 \times 10^{-2}}{0.0821 \times 500} = \frac{1.8 \times 10^{-4}}{0.4105} = 4.38 \times 10^{-4}$

अतः K_c का अभीष्ट मान = 4.38×10^{-4}

उत्तर



$$K_p = 167, 1073 \text{ K ताप}$$

$$\Delta n = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore K_c &= \frac{K_p}{RT} \\ &= \frac{167}{0.0821 \times 1073} = \frac{167}{88.09} = 1.90 \end{aligned}$$

अतः K_c का अभीष्ट मान = 1.90

उत्तर


प्रश्न 7.6. साम्य $\text{NO}(g) + \text{O}_3(g) \rightleftharpoons \text{NO}_2(g) + \text{O}_2(g)$ के लिए 1000 K पर $K_c = 6.3 \times 10^{14}$ है। साम्य में अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाएँ प्राथमिक रूप से द्विअणुक हैं। प्रतीप अभिक्रिया के लिए K_c क्या है?

हल : 1000 K ताप पर, $K_c = 6.3 \times 10^{14}$



या $K_c = \frac{[\text{NO}_2][\text{O}_2]}{[\text{NO}][\text{O}_3]} = 6.3 \times 10^{14}$

उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए,



$$\therefore K_c = \frac{[\text{NO}][\text{O}_3]}{[\text{NO}_2][\text{O}_2]} = \frac{1}{K_c} = \frac{1}{6.3 \times 10^{14}}$$

$$= 1.59 \times 10^{-15}$$

अतः प्रतीप अभिक्रिया के लिए $K_c = 1.59 \times 10^{-15}$

उत्तर

प्रश्न 7.7. साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय समझाइए कि शुद्ध द्रवों एवं ठोसों को उपेक्षित क्यों किया जा सकता है?


उत्तर—शुद्ध ठोस के लिए क्रिया द्रव्यमान स्थिर होता है। यदि शुद्ध द्रव अधिक मात्रा में है, तब इसका क्रिया द्रव्यमान भी स्थिर होगा। इस प्रकार, दोनों कारणों से क्रिया द्रव्यमान एक लिया जाता है।

$$\begin{aligned} \text{शुद्ध ठोस} &= 1 \text{ तथा शुद्ध द्रव्य} = 1 \\ \text{मोलर सान्द्रता} &= \frac{\text{पदार्थ के मोल}}{\text{पदार्थ का आयतन}} \\ &= \frac{\text{पदार्थ का द्रव्यमान}}{\text{पदार्थ का आयतन}} \times \frac{1}{\text{आण्विक द्रव्यमान}} \\ &= \frac{\text{पदार्थ का घनत्व}}{\text{आण्विक द्रव्यमान}} \end{aligned}$$

स्थिर ताप पर पदार्थ का घनत्व स्थिर रहता है और पदार्थ का आण्विक द्रव्यमान स्थिर रहता है।


अतः मोलर सान्द्रता स्थिर कहती है।

प्रश्न 7.8. N_2 एवं O_2 के मध्य निम्नलिखित अभिक्रिया होती है :



यदि एक 10 L के पात्र में 0.482 मोल N_2 एवं 0.933 मोल O_2 रखे जाएँ तथा एक ताप, जिस पर N_2O बनने दिया जाए, तो साम्य मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए, $K_c = 2.0 \times 10^{-37}$ ।

उत्तर—दी गई अभिक्रिया :



प्रारम्भिक सान्द्रता 0.482 mol 0.933 mol 0

साम्य पर सान्द्रता 0.482 - x 0.933 - $\frac{x}{2}$

जहाँ x मोल संख्या N_2 के लिए एवं $\frac{x}{2}$ मोल संख्या O_2 के लिए

$$\text{आण्विक सान्द्रता} = \frac{0.482 - x}{10} = \frac{0.933 - \frac{x}{2}}{10} = \frac{x}{10}$$

क्योंकि $K_c = 2.0 \times 10^{-37}$ का मान कम है। इसका अर्थ N_2 एवं O_2 के लिए x का मान कम है।

अतः साम्यावस्था में $[N_2] = 0.0482 \text{ mol/L}$

$$[O_2] = 0.0933 \text{ mol/L}, [N_2O] = 0.1x$$

$$K_c = \frac{(0.1x)^2}{(0.0482)^2 (0.0933)} = 2.0 \times 10^{-37}$$

या
$$\frac{0.01x^2}{2.17 \times 10^8 \times 10^{-12}} = 2.0 \times 10^{-37}$$

या
$$x^2 = \frac{2.17 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-37}}{1 \times 10^{-2}}$$

या
$$x^2 = 4.34 \times 10^{-41}$$


या
$$x^2 = 43.4 \times 10^{-40}$$

$$x = 6.6 \times 10^{-20}$$


अतः $[N_xO] = 0.1x = 6.6 \times 10^{-21} \text{ mol/L}$

अतः $[N_2] = 0.0482 \text{ mol L}^{-1}$, $[O_2] = 0.0933 \text{ mol L}^{-1}$ एवं $[N_2O] = 6.6 \times 10^{-21} \text{ mol L}^{-1}$ उत्तर

प्रश्न 7.9. निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार नाइट्रिक ऑक्साइड Br_2 से अभिक्रिया कर नाइट्रोसिल ब्रोमाइड बनाती है-



जब स्थिर ताप पर एक बन्द पात्र में 0.087 मोल NO एवं 0.0437 मोल Br_2 मिश्रित किए जाते हैं, तब 0.0518 मोल NOBr प्राप्त होती है। NO एवं Br_2 की साम्य मात्रा ज्ञात कीजिए।



प्रारम्भिक सान्द्रता 0.087 0.0437 0

अन्तिम सान्द्रता ? ? 0.0518


∴ $[NO]$ का साम्य मान = $0.087 \text{ mol} - 0.0518 \text{ mol} = 0.0352 \text{ mol}$

तथा $[Br_2]$ का साम्य मान = $0.0437 \text{ mol} - 0.0259 \text{ mol} = 0.0178 \text{ mol}$

अतः NO के 0.0352 mol तथा Br_2 के 0.0178 mol प्राप्त होते हैं। उत्तर

प्रश्न 7.10. साम्य $2SO_2 + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ के लिए 450 K पर $K_p = 2.0 \times 10^{10} \text{ bar}$ है। इस ताप पर K_c का मान ज्ञात कीजिए।

हल : दी गई अभिक्रिया :



$$\Delta n = 2 - [2 + 1] = -1$$

∴ $K_p = K_c \times (RT)^{-1}$

$$K_c = K_p \times (RT) = 2.0 \times 10^{10} \times 0.0831 \times 450 \\ = 7.47 \times 10^{11} \text{ mol L}^{-1}$$

∴ K_c का मान 450 K ताप पर = $7.47 \times 10^{11} \text{ mol L}^{-1}$

अतः 450 K पर K_c का मान = $7.4 \times 10^{11} \text{ mol L}^{-1}$ उत्तर

प्रश्न 7.11. $HI(g)$ का एक नमूना 0.2 atm दाब पर एक फ्लास्क में रखा जाता है। साम्य पर $HI(g)$ का आंशिक दाब 0.04 atm है। यहाँ दिए गए साम्य के लिए K_p का मान क्या होगा?



साम्य पर, $p_{HI} = 0.04$

∴ माना $p_{H_2} = p_{I_2} = x$

∴ $p_{HI} + p_{H_2} + p_{I_2} = 0.2 \text{ atm}$

∴ $0.04 + x + x = 0.2$

या $2x = 0.2 - 0.04 = 0.16$

या $x = 0.08 \text{ atm}$

∴ $p_{H_2} = p_{I_2} = 0.08 \text{ atm}$

$$K_p = \frac{P_{H_2} \times p_{I_2}}{P_{HI}} = \frac{0.08 \times 0.08}{(0.04)^2}$$


$$= \frac{8 \times 8}{4 \times 4}$$

$$= 2 \times 2 = 4$$

अतः K_p का मान = 4

उत्तर

प्रश्न 7.12. 500 K ताप पर एक 20 L पात्र में N_2 के 1.57 मोल, H_2 के 1.92 मोल एवं NH_3 के 8.13 मोल का मिश्रण लिया जाता है। अभिक्रिया $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ के लिए K_c का मान 1.7×10^2 है। क्या अभिक्रिया-मिश्रण साम्य में है? यदि नहीं, तो नेट अभिक्रिया की दिशा क्या होगी?



सान्द्रता भागफल

$$Q_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} = \frac{\left(\frac{8.13}{20}\right)^2}{\frac{1.57}{20} \times \left(\frac{1.92}{20}\right)^3}$$

$$= \frac{\frac{8.13}{20} \times \frac{8.13}{20}}{\frac{1.57}{20} \times \frac{1.92}{20} \times \frac{1.92}{20} \times \frac{1.92}{20}}$$

$$= \frac{8.13 \times 8.13 \times 20 \times 20}{1.57 \times 1.92 \times 1.92 \times 1.92}$$

$$= \frac{264 \times 10^8}{111 \times 10^5}$$

$$= 235 \times 10^3$$

अतः

$$Q_c = 235 \times 10^3 \text{ और } K_c = 1.7 \times 10^2$$

$\therefore Q_c > K_c$ अभिक्रिया मिश्रण साम्य नहीं है।

$\therefore Q_c$ का मान घटकर K_c के बराबर होना चाहिए।

अतः $Q_c = 2.35 \times 10^3$ तथा अभिक्रिया साम्यावस्था में नहीं है।

उत्तर


प्रश्न 7.13. एक गैस अभिक्रिया के लिए

$$K_c = \frac{[NH_3]^4 [O_2]^5}{[NO]^4 [H_2O]^6} \text{ है, तो}$$

इस व्यंजक के लिए सन्तुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

हल : $\therefore NH_3$ और O_2 उत्पाद एवं NO तथा H_2O अभिकारक हैं।

\therefore सन्तुलित अभिक्रिया




उत्तर

प्रश्न 7.14. H_2O का एक मोल एवं CO का एक मोल 725 K ताप पर 10 L के पात्र में लिए जाते हैं। साम्य पर 40% जल (भारतीयक) CO के साथ निम्नलिखित समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करता है-



अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए।



अतः साम्य स्थिरांक = 0.44

उत्तर

प्रश्न 7.15. 700 K ताप पर अभिक्रिया $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ के लिए साम्य स्थिरांक 54.8 है। यदि हमने शुरू में HI (g) लिया हो, 700 K ताप साम्य स्थापित हो तथा साम्य पर 0.5 mol L⁻¹ HI (g) उपस्थित हो, तो साम्य पर $H_2(g)$ एवं $I_2(g)$ की सान्द्रताएँ क्या होंगी?

हल : अभिक्रिया :



∴ अभिक्रिया के लिए, $2HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$

$$K'_c = \frac{1}{K_c} = \frac{1}{54.8}$$

साम्य पर, $[HI] = 0.5 \text{ mol L}^{-1}$

माना $[H_2] = [I_2] = x \text{ mol L}^{-1}$

$$\therefore K_c = \frac{1}{54.8} = \frac{x \times x}{(0.5)^2}$$

या $x^2 = \frac{0.25}{54.8}$


या $x^2 = 0.00456$

∴ $x = 0.068$


∴ $[H_2] = [I_2] = 0.068 \text{ mol L}^{-1}$

उत्तर

प्रश्न 7.16. ICl, जिसकी सान्द्रता प्रारम्भ में 0.78 M है, को यदि साम्य पर आने दिया जाए, तो प्रत्येक की साम्य पर सान्द्रताएँ क्या होंगी?



हल : अभिक्रिया :



प्रारम्भिक सान्द्रता 0.78 M 0 0

साम्य सान्द्रता (0.78 - 2a) a a

$$K_c = \frac{[I_2] \times [Cl_2]}{[ICl]^2}$$

या $0.14 = \frac{a \times a}{(0.78 - 2a)^2}$

सरल करने पर,

$$a = 0.167$$


∴ $[I_2] = [Cl_2] = 0.167 \text{ M}$

तथा $[ICl] = (0.78 - 0.334) \text{ M} = 0.446 \text{ M}$


अतः $[I_2] = [Cl_2] = 0.167 \text{ M}$ तथा $[ICl] = 0.446 \text{ M}$

उत्तर

प्रश्न 7.17. नीचे दर्शाए गए साम्य में 899 K पर K_p का मान 0.04 atm है। C_2H_6 की साम्य पर सान्द्रता क्या होगी, यदि 4.0 atm दाब पर C_2H_6 को एक फ्लास्क में रखा गया है एवं साम्यावस्था पर आने दिया जाता है?



उत्तर—अभिक्रिया :



प्रारम्भिक सान्द्रता

$$4.0 \text{ atm} \quad 0 \quad 0$$

साम्य सान्द्रता

$$(4 - p) \text{ atm} \quad p \text{ atm} \quad p \text{ atm}$$

$$K_p = \frac{P_{C_2H_4} \times P_{H_2}}{P_{C_2H_6}}$$

या $0.04 = \frac{p \times p}{4 - p}$

या $25p^2 + p - 4 = 0$

या $p = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 + 400}}{50}$
 $= \frac{20.024}{50} = 0.4$

∴ C_2H_6 का साम्य सान्द्रता $= (4.0 - 0.4) \text{ atm}$
 $= 3.6 \text{ atm}$

अतः C_2H_6 की साम्य सांद्रता $= 3.6 \text{ atm}$

उत्तर

प्रश्न 7.18. एथेनॉल एवं ऐसीटिक अम्ल की अभिक्रिया से एथिल ऐसीटेट बनाया जाता है एवं साम्य को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है—



(i) यदि अभिक्रिया के लिए सान्द्रता अनुपात (अभिक्रिया-भागफल) Q_c लिखिए।

टिप्पणी : यहाँ पर जल आधिक्य में नहीं है एवं विलयन भी नहीं है।

(ii) यदि 293 K पर 1.00 मोल ऐसीटिक अम्ल एवं 0.18 मोल एथेनॉल प्रारम्भ में लिए जाएँ, तो अन्तिम साम्य मिश्रण में 0.171 मोल एथिल ऐसीटेट है। साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए।

(iii) 0.5 मोल एथेनॉल एवं 1.0 मोल ऐसीटिक अम्ल से प्रारम्भ करते हुए 293 K ताप पर कुछ समय पश्चात् एथिल ऐसीटेट के 0.214 मोल पाए गए, तो क्या साम्य स्थापित हो गया?

हल : (i) अभिक्रिया :



या

$$Q_c = \frac{[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]}$$

उत्तर

(ii) :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = 1.00 \text{ mol}$$

$$[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}] = 0.18 \text{ mol}$$

तथा

$$[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] = 0.171 \text{ mol}$$



$$\begin{array}{ccccccc} 1.00 \text{ मोल} & 0.18 \text{ मोल} & & 0 & & 0 & \end{array}$$

$$1 - 0.171$$

$$0.18 - 0.171$$

$$0.171$$

$$0.171$$

$$= 0.829$$

$$= 0.009$$

$$\frac{0.171}{V}$$

$$\frac{0.171}{V}$$

मोलर सांद्रता

$$\frac{0.829}{V}$$

$$\frac{0.009}{V}$$

$$\frac{0.171}{V} \times \frac{0.171}{V}$$

$$K_c = \frac{\frac{0.171}{V} \times \frac{0.171}{V}}{\frac{0.829}{V} \times \frac{0.009}{V}}$$

या

$$K_c = \frac{0.171 \times 0.171}{0.829 \times 0.009}$$

या

$$K_c = \frac{171 \times 171}{829 \times 9}$$

या

$$K_c = \frac{29241}{7461} = 3.92$$

अतः साम्य स्थिरांक = 3.92

माना अभीष्ट आयतन = V

उत्तर



प्रारम्भिक सांद्रता

$$\frac{10}{V} \text{ M}$$

$$\frac{0.5}{V} \text{ M}$$

$$0$$

$$0$$

कुछ समय पश्चात्

$$\frac{10 - 0.214}{V}$$

$$\frac{0.5 - 0.214}{V}$$

$$\frac{0.214}{V} \text{ M}$$

$$\frac{0.214}{V} \text{ M}$$

$$= \frac{0.786}{V} \text{ M}$$

$$\frac{0.286}{V} \text{ M}$$

$$Q_c = \frac{[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]}$$

$$= \frac{\frac{0.214}{V} \times \frac{0.214}{V}}{\frac{0.786}{V} \times \frac{0.286}{V}}$$

$$= \frac{0.214 \times 0.214}{0.786 \times 0.286}$$

$$= \frac{214 \times 214}{786 \times 286}$$

$$= \frac{214 \times 214}{786 \times 286}$$


$$\begin{aligned}
 &= \frac{45796}{224796} \\
 &= 0.2037 \\
 &= 0.204 \text{ (लगभग)}
 \end{aligned}$$

चूँकि $Q_c < K_c$

अतः साम्य प्राप्त नहीं हुआ।

उत्तर

प्रश्न 7.19. 437 K ताप पर निर्वात में PCl_5 का एक नमूना एक फ्लास्क में लिया गया। साम्य स्थापित होने पर PCl_5 की सान्द्रता $0.5 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$ पाई गई, यदि K_c का मान 8.3×10^{-3} है, तो साम्य पर PCl_3 एवं Cl_2 की सान्द्रताएँ क्या होंगी?



हल : $\text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_5(g)$

माना PCl_3 और Cl_2 की साम्य सान्द्रता = x

क्योंकि PCl_5 का वियोजन PCl_3 और Cl_2 में होता है।

$$\therefore K_c = \frac{[\text{PCl}_3][\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]} = \frac{x \times x}{0.5 \times 10^{-1}}$$

$$\text{या } 8.3 \times 10^{-3} \times 0.5 \times 10^{-1} = x^2$$

$$\text{या } x^2 = 4.15 \times 10^{-4}$$


$$\text{या } x = 2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

$$= 0.02 \text{ mol L}^{-1}$$

अतः PCl_3 और Cl_2 की सान्द्रता क्रमशः = 0.02 mol L^{-1}

उत्तर

प्रश्न 7.20. लौह अयस्क से स्टील बनाते समय जो अभिक्रिया होती है, वह आयरन (II) ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयन है एवं इससे धात्विक लौह एवं CO_2 मिलते हैं।



CO एवं CO_2 के साम्य पर आंशिक दाब क्या होंगे, यदि उनके प्रारम्भिक आंशिक दाब हैं—

$$p_{\text{CO}} = 1.4 \text{ atm एवं } p_{\text{CO}_2} = 0.80 \text{ atm}$$

हल : $\text{FeO}(s) + \text{CO}(g) \rightleftharpoons \text{Fe}(s) + \text{CO}_2(g)$

$$K_p = 0.265 \text{ atm}$$

आरम्भिक सान्द्रता 1.4 atm 0.80 atm 0 0

साम्य सान्द्रता (1.4 + x) (0.80 - x)

$$\therefore K_p = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p_{\text{CO}}}; \text{ क्योकि FeO}(s) \text{ ठोस है।}$$

$$\therefore 0.265 = \frac{0.80 - x}{1.4 + x}$$

$$\text{या } 0.80 - x = 0.265(1.4 + x)$$

$$\text{या } 0.80 - x = 0.371 + 0.265x$$

$$\text{या } 1.265x = 0.429$$

$$\text{अतः } x = 0.339$$

$$\therefore \text{CO का साम्य आंशिक दाब} = 1.4 \text{ atm} + 0.339 \text{ atm} = 1.739 \text{ atm}$$

$$\text{एवं } \text{CO}_2 \text{ का साम्य आंशिक दाब} = 0.80 \text{ atm} - 0.339 \text{ atm} = 0.461 \text{ atm}$$

$$\text{अतः } [p_{\text{CO}}] = 1.739 \text{ atm तथा } [p_{\text{CO}_2}] = 0.461 \text{ atm}$$

उत्तर

प्रश्न 7.21. अभिक्रिया $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ के लिए 500 K ताप पर साम्य स्थिरांक $K_c = 0.061$ है। एक विशेष समय पर मिश्रण का संघटन इस प्रकार है-

$3.0 \text{ mol L}^{-1} N_2$, $2.0 \text{ mol L}^{-1} H_2$ एवं $0.5 \text{ mol L}^{-1} NH_3$ क्या अभिक्रिया साम्य में है? यदि नहीं, तो साम्य स्थापित करने के लिए अभिक्रिया किस दिशा में अग्रसित होगी?

हल : अभिक्रिया : $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

$$Q_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$$

$$= \frac{[0.5]^2}{[3][2]^3}$$

$$= \frac{0.25}{24} = 0.0104$$


अतः K_c का मान 0.061 है, इसलिए $Q_c < K_c$

अभिक्रिया साम्य नहीं है।

अतः अभिक्रिया उत्पाद की ओर अग्रसित होगी।


उत्तर

प्रश्न 7.22. ब्रोमीन मोनोक्लोराइड $BrCl$ विघटित होकर ब्रोमीन एवं क्लोरीन देता है तथा साम्य स्थापित होता है-



इसके लिए 500 K ताप पर $K_c = 32$ है। यदि प्रारम्भ में $BrCl$ की सान्द्रता $3.3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ हो, तो साम्य पर मिश्रण में इसकी सान्द्रता क्या होगी?

हल : अभिक्रिया :



प्रारम्भिक सान्द्रता $3.3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \quad \frac{x}{2}$

साम्य सान्द्रता $(3.3 \times 10^{-3} - x) \quad \frac{x}{2}$

$$\therefore K_c = 32 = \frac{\frac{x}{2} \times \frac{x}{2}}{(3.3 \times 10^{-3} - x)^2} = 32$$

सरल करने पर,


या $x = 3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$

अतः साम्य पर $BrCl$ की सान्द्रता $= 3.3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} - 3.0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = 3.0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$

अतः साम्य पर मिश्रण में सान्द्रता $= 3.0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$


उत्तर

प्रश्न 7.23. 1127 K एवं 1 atm दाब पर CO तथा CO_2 के गैसीय मिश्रण में साम्यावस्था पर ठोस कार्बन में 90.55% (भारतात्मक) CO है।



उपरोक्त ताप पर अभिक्रिया के लिए K_c के मान की गणना कीजिए।

हल : अभिक्रिया :



यदि मिश्रण CO तथा CO_2 का कुल द्रव्यमान 100 g है, तब

$$CO = 90.55 \text{ g तथा } CO_2 = 100 \text{ g} - 90.55 \text{ g} = 9.45 \text{ g}$$

$$\therefore \text{CO की मोल संख्या} = \frac{90.55}{28} = 3.234$$

$$\text{तथा CO}_2 \text{ की मोल संख्या} = \frac{9.45}{44} = 0.215$$

$$\therefore p_{\text{CO}} = \frac{3.234}{3.234 + 0.215} \times 1 \text{ atm} = 0.938 \text{ atm}$$

$$\text{तथा } p_{\text{CO}_2} = \frac{0.215}{3.234 + 0.215} \times 1 \text{ atm} = 0.062 \text{ atm}$$

$$\therefore K_p = \frac{p_{\text{CO}}^2}{p_{\text{CO}_2}} = \frac{(0.938)^2}{0.062} = 14.19$$

$$\text{अब } \Delta n(g) = 2 - 1 = 1$$

$$\therefore K_p = K_c \times RT^{\Delta n(g)}$$


$$\text{जहाँ } R = 0.0821 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} T = 1127 \text{ K}$$

$$\text{या } K_c = \frac{K_p}{RT} = \frac{14.19}{0.0821 \times 1127} = 0.153$$

अतः K_c का मान = 0.153

उत्तर


प्रश्न 7.24. 298 K पर NO एवं O₂ से NO₂ बनती है-



अभिक्रिया के लिए (क) ΔG° एवं (ख) साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए-

$$\Delta_f G^\circ (\text{NO}_2) = 52.0 \text{ kJ/mol}, \Delta_f G^\circ (\text{NO}) = 87.0 \text{ kJ/mol}, \Delta_f G^\circ (\text{O}_2) = 0 \text{ kJ/mol}$$

हल : (क) अभिक्रिया



$$\begin{aligned} \text{अभिक्रिया के लिए, } \Delta G^\circ_f &= \Delta G^\circ + (\text{NO}_2) - \Delta_f G^\circ (\text{NO}) - \frac{1}{2} \Delta G^\circ_f (\text{O}_2) \\ &= (52.0 - 87.0 - 0) \text{ kJ/mol} = -35.0 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

अतः साम्य स्थिरांक $\Delta_f G^\circ = -35.0 \text{ kJ mol}$

$$\text{(ख) } K_c = -\Delta G^\circ = 2303 RT \log K_c$$

$$\text{या } -(-35.0) = 2303 \times 0.008314 \times 298 \log K_c$$

$$\text{या } 35.0 = 5.7058 \log K_c$$

$$\text{या } \log K_c = \frac{35}{5.7058} = 6.134$$

$$\text{या } K_c = \text{Antilog } 6.134$$


$$\text{या } K_c = 1.365 \times 10^6$$

अतः साम्य स्थिरांक = 1.365×10^6

उत्तर


उत्तर

प्रश्न 7.25. निम्नलिखित में से प्रत्येक साम्य में जब आयतन बढ़ाकर दाब कम किया जाता है, तब बतलाइए कि अभिक्रिया के उत्पादों के मोलों की संख्या बढ़ती है या घटती है या समान रहती है?



उत्तर—(क) $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$

चूँकि अभिक्रिया का आयतन घटता है। अतः दाब कम होगा।
साम्य अग्रिय दिशा में अग्रसित होगा, इसलिए PCl_3 और Cl_2 अधिक बनेंगे।






अभिक्रिया का आयतन घटता है, क्योंकि CO_2 गैस अवशोषित होती है। अतः दाब कम होगा और साम्य प्रतीप दिशा में जाएगा, इसलिए उत्पाद के मोल संख्या घटेंगे।



दाब घटने से अधिकारक $\text{Fe}(s)$ और Fe_3O_4 का दाब नहीं घटता है। H_2O एवं H_2 का आयतन समान अनुपात में है।
अतः दाब घटने का कोई प्रभाव नहीं होगा।

प्रश्न 7.26. निम्नलिखित में से दाब बढ़ाने पर कौन-कौन-सी अभिक्रियाएँ प्रभावित होंगी? यह भी बताएँ कि दाब परिवर्तन करने पर अभिक्रिया अग्र या प्रतीप दिशा में गतिमान होगी?



उत्तर—उपर्युक्त लिखिए सभी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया (ii) में मोल संख्या (उत्पाद एवं अधिकारक) बराबर हैं अर्थात्

$$n_p = n_r = 3$$

∴ यह अभिक्रिया दाब बढ़ने पर प्रभावित नहीं होती है।

तथा दूसरी अभिक्रियाएँ दाब बढ़ने से प्रभावित होती हैं।



$$\therefore n_p > n_r \quad \text{तथा} \quad n_p = 2$$


$$n_r = 1$$

∴ दाब के बढ़ने पर साम्य बायीं ओर अग्रसित होगा।



$$\therefore n_r = 1 \quad n_p > n_r \quad \text{तथा} \quad n_p = 2$$


∴ दाब के बढ़ने पर साम्य बायीं ओर अग्रसित होगा।



$$\therefore n_r = 3 \quad \text{तथा} \quad n_p = 1$$

$$\therefore n_p < n_r$$


∴ दाब के बढ़ने पर साम्य बायीं ओर अग्रसित होगा।



$$\therefore n_r = 0 \quad \text{तथा} \quad n_p = 1$$

$$\therefore n_p > n_r$$

∴ दाब के बढ़ने पर साम्य बायीं ओर अग्रसित होगा।




$$\therefore n_r = 9 \quad \text{तथा} \quad n_p = 10$$

$$\therefore n_p > n_r$$

अतः दाब के बढ़ने पर साम्य बायीं ओर अग्रसित होगा।

प्रश्न 7.27. निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए 1024 K पर साम्य स्थिरांक 1.6×10^5 है।



यदि HBr के 10.0 bar सीलयुक्त पात्र में डाले जाएँ, तो सभी गैसों के 1024 K पर साम्य दाब ज्ञात कीजिए।

हल : $2\text{HBr}(g) \rightleftharpoons \text{H}_2(g) + \text{Br}_2(g)$

साम्य पर, $10 - p$ $\frac{p}{2}$ $\frac{p}{2}$

$$K = \frac{1}{1.6 \times 10^5}$$

प्रारम्भिक दाब = 10.0 bar

$$\therefore K_P = \frac{\frac{p}{2} \times \frac{p}{2}}{(10 - p)^2}$$

या $\frac{1}{1.6 \times 10^5} = \frac{p^2}{4(10 - p)^2}$

वर्गमूल लेने पर, $\frac{1}{4 \times 10^2} = \frac{p}{2(10 - p)}$

या $4 \times 10^2 p = 2(10 - p)$

या $402p = 20$

या $p = \frac{20}{402} \text{ bar}$

$$= 4.97 \times 10^{-2} \text{ bar}$$

$$= 5.0 \times 10^{-2} \text{ bar}$$

अतः साम्य पर, $p_{\text{H}_2} = p_{\text{Br}_2} = \frac{p}{2} = 2.5 \times 10^{-2} \text{ bar}$

$$p_{\text{HBr}} = 10 - p = 10 \text{ bar}$$

अतः $[\text{P}_{\text{H}_2}]_{\text{eq}} = [\text{P}_{\text{Br}_2}]_{\text{eq}} = 2.5 \times 10^{-2} \text{ bar}$

तथा $[\text{P}_{\text{HBr}}] = 10.0 \text{ bar}$

उत्तर

प्रश्न 7.28. निम्नलिखित ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा डाइहाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है—



(क) उपरोक्त अभिक्रिया के लिए K_P का व्यंजक लिखिए।

(ख) K_P एवं अभिक्रिया मिश्रण का साम्य पर संघटन किस प्रकार प्रभावित होगा, यदि—

(i) दाब बढ़ा दिया जाए, (ii) ताप बढ़ा दिया जाए, (iii) उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए।

उत्तर—दी गई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।



यह अभिक्रिया आयतन बढ़ने से अग्रसित होती है।

(क) $K_P = \frac{p_{\text{CO}} \times p^3_{\text{H}_2}}{p_{\text{CH}_4} \times p_{\text{H}_2\text{O}}}$

- (ख) (i) लि चैटलियर सिद्धान्त के अनुसार साम्य प्रतीप दिशा में अग्रसित होगा।
(ii) अग्रोप दिशा में अग्रसित होगा।
(iii) साम्य प्रभावित नहीं होगा।

प्रश्न 7.29. साम्य $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ पर प्रभाव बताइए-

- (क) H_2 मिलाने पर
(ख) CH_3OH मिलाने पर
(ग) CO हटाने पर
(घ) CH_3OH हटाने पर।


उत्तर—अभिक्रिया $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ में,

- (क) H_2 मिलाने पर साम्य अग्रोप दिशा में अग्रसित होगा।
(ख) CH_3OH मिलाने पर साम्य प्रतीप दिशा में अग्रसित होगा।
(ग) CO हटाने पर साम्य प्रतीप दिशा में अग्रसित होगा।
(घ) CH_3OH हटाने पर साम्य अग्रोप दिशा में अग्रसित होगा।

प्रश्न 7.30. 473 K पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl_5 के विघटन के लिए K_c का मान 8.3×10^{-3} है। यदि विघटन इस प्रकार दर्शाया जाए, तो



- (क) अभिक्रिया के लिए K_c का व्यंजक लिखिए।
(ख) प्रतीप अभिक्रिया के लिए समान ताप पर K_c का मान क्या होगा?
(ग) यदि (i) और अधिक PCl_5 मिलाया जाए, (ii) दाब बढ़ाया जाए तथा (iii) ताप बढ़ाया जाए, तो K_c पर क्या प्रभाव होगा?



(क) $K_c = \frac{[\text{PCl}_3][\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]}$

उत्तर

(ख) $K'_c = \frac{[\text{PCl}_5]}{[\text{PCl}_3][\text{Cl}_2]} = \frac{1}{K_c}$

$$= \frac{1}{8.3 \times 10^{-3}} = 1.2048 \times 10^2$$

$$= 120.48$$

अतः K_c का मान = 120.48

उत्तर

(ग) (i) यदि PCl_5 और अधिक डाला जाएगा, तो साम्य अग्रोप दिशा से अग्रसित होगा।

(ii) यदि दाब बढ़ाया जाएगा, तो K_c का मान घटेगा।

(iii) $K_c = \frac{K_f}{K_b}$; क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है।

∴ ताप बढ़ने पर K_f बढ़ेगा तथा K_c का मान भी बढ़ेगा।


उत्तर

प्रश्न 7.31. हॉबर विधि में प्रयुक्त हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस से प्राप्त मेथेन को उच्च ताप की भाप से क्रिया कर बनाया जाता है। दो पदों वाली अभिक्रिया में प्रथम पद में CO एवं H₂ बनती है। दूसरे पद में प्रथम पद में बनने वाली CO और अधिक भाप से अभिक्रिया करती है।



यदि 400°C पर अभिक्रिया पात्र में CO एवं भाप का सममोलर मिश्रण इस प्रकार लिया जाए कि $p_{\text{CO}} = p_{\text{H}_2\text{O}} = 4.0$ bar, H₂ का साम्यावस्था पर आंशिक दाब क्या होगा? 400°C पर $K_p = 10.1$

हल : अभिक्रिया :



प्रारम्भिक दाब 4 bar 4 bar

साम्य दाब (4 - p) bar (4 - p) bar p bar p bar

$$\therefore K_p = \frac{p_{\text{CO}_2} \times p_{\text{H}_2}}{p_{\text{CO}} \times p_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{p \times p}{(4 - p)(4 - p)}$$

$$\text{या } 10.1 = \frac{p^2}{(4 - p)^2}$$

वर्गमूल लेने पर,

$$\frac{p}{(4 - p)} = \sqrt{10.1}$$

$$\text{या } \frac{p}{(4 - p)} = 3.18$$



$$\text{या } p = 12.72 - 3.18p$$

$$\text{या } p = \frac{12.72}{4.18} = 3.04 \text{ bar}$$

अतः H₂ का साम्यावस्था पर आंशिक दाब = 3.04 bar

उत्तर

प्रश्न 7.32. बताइए कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की सान्द्रता सुप्रेक्ष्य होगी-




हल : (क) $K_c = 5 \times 10^{-39}$ बहुत कम है।

∴ Cl₂ की सान्द्रता उच्च है।

∴ 2Cl उत्पाद की सान्द्रता कम होगी।


उत्तर



चूँकि K_c का मान उच्च है।

इसलिए NOCl उत्पाद की सान्द्रता उच्च होगी।

उत्तर



इसलिए NO₂Cl उत्पाद की सान्द्रता अधिक होगी।

उत्तर

प्रश्न 7.33. 25°C अभिक्रिया $3\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{O}_3(\text{g})$ के लिए K_1 का मान 2.0×10^{-50} है। यदि वायु में 25°C ताप पर O_2 की साम्यावस्था सान्द्रता 1.6×10^{-2} है, तो O_3 की सान्द्रता क्या होगी?

हल : अभिक्रिया $3\text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{O}_3$ के लिए $K_c = 2.0 \times 10^{-50}$

साम्य सान्द्रता 1.6×10^{-2} x

$$\therefore K_c = \frac{[\text{O}_3]^2}{[\text{O}_2]^3} = 2.0 \times 10^{-50}$$

$$\text{या} \quad \frac{x^2}{(1.6 \times 10^{-2})^3} = 2.0 \times 10^{-50}$$

$$\text{या} \quad x^2 = 1.6 \times 1.6 \times 1.6 \times 10^{-6} \times 2.0 \times 10^{-50}$$

$$\text{या} \quad x^2 = 8.192 \times 10^{-56}$$

$$\text{या} \quad x = 2.86 \times 10^{-28} \text{ M}$$

अतः साम्य सान्द्रता O_3 के लिए = $2.86 \times 10^{-28} \text{ M}$

उत्तर

प्रश्न 7.34. $\text{CO}(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ अभिक्रिया एक लीटर फ्लास्क में 1300 K पर साम्यावस्था में है। इसमें CO के 0.3 मोल, H_2 के 0.01 मोल, H_2O के 0.02 मोल एवं CH_4 की अज्ञात मात्रा है। दिए गए ताप पर अभिक्रिया के लिए K_c का मान 3.90 है। मिश्रण में CH_4 की मात्रा ज्ञात कीजिए।

हल : $\text{CO}(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

साम्य सान्द्रता 0.30 mol 0.10 mol ? 0.02 mol

$$\therefore K_c = 3.90$$

$$\therefore K_c = \frac{[\text{CH}_4][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CO}][\text{H}_2]^3}$$

$$\text{या} \quad 3.90 = \frac{[\text{CH}_4] \times 0.02}{0.3 \times (0.1)^3}$$

$$\text{या} \quad [\text{CH}_4] = 0.0585$$

$$= 5.85 \times 10^{-2}$$

$$\text{या} \quad [\text{CH}_4] = \frac{3.9 \times 0.3 \times 1 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-2}}$$

$$\text{या} \quad [\text{CH}_4] = 0.0585 \times 10^{-2}$$

अतः मिश्रण में CH_4 की सान्द्रता = $5.85 \times 10^{-2} \text{ M}$

उत्तर

प्रश्न 7.35. संयुग्मी अम्ल-क्षार युग्म का क्या अर्थ है? निम्नलिखित स्पीशीज के लिए संयुग्मी अम्ल/क्षार बताइए-

HNO_2 , CN^- , HClO_4 , F^- , OH^- , CO_3^{2-} एवं S^{2-}

उत्तर—संयुग्मी अम्ल-क्षार युग्म—एक संयुग्मी अम्ल युग्म और क्षार युग्म में प्रोटोन का अन्तर होता है।


अतः संयुग्मी अम्ल \rightleftharpoons संयुग्मी अम्ल + H^+

HNO_2 का संयुग्मी क्षार = NO_2^-

CN^- का संयुग्मी अम्ल = HCN

HClO_4 का संयुग्मी क्षार = ClO_4^-

F^- का संयुग्मी क्षार अम्ल = HF



तथा

प्रश्न 7.36. निम्नलिखित में से कौन-से लुइस अम्ल हैं-



उत्तर—लुइस अम्ल वे पदार्थ होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अतः BF_3, H^+ तथा NH_4^+ लुइस अम्ल हैं।

प्रश्न 7.37. निम्नलिखित में से ब्रान्स्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षारकों के सूत्र लिखिए—



उत्तर—HF का संयुग्मी क्षार = F^-

H_2SO_4 का संयुग्मी क्षार = HSO_4^-

तथा HCO_3^- का संयुग्मी क्षार = CO_3^{2-}

प्रश्न 7.38. ब्रान्स्टेड क्षारकों NH_2^- , NH_3 तथा HCOO^- के संयुग्मी अम्ल लिखिए।

उत्तर— NH_2^- का संयुग्मी अम्ल = NH_3

NH_3 का संयुग्मी अम्ल = NH_4^+

तथा HCOO^- का संयुग्मी अम्ल = HCOOH

प्रश्न 7.39. स्पीशीज H_2O , HCO_3^- , HSO_4^- तथा NH_3 ब्रान्स्टेड अम्ल तथा क्षारक-दोनों की भाँति व्यवहार करते हैं। प्रत्येक के संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक बताइए।

उत्तर— H_2O का संयुग्मी अम्ल H_3O^+ है और OH^- संयुग्मी क्षारक है।

HCO_3^- का संयुग्मी अम्ल H_2CO_3 है और CO_3^{2-} क्षारक है।


HSO_4^- का संयुग्मी अम्ल H_2SO_4 है और SO_4^{2-} क्षारक है।

NH_3 का संयुग्मी अम्ल NH_4^+ और NH_2^- क्षारक है।


प्रश्न 7.40. निम्नलिखित स्पीशीज को लुइस अम्ल तथा क्षारक में वर्गीकृत कीजिए तथा बताइए कि ये किस प्रकार लुइस अम्ल-क्षारक के समान कार्य करते हैं—

(क) OH^- (ख) F^- (ग) H^+ (घ) BCl_3


उत्तर—(क) OH^- लुइस क्षारक है; क्योंकि एक युग्म इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है।




(ख) F^- लुइस क्षारक है; क्योंकि यह एक युग्म इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है।



(ग) H^+ लुइस अम्ल है; क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है।



(घ) BCl_3 लुइस अम्ल है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है।



प्रश्न 7.41. एक मृदु पेय के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता 3.8×10^{-3} M है। उसकी pH परिकलित कीजिए।

$$\begin{aligned} \text{हल : } \therefore & \quad pH = -\log [H_3O^+] \\ \therefore & \quad pH = -\log (3.8 \times 10^{-3}) \\ \text{या} & \quad pH = -(-3) \log 10 - \log 3.8 \\ \text{या} & \quad pH = 3.0 - 0.5798 = 2.42 \\ \text{अतः pH का मान} & = 2.42 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 7.42. सिरके के एक नमूने की pH, 3.76 है। इसमें हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned} \text{हल :} & \quad pH = -\log [H^+] \\ \text{या} & \quad 3.76 = -\log [H^+] \\ \text{या} & \quad \log [H^+] = -3.76 \\ \text{या} & \quad \log [H^+] = -\bar{4}.24 \\ \therefore & \quad [H^+] = \text{Antilog } \bar{4}.24 \\ & \quad [H^+] = 1.74 \times 10^{-4} \text{ M} \end{aligned}$$

$$\text{अतः pH का मान} = 1.74 \times 10^{-4} \text{ M}$$

उत्तर

प्रश्न 7.43. HF, HCOOH तथा HCN का 298 K पर आयनन स्थिरांक क्रमशः 6.8×10^{-4} , 1.8×10^{-4} तथा 4.8×10^{-9} है। इनके संगत संयुग्मी क्षारकों के आयनन स्थिरांक ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned} \text{हल : } \therefore & \quad K_a \times K_b = K_w \\ \text{जहाँ} & \quad K_a = \text{दुर्बल अम्ल वियोजन स्थिरांक} \\ & \quad K_b = \text{आयनन स्थिरांक क्षारक} \\ \text{तथा} & \quad K_w = \text{जल का आयनिक गुणनफल} = 10 \times 10^{-14} \\ \therefore & \quad HF/F^- \cdot K_{HF} \times K_{F^-} = 10 \times 10^{-14} \\ \text{या} & \quad 6.8 \times 10^{-4} \times K_{F^-} = 10 \times 10^{-14} \\ & \quad K_{F^-} = \frac{10 \times 10^{-14}}{6.8 \times 10^{-4}} = 1.47 \times 10^{-11} = 1.5 \times 10^{-11} \end{aligned}$$

HCOOH/HCOO⁻

$$\begin{aligned} \therefore & \quad K_{HCOOH} \times K_{HCOO^-} = 10 \times 10^{-14} \\ \therefore & \quad 1.8 \times 10^{-4} \times K_{HCOO^-} = 10 \times 10^{-14} \\ \text{या} & \quad K_{HCOO^-} = \frac{10 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-4}} = 5.555 \times 10^{-11} = 5.6 \times 10^{-11} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \therefore & \quad HCN/CN^- \cdot K_{HCN} \times K_{CN^-} = 10 \times 10^{-14} \\ \therefore & \quad 4.8 \times 10^{-9} \times K_{CN^-} = 10 \times 10^{-14} \\ \text{या} & \quad K_{CN^-} = \frac{10 \times 10^{-14}}{4.8 \times 10^{-9}} = 2.08 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

$$\text{अतः} \quad F^- = 1.5 \times 10^{-11}, HCOO^- = 5.6 \times 10^{-11} \text{ तथा } CN^- = 2.08 \times 10^{-6}$$

उत्तर

प्रश्न 7.44. फीनॉल का आयनन स्थिरांक 1.0×10^{-10} है। 0.05 M फीनॉल के विलयन में फीनॉलेट आयन की सान्द्रता तथा 0.01 M सोडियम फीनेट विलयन में उसके आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए।

हल : फीनॉल का आयनन स्थिरांक $= 1.0 \times 10^{-10}$



आयनन की मात्रा

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{1.0 \times 10^{-10}}{0.05}} = 4.47 \times 10^{-5}$$

$$\begin{aligned} [\text{फीनॉल आयन}] &= c\alpha = \sqrt{K_a C} = \sqrt{0.05 \times 1.0 \times 10^{-10}} \\ &= 2.2 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

0.01 M सोडियम बेंजोएट की उपस्थिति में मान y मात्रा फीनॉल की वियोजित होती है, तब साम्य पर

$$\begin{aligned} [C_6H_5OH] &= 0.05 - y \approx 0.05 \\ [C_6H_5O^-] &= 0.01 + y \approx 0.01 \end{aligned}$$

$$[H^+] = y \text{ mol}$$

$$\therefore K_a = \frac{0.01 \times y}{0.05} = 1.0 \times 10^{-10}$$

$$\text{या } 0.01 \times y = 0.05 \times 1.0 \times 10^{-10}$$

$$\text{या } y = 5 \times 10^{-10}$$

$$\alpha = \frac{y}{c} = \frac{5 \times 10^{-10}}{0.05} = 10^{-8}$$

अतः फीनॉल के विलयन में फीनॉलेट आयन की सांद्रता $= 2.2 \times 10^{-6}$, $\alpha = 4.47 \times 10^{-5}$ तथा सोडियम फीनॉलेट विलयन में आयनन की मात्रा $= 10^{-8}$ उत्तर

प्रश्न 7.45. H_2S का प्रथम आयनन स्थिरांक 9.1×10^{-8} है। इसके 0.1 M विलयन में HS^- आयनों की सान्द्रता की गणना कीजिए तथा बताइए कि यदि इसके 0.1 M HCl की उपस्थिति हो, तो सान्द्रता किस प्रकार प्रभावित होगी, यदि H_2S का द्वितीय वियोजन स्थिरांक 1.2×10^{-13} हो, तो सल्फाइड S^{2-} आयनों की दोनों स्थितियों में सान्द्रता की गणना कीजिए।



$$1 - \alpha \quad \alpha \quad \alpha$$

$$C(1 - \alpha) \quad \alpha \quad \alpha$$

तथा

$$K_{a1} = 9.1 \times 10^{-8}$$

\therefore

$$K'_a = \frac{C\alpha \times C\alpha}{C(1 - \alpha)}; \text{ जहाँ } C = \text{मोलर द्रव्यमान}$$

या

$$K'_a = \frac{C\alpha^2}{1 - \alpha}$$

या

$$K'_a = C\alpha^2$$

या


$$\alpha = \sqrt{\frac{K'_a}{C}}$$

$$[\text{HS}^-] = C\alpha = C\sqrt{\frac{K'_a}{C}} = \sqrt{K'_a C}$$

या

$$[\text{HS}^-] = \sqrt{9.1 \times 10^{-8} \times 0.1}$$

$$= 9.54 \times 10^{-5}$$



माना 0.1 M HCl की उपस्थिति में H₂S का y मान वियोजित होता है, तब साम्य पर

$$[\text{H}_2\text{S}] = (0.1 - y) = y[\text{H}^+] = (0.1 + y) = 0.1$$

तथा

$$[\text{HS}^-] = y \text{ mol}$$

∴


$$9.1 \times 10^{-8} = \frac{0.1 \times [\text{HS}^-]}{0.1} = \frac{0.1 \times y}{0.1}$$

या

$$y = 9.1 \times 10^{-8} \text{ M}$$

या

$$[\text{HS}^-] \text{ 0.1 M HCl में } = 9.1 \times 10^{-8}$$



∴

$$K_a = K_{a_1} \times K_{a_2} = 9.1 \times 10^{-8} \times 1.2 \times 10^{-13} = 1.092 \times 10^{-20}$$

अतः $[\text{HS}^-] = 9.54 \times 10^{-5}$ तथा 0.1 HCl में $[\text{HS}^-] = 9.1 \times 10^{-8}$

उत्तर

द्वितीय स्थिति

$[\text{S}^{2-}]$ गणना के लिए

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{S}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{S}]}$$

0.1 M HCl की अनुपस्थिति में,

$$[\text{H}^+] = 2[\text{S}^{2-}]$$

∴

$$[\text{S}^{2-}] = x \text{ तथा } [\text{H}^+] = 2x$$

∴

$$\frac{(2x)^2 \times x}{0.1} = 1.092 \times 10^{-20}$$

या

$$4x^2 = 1.092 \times 10^{-21} \text{ M}$$

या

$$4x^2 = 2.73 \times 10^{-20}$$

या

$$x = 1.65 \times 10^{-10} \text{ M}$$

0.1 M HCl की उपस्थिति में,

माना

$$[\text{S}^{2-}] = y, \text{ तब } [\text{H}_2\text{S}] = 0.1 - y \approx 0.1 \text{ M}$$

$$[\text{H}_2\text{S}] = 0.1 - y \approx 0.1 \text{ M}$$

तथा

$$[\text{H}^+] = 0.1 + y \approx 0.1 \text{ M}$$

∴

$$K_a = \frac{(0.1)^2 \times y}{(0.1)} = 1.09 \times 10^{-20}$$

या

$$0.1y = 1.09 \times 10^{-20}$$

या

$$y = 1.09 \times 10^{-19} \text{ M}$$


अतः

$$[\text{S}^{2-}] = 1.65 \times 10^{-10} \text{ M तथा 0.1 M HCl में } [\text{S}^{2-}] = 1.09 \times 10^{-19} \text{ M}$$

उत्तर

प्रश्न 7.46. ऐसिटिक अम्ल का आयनन स्थिरांक 1.74×10^{-5} है। इसके 0.05 M विलयन में वियोजन की मात्रा, ऐसीटेट आयन सान्द्रता तथा pH का परिकलन कीजिए।

हल :



तथा

$$K_a = 1.74 \times 10^{-5}$$

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0.05 \text{ M}$$



$$1 - \alpha$$

$$C(1 - \alpha)$$

$$\alpha$$

$$C\alpha$$

$$\alpha$$

$$C\alpha$$

∴

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{C\alpha \times C\alpha}{C(1 - \alpha)} = \frac{C\alpha^2}{1 - \alpha}$$

या

$$K_a = C\alpha^2$$

या

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{1.74 \times 10^{-5}}{0.05}} = 1.86 \times 10^{-2}$$

$$\begin{aligned} [\text{CHCOO}^-] &= C\alpha = \sqrt{K_a C} \\ &= \sqrt{1.74 \times 10^{-5} \times 0.05} = 9.33 \times 10^{-4} \text{ M} \\ &= 0.00093 \text{ M} \end{aligned}$$

∴

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log [\text{H}^+] = -\log 9.33 \times 10^{-4} \\ &= +4 - 0.97 = 3.03 \end{aligned}$$

अतः $[\text{CHCOO}^-] = 0.00093 \text{ M}$ तथा $\text{pH} = 3.03$

उत्तर

प्रश्न 7.47. 0.01 M कार्बनिक अम्ल (HA) के विलयन pH, 4.15 है। इसके ऋणायन की सान्द्रता, अम्ल का आयनन स्थिरांक तथा $\text{p}K_a$ मान परिकलित कीजिए।

हल : कार्बनिक अम्ल $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$

$$\text{pH} = 4.15 \text{ तथा } C = [\text{HA}] = 0.01 \text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = +10^{-\text{pH}}$$

या

$$-\log [\text{H}^+] = 4.15$$

या

$$\log [\text{H}^+] = -4.15 = \bar{5}.85$$

या

$$[\text{H}^+] = \text{Antilog } \bar{5}.85 = 7.079 \times 10^{-5} = 7.08 \times 10^{-5} \text{ M}$$

ऋणायन की सान्द्रता

$$= [\text{A}^-]$$

या

$$[\text{H}^+] = 7.08 \times 10^{-5} \text{ M}$$

∴

$$\begin{aligned} K_a &= \frac{(7.08 \times 10^{-5})^2}{0.01} \\ &= \frac{7.08 \times 7.08 \times 10^{-10}}{1 \times 10^{-2}} = 5.08 \times 10^{-7} \end{aligned}$$

$$\text{p}K_a = -\log K_a = -\log 5.08 \times 10^{-7} = 6.29$$

अतः $[\text{A}^-] = 7.08 \times 10^{-5} \text{ M}$, $K_a = 5.08 \times 10^{-7}$ तथा $\text{p}K_a = 6.29$

उत्तर

प्रश्न 7.48. पूर्ण वियोजन मानते हुए निम्नलिखित विलयनों के pH ज्ञात कीजिए-

(क) 0.003 M HCl

(ख) 0.005 M NaOH

(ग) 0.002 M HBr


(घ) 0.002 M KOH

हल : (क) $\text{HCl}(aq) \longrightarrow \text{H}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq)$

$$\begin{aligned} \therefore [\text{HCl}] &= 0.003 \text{ M} \\ \therefore [\text{H}^+] &= [\text{HCl}] = 0.003 = 3 \times 10^{-3} \text{ M} \\ \therefore \text{pH} &= -\log [\text{H}^+] = -\log 3 \times 10^{-3} = 2.523 = 2.52 \end{aligned}$$

अतः HCl तथा pH मान = 2.52

उत्तर



$$\begin{aligned} \therefore [\text{NaOH}] &= 0.005 = 5 \times 10^{-3} \text{ M} \\ \text{तथा} [\text{OH}^-] &= [\text{NaOH}] = 5 \times 10^{-3} \text{ M} \\ \therefore [\text{H}^+] &= \frac{[K_w]}{[\text{OH}^-]} = \frac{10 \times 10^{-14}}{5.0 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^{-12} \\ \therefore \text{pH} &= -\log 2 \times 10^{-12} = 11.70 \end{aligned}$$

अतः NaOH का pH मान = 11.70

उत्तर



$$\begin{aligned} [\text{HBr}] &= 0.002 \text{ M} = [\text{H}^+] \\ \text{pH} &= -\log [\text{H}^+] = -\log 2 \times 10^{-3} = 2.70 \end{aligned}$$

अतः HBr का pH मान = 2.70

उत्तर



$$\begin{aligned} [\text{OH}^-] &= 0.002 \text{ M} \\ [\text{H}^+] &= \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{1 \times 10^{-14}}{0.002} = 5 \times 10^{-12} \text{ M} \\ \text{pH} &= -\log [\text{H}^+] = 11.30 \end{aligned}$$

अतः KOH का pH मान = 11.30

उत्तर

प्रश्न 7.49. निम्नलिखित विलयनों के pH ज्ञात कीजिए-

(क) 2 ग्राम TlOH को जल में घोलकर 2 लीटर विलयन बनाया जाए।

(ख) 0.3 ग्राम $\text{Ca}(\text{OH})_2$ को जल में घोलकर 500 mL बनाया जाए।

(ग) 0.3 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 200 mL विलयन बनाया जाए।

(घ) 13.6 M HCl के 1 mL को जल से तनुकरण करके कुल आयतन 1 लीटर किया जाए।

हल : (क) $\text{TlOH} \rightleftharpoons \text{Tl}^+ + \text{OH}^-$

$$[\text{TlOH}] = \frac{2}{221 \times 2} = \frac{1}{221} \text{ mL}^{-1}$$

$$\therefore [\text{OH}^-] = \frac{1}{221} \text{ M}$$

$$[\because \text{TlOH} = 204 + 16 + 1 = 221]$$

$$\therefore \text{H}^+ = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]}$$

$$= \frac{10 \times 10^{-14}}{1/221} = 221 \times 10^{-14} \text{ M}$$


$$\therefore \text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$= -\log 221 \times 10^{-14}$$

$$= 11.65$$

अतः TlOH का pH मान = 11.65

उत्तर



आण्विक द्रव्यमान = 74 g

$$[\text{Ca(OH)}_2] = \frac{0.3 \times 2}{74} \\ = \frac{0.6}{74} = 8.0 \times 10^{-3}$$

तथा

$$[\text{OH}^-] = 2 \times 8.0 \times 10^{-3} \\ = 16.0 \times 10^{-3} \text{ M} = 1.6 \times 10^{-2} \text{ M}$$

∴

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{10 \times 10^{-14}}{1.6 \times 10^{-2}} = 6.25 \times 10^{-13}$$

$$\text{pH} = -\log 6.25 \times 10^{-13} = 12.21$$

अतः Ca(OH)_2 का pH मान = 12.21

उत्तर

(ग) $\text{NaOH(aq)} \rightleftharpoons \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$

तथा

आण्विक द्रव्यमान = 40 g

$$[\text{NaOH}] = [\text{OH}^-] = \frac{0.3 \times 5}{40} = \frac{1.5}{40} = 0.0375$$

$$[\text{H}^+] = \frac{10 \times 10^{-14}}{0.0375} = 26.67 \times 10^{-14}$$

∴

$$\text{pH} = -\log 26.67 \times 10^{-14} = 12.57$$

अतः NaOH का pH मान = 12.57

उत्तर

(घ) 1 mL 3.6 M HCl का आयतन 1 L किया जाता है।

HCl में वियोजन में H^+ आयनन बनेंगे।

या

$$M_1 V_1 = M_2 V_2 \\ M_2 = \frac{M_1 V_1}{V_2} = \frac{1 \times 3.6}{1000} \text{ M} = 0.0136 \text{ M}$$

∴

$$[\text{HCl}] = [\text{H}^+] = 0.0136 \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = 1.36 \times 10^{-2} = 1.87$$

अतः HCl का pH मान = 1.87


उत्तर

प्रश्न 7.50. ब्रोमोएसीटिक अम्ल की आयनन की मात्रा 0.132 है। 0.1 M अम्ल की pH तथा pK_a का मान ज्ञात कीजिए।

हल : ब्रोमोएसीटिक अम्ल की आयनन मात्रा $\alpha = 0.132$

C मोलर सान्द्रता = 0.1 M

प्रारम्भिक सान्द्रता



∴

$$[\text{H}^+] = C \times \alpha = 0.1 \times 0.132 = 0.0132$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 1.32 \times 10^{-2} = 1.88$$

$$\text{pK}_a = -\log K_a$$

अब

$$K_a \approx C\alpha^2$$

$$K_a = 0.1 \times (0.132)^2 = 1.74 \times 10^{-3}$$

$$\text{pK}_a = -\log 1.74 \times 10^{-3}$$

$$= -(-3) - \log 1.74 = 3 - 0.30 = 2.70$$

अतः अम्ल का pH मान = 1.88 तथा $pK_a = 2.70$

उत्तर

प्रश्न 7.51. 0.005M कोडिन ($C_{18}H_{21}NO_3$) विलयन की pH, 9.95 है। इसका आयनन स्थिरांक ज्ञात कीजिए।

हल : कोडिन की मोलर सान्द्रता = 0.005 M

तथा

$$pH = 9.95$$

$$\therefore \log H^+ = -9.95 = \bar{10}.05$$

या

$$[H^+] = 1.12 \times 10^{-10}$$

$$[OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]} = \frac{10 \times 10^{-14}}{1.12 \times 10^{-10}} = 8.93 \times 10^{-5}$$

\therefore

$$[OH^-] = \sqrt{K_b C}$$

\therefore

$$K_b = \left(\frac{8.93 \times 10^{-5}}{0.005} \right)^2 = 1.59 \times 10^{-6} = 1.6 \times 10^{-6}$$

$$pK_a = -\log_p K_b = -\log 1.6 \times 10^{-6} = 5.8$$

अतः $K_b = 1.6 \times 10^{-6}$ तथा $pK_b = 5.8$

उत्तर

प्रश्न 7.52. 0.001 M एनीलीन का pH क्या है? एनीलीन का आयनन स्थिरांक सारणी से ले सकते हैं। इसके संयुग्मी अम्ल का आयतन स्थिरांक ज्ञात कीजिए।

हल : एनीलीन विलयन की सान्द्रता = 0.001 M

$$K_b = 4.2 \times 10^{-10}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_b}{C}} = \sqrt{\frac{4.2 \times 10^{-10}}{0.001}} = \sqrt{42 \times 10^{-8}} = 6.48 \times 10^{-4}$$

यदि K_a आयनन स्थिरांक संयुग्मी अम्ल के लिए, तब $K_a \times K_b = K_w$

या

$$K_a = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10 \times 10^{-14}}{4.2 \times 10^{-10}} = 2.38 \times 10^{-5}$$

अतः $\alpha = 6.48 \times 10^{-4}$ तथा $K_a = 2.38 \times 10^{-5}$

उत्तर

प्रश्न 7.53. यदि 0.05M ऐसीटिक अम्ल के pK_a का मान 4.74 है, तो आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि इसे (अ) 0.01M (ब) 0.1M HCl विलयन में डाला जाए, तो वियोजन की मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है?

हल : CH_3COOH के लिए $pK_a = 4.74$

\therefore

$$4.74 = pK_a = -\log K_a$$

$$K_a = \text{Antilog } 5.26 = 1.82 \times 10^{-5}$$

ऐसीटिक अम्ल की मोल सान्द्रता = 0.05 M

\therefore

$$\alpha = \sqrt{K_a / C} = \sqrt{\frac{1.82 \times 10^{-5}}{0.05}} = \sqrt{3.64 \times 10^{-4}}$$

$$\alpha = 1.91 \times 10^{-2}$$

(अ) 0.01 M सान्द्रता पर α का मान

$$= \sqrt{\frac{1.82 \times 10^{-5}}{0.01}} = \sqrt{1.82 \times 10^{-4}}$$

$$= 4.27 \times 10^{-2} = 0.0427$$

अतः 0.01M सान्द्रता पर α का मान = 0.047

उत्तर

(ब) 0.1 M HCl के लिए α का मान

$$= \sqrt{\frac{1.82 \times 10^{-5}}{0.1}} = \sqrt{1.82 \times 10^{-6}}$$

$$= 1.35 \times 10^{-3}$$

$$= 0.00135$$

अतः 0.1 M HCl के लिए α का मान = 0.00135

उत्तर

प्रश्न 7.54. डाइमेथिल एमीन का आयनन स्थिरांक 5.4×10^{-4} है। इसके 0.02 M विलयन की आयनन की मात्रा की गणना कीजिए। यदि यह विलयन NaOH प्रति 0.1 M हो, तो डाइमेथिल एमीन का प्रतिशत आयन क्या होगा?

हल : डाइमेथिल एमीन के लिए $K_b = 5.4 \times 10^{-4}$

मोलर सान्द्रता (C) = 0.02 M

$$\text{आयनन डिग्री } \alpha = \sqrt{\frac{K_b}{C}}$$

$$= \sqrt{\frac{5.4 \times 10^{-4}}{0.02}} = 1.643 \times 10^{-2} = 0.164$$

0.1 M NaOH की उपस्थिति में यदि x मान डाइमेथिल एमीन वियोजित होता है, तब

$$[\text{MOH}] = 0.02 - x \approx 0.02 \text{ M}$$

$$\therefore [\text{OH}^-] = 0.1 + x \approx 0.1 \text{ M}$$

$$\text{या } [\text{M}^+] = x \text{ M}$$

$$\therefore K_b = \frac{[\text{M}^+] \times [\text{OH}^-]}{[\text{MOH}]}$$

$$\text{या } K_b = \frac{x \times 0.1}{0.02}$$

$$\therefore K_b = 5.4 \times 10^{-4}$$

$$\therefore \frac{x \times 0.1}{0.02} = 5.4 \times 10^{-4}$$

$$\text{या } x = 1.08 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\therefore \alpha = \frac{x}{c}$$

$$\text{या } \alpha = \frac{1.08 \times 10^{-4}}{0.02} = 0.0054$$

अतः डाइमेथिल एमीन का प्रतिशत आयन = 0.0054

उत्तर

प्रश्न 7.55. निम्नलिखित जैविक द्रवों, जिनमें pH दी गई है, की हाइड्रोजन आयन सान्द्रता परिकलित कीजिए—

(क) मानव पेशीय द्रव, 6.83

(ख) मानव उदर द्रव, 1.2

(ग) मानव रुधिर, 7.38

(घ) मानव लार, 6.4

हल : (क) \therefore मानव पेशीय द्रव $pH = 6.83$

$$\therefore 6.83 = -\log [H^+]$$

$$\text{या } \log [H^+] = -6.83$$

$$\text{या } [H^+] = \text{Antilog } \bar{7}.17 = 1.48 \times 10^{-7} \text{ M}$$

अतः हाइड्रोजन आयन सान्द्रता = $1.48 \times 10^{-7} \text{ M}$

उत्तर

(ख) ∴ मानव उदर द्रव का $pH=12$

$$\therefore 12 = -\log [H^+]$$

या $[H^+] = \text{Antilog } \bar{2}.8 = 0.063 \text{ M}$

अतः हाइड्रोजन आयन सान्द्रता = 0.063 M

उत्तर

(ग) ∴ मानव रुधिर का $pH=7.38$

$$\therefore 7.38 = -\log [H^+]$$

या $[H^+] = \text{Antilog } \bar{8}.62$
 $= 4.17 \times 10^{-8} \text{ M}$

अतः हाइड्रोजन आयन सान्द्रता = $4.17 \times 10^{-8} \text{ M}$

उत्तर

(घ) ∴ मानव लार का $pH=6.4$

$$\therefore 6.4 = -\log [H^+]$$

या $[H^+] = \text{Antilog } \bar{7}.6$
 $= 3.98 \times 10^{-7} \text{ M}$

अतः हाइड्रोजन आयन सान्द्रता = $3.98 \times 10^{-7} \text{ M}$

उत्तर

प्रश्न 7.56. दूध, कॉफी, टमाटर, रस, नींबू रस तथा अंडे की सफेदी के pH मान क्रमशः 6.8, 5.0, 4.2, 2.2 तथा 7.8 हैं। प्रत्येक के संगत H^+ आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए।

हल : दूध का $pH=6.8 = -\log H^+$

या $[H^+] = \text{Antilog } \bar{7}.2 = 1.5 \times 10^{-7} \text{ M}$

अतः H^+ आयन की सांद्रता = $1.5 \times 10^{-7} \text{ M}$

उत्तर

कॉफी का pH मान = 5.0 = $-\log H^+$

या $[H^+] = \text{Antilog } \bar{5}.00 = 10^{-5} \text{ M}$

अतः H^+ आयन की सांद्रता = 10^{-5} M

उत्तर

टमाटर का रस $pH=4.2 = -\log H^+$

या $[H^+] = \text{Antilog } \bar{5}.8 = 6.31 \times 10^{-5} \text{ M}$

अतः H^+ आयन की सांद्रता = $6.31 \times 10^{-5} \text{ M}$

उत्तर

नींबू का रस $pH=2.2 = -\log H^+$

या $[H^+] = \text{Antilog } \bar{3}.8 = 6.31 \times 10^{-3} \text{ M}$

अतः H^+ आयन की सांद्रता = $6.31 \times 10^{-3} \text{ M}$

उत्तर

अंडे की सफेदी का $pH=7.8 = -\log H^+$

या $[H^+] = \text{Antilog } \bar{8}.2 = 1.5 \times 10^{-8} \text{ M}$

अतः H^+ आयन की सांद्रता = $1.5 \times 10^{-8} \text{ M}$

उत्तर

प्रश्न 7.57. 298 K ताप 0.561 g, KOH जल में घोलने पर प्राप्त 200 mL विलयन की है pH , पोटेशियम, हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रताएँ ज्ञात कीजिए।

हल : $\text{KOH की सांद्रता} = \frac{0.561 \times 1000}{56.1 \times 200} \text{ M} = 0.05 \text{ M}$

KOH एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसका पूर्ण वियोजन होता है।



$$[\text{KOH}] = [\text{K}^+] = [\text{OH}^-] = 0.05 \text{ M}$$

$$\text{अब } [H^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{10 \times 10^{-14}}{0.05} = 20 \times 10^{-13} \text{ M}$$

$$\therefore pH = -\log [H^+] = -\log 20 \times 10^{-13} = 12.7$$


अतः $[\text{K}^+] = [\text{OH}^-] = 0.05 \text{ M}$ तथा $[H^+] = 2.0 \times 10^{-13} \text{ M}$

उत्तर

प्रश्न 7.58. 298 K पर Sr(OH)₂ विलयन की विलेयता 19.23 g/L है। स्ट्रॉंशियम तथा हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता तथा विलयन की pH ज्ञात कीजिए।

हल : Sr(OH)₂ की 298 K ताप पर विलेयता = 19.23 g / L

$$\text{मोलर सांद्रता} = \frac{19.23}{121.6} \text{ M} = 0.1581 \text{ M}$$



$$\therefore [\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{10 \times 10^{-14}}{0.3162} = 3.1625 \times 10^{-14} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log \text{H}^+ = -\log 3.1685 \times 10^{-14} = 13.50$$

अतः $[\text{Sr}^{2+}] = 0.1581 \text{ M}$, $[\text{OH}^-] = 0.3162 \text{ M}$ तथा $\text{pH} = 13.50$

उत्तर

प्रश्न 7.59. प्रोपेनाइन अम्ल का आयन स्थिरांक 1.32×10^{-5} है। 0.05 M अम्ल विलयन के आयनन की मात्रा तथा pH ज्ञात कीजिए। यदि विलयन में 0.01 M HCl मिलाया जाए, तो उसके आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए।



यदि α = प्रोपेनाइन की आयनन डिग्री = $\sqrt{\frac{K_a}{C}}$

जहाँ K_a आयनन स्थिरांक तथा C = मोलर सांद्रता है।

अब $\alpha = \sqrt{\frac{1.32 \times 10^{-5}}{0.05}} = \sqrt{2.64 \times 10^{-4}}$

$$\alpha = 1.63 \times 10^{-2}$$

$$\text{आयनन डिग्री} = 1.63 \times 10^{-2}$$

या $[\text{H}^+] = c\alpha = 0.05 \times 1.63 \times 10^{-2} = 8.1 \times 10^{-4}$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 8.1 \times 10^{-4} = 3.09$$

0.01 M HCl की उपस्थिति में आयनन डिग्री HCl की उपस्थिति में साम्य प्रतीप दिशा में जाएगा, इसलिए $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ की सांद्रता घटेगी।

यदि प्रारम्भिक सांद्रता C एवं $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ का x मान वियोजित होता है, तब साम्य पर $[\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}] = C - x$

या $[\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-] = x$, $[\text{H}^+] = 0.01 + x$

$$\therefore K_a = \frac{x(0.01+x)}{C-x} = \frac{x(0.01)}{C}$$

या $\frac{x}{C} = \frac{K_a}{0.01} = \frac{1.32 \times 10^{-5}}{0.01} = 1.32 \times 10^{-3}$

$$\therefore \alpha = \frac{x}{C} = 1.32 \times 10^{-3}$$

अतः $\text{pH} = 3.09$ की उपस्थिति में 0.01 M HCl तथा आयनन की मात्रा = 1.32×10^{-3}

उत्तर

प्रश्न 7.60. यदि साइनिक अम्ल (HCNO) के 0.1 M विलयन की pH, 2.34 हो, तो अम्ल के आयनन स्थिरांक तथा आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए।

हल : $\therefore \text{pH} = 2.34$

\therefore मोलर सांद्रता = 2.34



$$-\log [H^+] = 2.34$$

या $[H^+] = \text{Antilog } 3.66 = 4.57 \times 10^{-3} \text{ M}$

या $[H^+] = \sqrt{K_a C} = 4.57 \times 10^{-3} \text{ M}$

या $K_a C = 2.088 \times 10^{-5}$

या $K_a = \frac{2.088 \times 10^{-5}}{0.1} = 2.088 \times 10^{-4}$

या $K_a = 2.09 \times 10^{-4}$

तथा आयनन की मात्रा

$$a = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{2.088 \times 10^{-4}}{0.1}} = 0.0457$$

अतः आयनन स्थिरांक = 2.09×10^{-4} तथा आयनन की मात्रा = 0.0457

उत्तर

प्रश्न 7.61. यदि नाइट्रस अम्ल का आयनन स्थिरांक 4.5×10^{-4} है, तो 0.04 M सोडियम नाइट्राइट विलयन की pH तथा जलयोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए।

हल : जलयोजन स्थिरांक

$$K_n = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10 \times 10^{-14}}{4.5 \times 10^{-4}} = 2.22 \times 10^{-11}$$

जलयोजन की मात्रा

$$n = \sqrt{\frac{K_n}{C}} = \sqrt{\frac{2.22 \times 10^{-11}}{0.04}} = \sqrt{5.5 \times 10^{-10}}$$

$$= 2.36 \times 10^{-5}$$

अब

$$[OH^-] = \sqrt{K_n C} = \sqrt{2.22 \times 10^{-11} \times 0.04}$$

$$= \sqrt{8.88 \times 10^{-14}}$$

$$= 9.42 \times 10^{-7}$$

$$pOH = -\log 9.42 \times 10^{-7} = 7 - 0.97 = 6.03$$

तथा

$$pH = 14 - pOH = 14 - 6.03 = 7.97$$

अतः pH = 7.97 तथा जल वियोजन की मात्रा = 2.36×10^{-5}

उत्तर

प्रश्न 7.62. यदि पीरीडिनीयम हाइड्रोजन क्लोराइड के 0.02 M विलयन का pH 3.44 है, तो पीरीडीन का आयनन स्थिरांक ज्ञात कीजिए।

हल : HCl एक प्रबल अम्ल एवं पीरीडियम हाइड्रोजन क्लोराइड दुर्बल क्षार है।

$$\therefore pH = -\frac{1}{2} [\log K_w - \log K_b + \log C]$$

या $3.44 = -\frac{1}{2} [-14 - \log K_b + \log 20 \times 10^{-2}]$

या $6.88 = 14 + \log K_b + 1.70$

या $\log K_b = -8.82 = \bar{9}.18$

$\therefore K_b = \text{Antilog } \bar{9}.18 = 1.5 \times 10^{-9}$

अतः पीरीडीन का आयनन स्थिरांक = 1.5×10^{-9}

उत्तर

प्रश्न 7.63. निम्नलिखित लवणों के जलीय विलयनों के उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय होने की प्रागुक्ति कीजिए—

NaCl, KBr, NaCN, $NH_4 NO_3$, $NaNO_2$ तथा KF

उत्तर—NaCl का जलीय विलयन उदासीन है।

KBr का जलीय विलयन उदासीन है।
 NaCN का जलीय विलयन क्षारक है।
 NH₄NO₃ का जलीय विलयन अम्लीय है।
 NaNO₂ का जलीय विलयन क्षारक है।
 KF का जलीय विलयन क्षारक है।

प्रश्न 7.64. क्लोरोएसीटिक अम्ल का आयनन स्थिरांक 1.35×10^{-3} है। 0.1 M अम्ल तथा इसके 0.1 M सोडियम लवण की pH ज्ञात कीजिए।

हल : $\text{CH}_2\text{ClCOOH} \rightleftharpoons \text{CH}_2\text{ClCOO}^- + \text{H}^+$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a C}$$

$$= \sqrt{1.35 \times 10^{-3} \times 0.1}$$

$$= 1.16 \times 10^{-2}$$

$$\therefore \text{pH} = -\log \text{H}^+ = -\log 1.16 \times 10^{-2} = 1.94$$

क्लोरोएसीटिक अम्ल का सोडियम लवण, प्रबल क्षारक NaOH तथा दुर्बल क्लोरोएसीटिक अम्ल ClCH₂COOH है।

$$\therefore \text{pH} = -\frac{1}{2} [\log K_w + \log K_a - \log c]$$

$$\text{या} \quad \text{pH} = -\frac{1}{2} [\log K_w + \log K_a - \log c]$$

$$\text{या} \quad \text{pH} = \frac{1}{2} [-\log K_w - \log K_a + \log c]$$

$$= \frac{1}{2} [14 - \log 1.35 \times 10^{-3} + \log 10^{-1}]$$

$$= 7.9$$

अतः $\text{pH} = 7.9$

अतः अम्लीय विलयन की pH = 1.9 तथा लवण विलयन की pH = 7.9

उत्तर

प्रश्न 7.65. 310 K पर जल का आयनिक गुणनफल 2.7×10^{-14} है। इसी तापक्रम पर उदासीन जल की pH ज्ञात कीजिए।

हल : 310 K ताप पर जल का आयनन गुणनफल

$$K_w = 2.7 \times 10^{-14}$$

$$\therefore [\text{H}^+] \times [\text{OH}^-] = 2.7 \times 10^{-14}$$

∴ जल उदासीन है।

$$\therefore [\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$$

$$\therefore [\text{H}^+]^2 = 2.7 \times 10^{-14}$$

$$\text{या} \quad [\text{H}^+] = \sqrt{2.7 \times 10^{-14}} = 1.64 \times 10^{-7} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 1.64 \times 10^{-7} = 6.78$$

अतः उदासीन जल का pH का मान = 6.78

उत्तर

प्रश्न 7.66. निम्नलिखित मिश्रणों की pH परिकलित कीजिए-

(क) 0.2 M Ca(OH)₂ का 10 mL + 0.1 M HCl का 25 mL

(ख) 0.01 M H₂SO₄ का 10 mL + 0.1 M Ca(OH)₂ का 10 mL

(ग) 0.1 M H₂SO₄ का 10 mL + 0.1 M KOH का 10 mL

हल : (क) ∴ 10 mL 0.2 M Ca(OH)₂, 0.4 M OH⁻ आयन बनाते हैं।

∴ 40 mL, 0.1 M OH⁻ आयन

$$25 \text{ mL } 0.1 \text{ M HCl} = 25 \text{ mL } 0.1 \text{ M OH}^-$$

शेष विलयन 15 mL 0.1 M OH⁻

$$\therefore \text{मोलन सान्द्रता OH}^- = \frac{0.1}{1000} \times 15 = 1.5 \times 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log(\text{OH}^-) = -\log 1.5 \times 10^{-3}$$

$$\text{pH} = 14 - 2.8 = 11.2$$

अतः अभीष्ट pH मान = 11.2

उत्तर

(ख) 10 mL 0.01 M H₂SO₄ अर्थात् 10 mL 0.02 M H⁺ आयन

10 mL 0.01 M Ca(OH)₂

∴ 10 mL 0.02 M OH⁻ आयन प्राप्त मिश्रण उदासीन होगा, जिसमें कोई आयन नहीं होगा।

अतः pH = 7.00

उत्तर

(ग) 10 mL 0.1 M H₂SO₄ अर्थात् 10 mL 0.2 M H⁺ आयन

(10 mL 0.1 M KOH अर्थात् 10 mL 0.1 M OH⁻ आयन शेष विलयन 0.1 M H⁺ 10 mL आयतन में होंगे।


$$\therefore \text{H}^+ = \frac{0.1 \times 10}{1000} = 1.0 \times 10^{-3}$$

$$\therefore \text{pH} = 3$$

अतः अभीष्ट pH का मान = 3

उत्तर

प्रश्न 7.67. सिल्वर क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, फेरिक हाइड्रॉक्साइड, लेड क्लोराइड तथा मर्क्यूरस आयोडाइड विलयन की सारणी में दिए गए विलेयता गुणनफल स्थिरांक की सहायता से विलेयता ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक आयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए।



$$K_{sp}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1.1 \times 10^{-12}$$

माना Ag₂CrO₄ की विलेयता = $s \text{ mol L}^{-1} \text{ mol L}^{-1}$

$$\therefore K_{sp} = [\text{Ag}^+]^2 [\text{CrO}_4^{2-}]$$

$$= (2s)^2 (s) = 4s^3$$

$$\therefore s = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1.1 \times 10^{-12}}{4}} = \sqrt[3]{0.275 \times 10^{-12}}$$

$$s = 0.65 \times 10^{-4} \text{ M}$$

Ag⁺ की विलेयता = $2s = 2 \times 0.65 \times 10^{-4} \text{ M} = 1.30 \times 10^{-4} \text{ M}$ तथा CrO₄²⁻ की मोलरता = 0.65×10^{-4} उत्तर




$$K_{sp} = 1.2 \times 10^{-10}$$

$$K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}] [\text{CrO}_4^{2-}] = s^2 = 1.2 \times 10^{-10}$$

∴ Ba²⁺ और CrO₄²⁻ की सान्द्रता $s = 1.1 \times 10^{-5} \text{ M}$

उत्तर



$$K_{sp} = 1.0 \times 10^{-38} = 27s^4$$

या $27s^4 = K_{sp} = 1.0 \times 10^{-38}$


या $s = \sqrt[4]{\frac{1.0 \times 10^{-38}}{27}} \text{ M} = 1.39 \times 10^{-10} \text{ M}$

Fe³⁺ आयन की सान्द्रता = $[s] = 1.39 \times 10^{-10} \text{ M}$

उत्तर

तथा $[\text{OH}^-] = 3s = 3.1 \times 1.39 \times 10^{-10} \text{ M} = 4.17 \times 10^{-10} \text{ M}$

लेड क्लोराइड PbCl_2



$$K_{sp} \text{PbCl}_2 = 1.6 \times 10^{-5}$$


$$K_{sp} [\text{Pb}^{2+}] [\text{Cl}^-]^2 = 4s^3$$

$$s = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1.6 \times 10^{-5}}{4}} = 1.59 \times 10^{-2} \text{ M}$$

Pb^{2+} आयन की मोलरता $s = 1.59 \times 10^{-2} \text{ M}$

तथा Cl^- आयन की मोलरता $= 2s = 2 \times 1.59 \times 10^{-2} \text{ M} = 3.18 \times 10^{-2} \text{ M}$

फैरस आयोडीन : मरक्यूरम आयोडीन



$$K_{sp} = 4.5 \times 10^{-29} \text{ (दिया है)}$$

$$K_{sp} = 4s^3$$

तथा

$$s = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{4.5 \times 10^{-29}}{4}} = 2.24 \times 10^{-10} \text{ M}$$

अतः Hg_2^{2+} आयन की सान्द्रता $= 2.24 \times 10^{-10} \text{ M}$


तथा I^- आयन की सान्द्रता $= 2 \times 2.24 \times 10^{-10} \text{ M} = 4.48 \times 10^{-10} \text{ M}$

प्रश्न 7.68. Ag_2CrO_4 तथा AgBr का विलेयता गुणफल स्थिरांक क्रमशः 1.1×10^{-12} तथा 5.0×10^{-13} है।

उनके संतृप्त विलयन की मोलरता का अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल : माना AgBr की विलेयता $= 5 \text{ M}$

$$K_{sp} (\text{AgBr}) = 5.0 \times 10^{-13}$$



$$K_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{Br}^-]$$


या

$$s \times s = s^2 = K_{sp}$$

या

$$4s = \sqrt{K_{sp}} = \sqrt{5.0 \times 10^{-13}} = 0.71 \times 10^{-6} \text{ M}$$

AgBr की विलेयता $= 0.71 \times 10^{-6} \text{ M}$



$$K_{sp} = [\text{Ag}^+]^2 [\text{CrO}_4^{2-}] = 1.1 \times 10^{-12}$$

या

$$s^3 = 1.1 \times 10^{-12}$$

$$s = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1.1 \times 10^{-12}}{4}} = 6.5 \times 10^{-5} \text{ M}$$


अतः Ag_2CrO_4 की विलेयता $= 6.5 \times 10^{-5} \text{ M}$

Ag_2CrO_4 की विलेयता AgBr से अधिक है।

अतः संतृप्त विलयन में इनकी मोलरता 91.9 Ag_2CrO_4 के अनुपात में है।

प्रश्न 7.69. यदि 0.002 M सान्द्रता वाले सोडियम आयोडेट तथा क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन के समान आयतन को


मिलाया जाए, तो कॉपर आयोडेट का उत्प्रेक्षण क्या होगा? (कॉपर आयोडेट के लिए $K_{sp} = 7.4 \times 10^{-8}$)



मिश्रण से पहले दोनों की सान्द्रता $= 0.002$

मिश्रण के बाद दोनों की सान्द्रता

$$[\text{IO}_3^-] = [\text{Cu}^{2+}] = \frac{0.002}{2} \text{ M} = 0.001 \text{ M}$$



$$\therefore K_{sp} [\text{Cu}(\text{IO}_3)_2] = 7.4 \times 10^{-4}$$

$$\text{या } [\text{Cu}^{2+}] = 0.001 \text{ M}$$

$$\text{तथा } [\text{IO}_3^-] = 0.001 \text{ M}$$

$$\therefore \text{आयनन गुणनफल} = [\text{Cu}^{2+}][\text{IO}_3^-]^2 = 10 \times 10^{-9}$$


इसलिए आयनन गुणनफल, विलेयता गुणनफल से कम है।

अतः कोई अवक्षेप नहीं बनेगा।

उत्तर

प्रश्न 7.70. बेन्जोइक अम्ल का आयनन स्थिरांक 6.46×10^{-5} तथा सिल्वर बेन्जोएट का $K_{sp} 2.5 \times 10^{-13}$ है।

3.19 pH वाले बफर विलयन में सिल्वर बेन्जोएट जल की तुलना में कितना गुना विलेय होगा?



जल में घुलनशीलता

माना सिल्वर बेन्जोएट की विलेयता $= x \text{ mol L}^{-1}$

$$\text{तब } [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] = [\text{Ag}^+] = x \text{ mol L}^{-1}$$

$$\therefore K_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]$$

$$\text{या } x \times x = x^2 = K_{sp} = 2.5 \times 10^{-13}$$

$$\text{या } x = \sqrt{K_{sp}} = \sqrt{2.5 \times 10^{-13}}$$

$$= 5.0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$$

\therefore बफर में विलेयता, जिसका pH मान = 3.19

$$3.19 = -\log \text{H}^+$$

$$\text{या } \log \text{H}^+ = 3.19 = \bar{4}.81$$

$$[\text{H}^+] = \text{Antilog } \bar{4}.81 = 6457 \times 10^{-4}$$

बफर विलयन के कारण $\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$ आयन H^+ आयन से बन्धकर बेन्जोइक अम्ल बनाता है, परन्तु H^+ स्थिर रहता

है।



$$K_a = \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]}$$

$$\text{या } \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]} = \frac{\text{H}^+}{K_a} = \frac{6457 \times 10^{-4}}{6.46 \times 10^{-5}} = 10 \quad \dots(i)$$

माना बफर विलयन में विलेयता $x \text{ mol L}^{-1}$ है, तब लगभग सम्पूर्ण बेन्जोएट आयन, बेन्जोइक अम्ल में बदल जाएगा।

$$\begin{aligned} Y &= [\text{Ag}^+] = [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] + [\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}] \\ &= [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] + 10[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] \end{aligned}$$

$$\therefore [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] = \frac{Y}{11}$$

$$K_{sp} = [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-][\text{Ag}^+] = [\text{Ag}^+]$$

$$2.5 \times 10^{-13} = \frac{Y}{11} \times Y$$

$$\begin{aligned} \text{या} \quad & y^2 = 2.75 \times 10^{-12} \\ \text{या} \quad & y = 1.66 \times 10^{-6} \\ \therefore \quad & \frac{y}{x} = \frac{1.66 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-7}} = 3.317 \end{aligned}$$

अतः कम pH मान पर सिल्वर बेंजोएट 3.317 गुना कम घुलनशील है।

उत्तर

प्रश्न 7.71. फेरस सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइड के सममोलर विलयनों की अधिकतम सान्द्रता बताइए, जब उनके समान आयतन मिलाने पर आयरन सल्फाइड अवक्षेपित न हो। (आयरन सल्फाइड के लिए, $K_{sp} = 6.3 \times 10^{-18}$)

हल : माना FeSO_4 तथा Na_2S की सान्द्रता $x \text{ mol L}^{-1}$ है।

समान आयतन में मिलाने पर,

$$[\text{FeSO}_4] = [\text{Na}_2\text{S}] = \frac{x}{2} \text{ M}$$

$$\therefore [\text{Fe}^{2+}] = [s] = \frac{x}{2} \text{ M}$$

$$\text{या} \quad K_{sp}[\text{FeS}] = 6.3 \times 10^{-18}$$

$$\text{या} \quad K_{sp} = [\text{Fe}^{2+}][s^{2-}] = \frac{x}{2} \times \frac{x}{2} = 6.3 \times 10^{-18}$$


$$\text{या} \quad x^2 = 25.2 \times 10^{-18}$$

$$\text{या} \quad x = 5.02 \times 10^{-9} \text{ M}$$

अतः विलयन की उच्चतम मोलरता = $2.5 \times 10^{-9} \text{ M}$

उत्तर

प्रश्न 7.72. 1 ग्राम कैल्सियम सल्फेट को घोलने के लिए कम-से-कम कितने आयतन जल की आवश्यकता होगी? (कैल्सियम सल्फेट के लिए, $K_{sp} = 9.1 \times 10^{-6}$)



यदि CaSO_4 की विलेयता $s \text{ Mol L}^{-1}$ है, तब

$$K_{sp} = [\text{Ca}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = s^2$$

$$\text{CaSO}_4 \text{ के लिए,} \quad K_{sp} = s^2 = 9.1 \times 10^{-6}$$

$$\therefore s = 3.02 \times 10^{-3} \text{ Mol L}^{-1}$$

$$\text{CaSO}_4 \text{ का आण्विक द्रव्यमान} = 136 \text{ g}$$

$$\therefore s = 3.02 \times 10^{-3} \times 136 \text{ g L}^{-1} \\ = 0.411 \text{ g L}^{-1}$$

अतः 0.411 g को घोलने के लिए 1 L जल की आवश्यकता हो।

या 1g को 2.43 L लीटर में घोला जा सकता है।

अतः कैल्सियम सल्फेट को घोलने के लिए कम-से-कम 2.43 लीटर जल की आवश्यकता होगी।

उत्तर

प्रश्न 7.73. 0.1 M HCl में हाइड्रोजन सल्फाइड से संतृप्त विलयन की सान्द्रता $1.0 \times 10^{-19} \text{ M}$ है। यदि इस विलयन का 10 mL निम्नलिखित 0.04 M विलयन के 5 mL डाला जाए, तो किन विलयनों से अवक्षेप प्राप्त होगा? FeSO_4 , MnCl_2 , ZnCl_2 एवं CdCl_2

हल : यदि आयनिक गुणनफल, विलेयता गुणनफल से अधिक है; तब अवक्षेप बनते हैं, क्योंकि १० स्थ विलयन में (जिसमें s^{2-} आयन हैं) 5 स्थ धातु लवण विलयन डाला है, इसलिए मिश्रण के बाद

$$[s^{2-}] = 1.0 \times 10^{-19} \times \frac{10}{15} = 6.67 \times 10^{-20}$$

$$[\text{Fe}^{2+}] = [\text{Mn}^{2+}] = [2n^{2+}] = [\text{Ca}^{+2}] \\ = \frac{5}{15} \times 0.04 = 1.33 \times 10^{-2} \text{ M}$$

प्रत्येक के लिए आयनन गुणनफल

$$[M^{2+}][S^{2-}] = 8.87 \times 10^{-22}$$

यह आयनन गुणनफल $ZnS (1.6 \times 10^{-24})$ $CdS (8.0 \times 10^{-27})$ के विलेयता गुणनफल से अधिक है; परन्तु $[FeS 1.3 \times 10^{-18}]$ एवं $MnS (2.5 \times 10^{-13})$ से कम है।

अतः कुल चार स्पीशीज में केवल $ZnCl_2$ एवं $CdCl_2$ के अवक्षेप बनेंगे।

eVidyarthi