

अध्याय 3

त्रिकोणमितीय फलन

Trigonometric Functions

प्रश्नावली 3.1

प्रश्न 1. निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए।

- (i) 25° (ii) $-47^\circ 30'$ (iii) 240° (iv) 520°

डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए सौदे $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ रेडियन का प्रयोग करते हैं।

हल

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad 25^\circ &= 25 \times \frac{\pi}{180} \text{ रेडियन} = \frac{25\pi}{180} \text{ रेडियन} & \left[\because 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ रेडियन} \right] \\
 \text{(ii)} \quad -47^\circ 30' &= -\left(47 + \frac{30}{60}\right)^\circ = -\left(47 + \frac{1}{2}\right)^\circ & \left[\because 1' = \left(\frac{1}{60}\right)^\circ \right] \\
 &= -\left(\frac{94 + 1}{2}\right)^\circ = -\frac{95}{2}^\circ = -\frac{95}{2} \times \frac{\pi}{180} \text{ रेडियन} = -\frac{19\pi}{72} \text{ रेडियन} \\
 \text{(iii)} \quad 240^\circ &= 240 \times \frac{\pi}{180} \text{ रेडियन} = \frac{4\pi}{3} \text{ रेडियन} \\
 \text{(iv)} \quad 520^\circ &= 520 \times \frac{\pi}{180} \text{ रेडियन} = \frac{26\pi}{9} \text{ रेडियन}
 \end{aligned}$$

नोट भाग (i) में, याद रखें कि दी गई संख्या को सबसे पहले डिग्री में परिवर्तित करें। तरपरवात इसको रेडियन में परिवर्तित करें।

प्रश्न 2. निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए।

$\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$ का प्रयोग करें।

- (i) $\left(\frac{11}{16}\right)$ (ii) -4 (iii) $\frac{5\pi}{3}$ (iv) $\frac{7\pi}{6}$

रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए हमेशा $1^\circ = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$ का प्रयोग करते हैं तथा तब $\pi = \left(\frac{22}{7}\right)$ का मान रखते हैं।

$$\begin{aligned}
 \text{हल} \quad \text{(i)} \quad \left(\frac{11}{16}\right)^\circ &= \left(\frac{11}{16} \times \frac{180}{\pi}\right)^\circ = \left(\frac{11}{8} \times \frac{90}{22} \times 7\right)^\circ = \left(\frac{45 \times 7}{8}\right)^\circ & \left[\because 1^\circ = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \right] \\
 &= \left(\frac{315}{8}\right)^\circ = 39^\circ + \left(\frac{3}{8}\right)^\circ = 39^\circ + \frac{3}{8} \times 60' & (\because 1^\circ = 60') \\
 &= 39^\circ + \left(\frac{45}{2}\right)' \\
 &= 39^\circ + 22' + \frac{1}{2}' \\
 &= 39^\circ 22' + \frac{1 \times 60''}{2} = 39^\circ 22' 30'' & (\because 1' = 60'')
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(ii)} -4^{\circ} &= -\left(4 \times \frac{180}{\pi}\right)^{\circ} = -\left(4 \times \frac{180}{22} \times 7\right)^{\circ} \\
 &= -\left(\frac{2 \times 1260}{11}\right)^{\circ} = -\left(\frac{2520}{11}\right)^{\circ} = -\left[229^{\circ} + \left(\frac{1}{11}\right)^{\circ}\right] \\
 &= -\left(229^{\circ} + \frac{1}{11} \times 60'\right) \\
 &= -\left(229^{\circ} + 5' + \left(\frac{5}{11}\right)'\right) \\
 &= -\left(229^{\circ} 5' + \frac{5}{11} \times 60''\right) \\
 &= -\left(229^{\circ} 5' 27''\right) \quad (\text{लगभग})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iii)} \left(\frac{5\pi}{3}\right)^{\circ} &= \left(\frac{5\pi}{3} \times \frac{180}{\pi}\right)^{\circ} = 300^{\circ} \\
 \text{(iv)} \left(\frac{7\pi}{6}\right)^{\circ} &= \left(\frac{7\pi}{6} \times \frac{180}{\pi}\right)^{\circ} = 210^{\circ}
 \end{aligned}$$

$$\left[\because 1^{\circ} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^{\circ} \right]$$

नोट यौंसा कि भाग (i), (iii) तथा (iv) में है कि, यदि संख्याओं का भाग, जिन में है, तब हल करने के लिए वह जरूरी हो जाता है कि इसे मिनट तथा सेकण्ड में परिवर्तित कर लेना चाहिए। भाग (ii) में ज्ञानात्मक जिन्हे केवल दक्षिणाधर्त दिशा को प्रवर्तित करता है, जब तक प्रश्न को हल किया जाता है, तब तक व्यंजक के बाहर कोणक लगाना चाहिए।

प्रश्न 3. एक पृष्ठिाए एक मिनट में 360° परिक्रमण करता है, तो एक सेकण्ड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा?

हल 1 मिनट में, पृष्ठिे के परिक्रमणों की संख्या = 360

अर्थात् 60 सेकण्ड में, पृष्ठिे के परिक्रमणों की संख्या = 360

$\therefore 1$ सेकण्ड में, पृष्ठिे के परिक्रमणों की संख्या = $\frac{360}{60} = 6$

1 परिक्रमण में घुमा कोण = $360^{\circ} = 2\pi$

6 परिक्रमण में घुमा कोण = $2\pi \times 6 = 12\pi$ रेडियन

प्रश्न 4. एक वृत्त, जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है, की 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग कीजिए)

यदि एक वृत्त की त्रिज्या / तथा चाप की लंबाई / है जो वृत्त के केंद्र पर 8 कोण अंतरित करता है, तब हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं

$$\theta = \frac{l}{r}, \quad \text{अर्थात् कोण} = \frac{\text{चाप}}{\text{त्रिज्या}}$$

हल यहाँ, $l = 22$ सेमी तथा $r = 100$ सेमी

निम्न सूत्र का प्रयोग करने पर,

$$\theta = \frac{l}{r}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \theta &= \frac{22}{100} = \frac{11}{50} \text{ रेडियन} \\
 &= \left(\frac{11}{50} \times \frac{180}{\pi} \right)^\circ = \left(\frac{11 \times 18 \times 7}{5 \times 22} \right)^\circ = \left(\frac{63}{5} \right)^\circ \\
 &= 12^\circ + \left(\frac{3}{5} \right)^\circ \\
 &= 12^\circ + \frac{3}{5} \times 60' \\
 &= 12^\circ 36' \quad (\because 1^\circ = 60')
 \end{aligned}$$

प्रश्न 5. एक वृत्त, जिसका व्यास 40 सेमी है, की एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए।

हल दिया है, व्यास = 40 सेमी


$$\therefore \text{त्रिज्या } CA = CB = \frac{\text{व्यास}}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ सेमी}$$

तथा जीवा $AB = 20$ सेमी

अब चिकित्सानुसार, त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, अतः यह एक समानांतर त्रिभुज है।

अब, निम्न सूत्र का प्रयोग करने पर,

$$\begin{aligned}
 \theta &= \frac{l}{r} \\
 60 \times \frac{\pi}{180} &= \frac{AB}{20} \\
 \Rightarrow AB &= 60^\circ \times 20 \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{20\pi}{3} \text{ सेमी}
 \end{aligned}$$



नोट सूत्र $\theta = \frac{l}{r}$ में हमेशा यह याद रखें कि θ रेडियन में मापा जाता है। अतः जब मी इस सूत्र का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करते हैं।

प्रश्न 6. यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60° तथा 75° के कोण बनाते हों, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

सबसे पहले, सूत्र $\theta = \frac{l}{r}$ का प्रयोग करते हुए हम दोनों वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करते हैं और तब उनका अनुपात प्राप्त करते हैं।


हल $\theta = \frac{l}{r}$ सूत्र का प्रयोग करने पर,

$$\text{प्रथम वृत्त के लिए, } 60 \times \frac{\pi}{180} = \frac{l}{r} \quad \dots(i)$$

तथा छिरीय वृत्त के लिए,

$$75 \times \frac{\pi}{180} = \frac{l}{r}$$

...(i)



राशी (i) को राशी (ii) से भाग करने पर,

$$\frac{60 \times \frac{\pi}{180}}{75 \times \frac{\pi}{180}} = \frac{l}{r_1}$$

$$\frac{60}{75} = \frac{l}{r_1}$$

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow r_1 : r_2 = 5 : 4$$

प्रश्न 7. 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके ऊपर द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित हैं

- (i) 10 सेमी (ii) 15 सेमी (iii) 21 सेमी


$$\theta = \frac{l}{r} \text{ सूत्र का प्रयोग कीजिए।}$$

हल


$$(i) \theta = \frac{10}{75} = \frac{2}{15} \text{ रेडियन}$$



$$(ii) \theta = \frac{15}{75} = \frac{1}{5} \text{ रेडियन}$$



$$(iii) \theta = \frac{21}{75} = \frac{7}{25} \text{ रेडियन}$$



प्रश्नावली 3.2

निर्देश (प्र. सं. 1 - 5) निम्नलिखित प्रश्नों में पाँच अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए।

सभी त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले सर्वसमिका $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ का प्रयोग करते हुए हमें $\sin x$ तथा $\cos x$ को ज्ञात करना चाहिए। इसके बाद हम आसानी से अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को भी ज्ञात कर सकते हैं। सभी त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त होने के बाद हमें चतुर्थीय के आधार पर ही विन्ही को लागू करना चाहिए।

प्रश्न 1. $\cos x = -\frac{1}{2}$, x तीसरे चतुर्थीय में स्थित है।

हल $\cos x = -\frac{1}{2}$

दिया है, x तीसरे चतुर्थीय में स्थित है।

अर्थात्

$$\pi < x < \frac{3\pi}{2}$$

हम जानते हैं कि $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \sin^2 x &= 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \\ \sin^2 x &= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \\ \Rightarrow \quad \sin x &= \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

इसी तीसरे चतुर्थीय में $\sin x$ ऋणात्मक होता है, अतः हम यहाँ पर घनात्मक चिन्ह छोड़ देंगे।

अर्थात् $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

अब, $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$, $\cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

तथा $\sec x = \frac{1}{\cos x} = -2$, $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x} = -\frac{2}{\sqrt{3}}$

नोट हमें यदि रखें कि घनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग त्रिकोणमितीय फलनों को उनके चतुर्थीयों में विचरण के द्वारा ही करना चाहिए।

प्रश्न 2. $\sin x = \frac{3}{5}$, x दूसरे चतुर्थीय में स्थित है।

हल $\sin x = \frac{3}{5}$

दिया है, x दूसरे चतुर्थीय में स्थित है।

अर्थात् $\frac{\pi}{2} < x < \pi$
 $\therefore \sin^2 x + \cos^2 x = 1$
 $\Rightarrow \cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{25 - 9}{25} = \frac{16}{25}$
 $\Rightarrow \cos x = \pm \frac{4}{5}$
 \therefore द्वितीय चतुर्थांश में $\cos x$ ऋणात्मक होता है, अतः हम यहाँ पर इसका घनात्मक विन्ह छोड़ देंगे।

अर्थात् $\cos x = -\frac{4}{5} \Rightarrow \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{-\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}$
 $\cot x = \frac{1}{\tan x} = -\frac{4}{3}$,
 $\sec x = \frac{1}{\cos x} = -\frac{5}{4}$ तथा $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x} = \frac{5}{3}$

प्रश्न 3. $\cot x = \frac{3}{4}$, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है।

हल $\cot x = \frac{3}{4}$

दिया है, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है।

अर्थात् $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$
 $\Rightarrow \tan x = \frac{1}{\cot x} = \frac{4}{3}$
 $\therefore \sec^2 x = \tan^2 x + 1 = \frac{16}{9} + 1$
 $\sec^2 x = \frac{25}{9} \Rightarrow \sec x = \pm \frac{5}{3}$

$\therefore x$ तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, जिसमें $\cos x$ ऋणात्मक होता है। अतः हम यहाँ पर ऋणात्मक विन्ह लेंगे।

अर्थात् $\sec x = -\frac{5}{3} \Rightarrow \cos x = -\frac{3}{5}$
 $\therefore \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{\sin x}{-\frac{3}{5}}$
 $\Rightarrow \sin x = -\frac{4}{5}$
 $\text{तथा } \operatorname{cosec} x = -\frac{5}{4}$

प्रश्न 4. $\sec x = \frac{13}{5}$, x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है।

हल $\sec x = \frac{13}{5}$

दिया है, x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है।

अर्थात्

$$\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \Rightarrow \cos x = \frac{5}{13}$$

\therefore

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\Rightarrow \sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{169 - 25}{169} = \frac{144}{169} = \left(\frac{12}{13}\right)^2$$

$$\Rightarrow \sin x = \pm \frac{12}{13}$$

पैकी x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, जिसमें $\sec x$ ऋणात्मक होता है, अतः हम यहाँ पर केवल ऋणात्मक चिन्ह लेंगे।

अर्थात्

$$\sin x = -\frac{12}{13}$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{-\frac{12}{13}}{\frac{5}{13}} = -\frac{12}{5}$$

$$\Rightarrow \csc x = \frac{1}{\sin x} = -\frac{13}{12}, \cot x = \frac{1}{\tan x} = -\frac{5}{12}$$

प्रश्न 5. $\tan x = -\frac{5}{12}$, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है।

$$\text{हल } \tan x = -\frac{5}{12}$$

दिया है, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है।

अर्थात्

$$\frac{\pi}{2} < x < \pi$$

$$\cot x = \frac{1}{\tan x} = -\frac{12}{5}$$

$$\text{अब, } \sec^2 x = 1 + \tan^2 x = 1 + \left(-\frac{5}{12}\right)^2 = 1 + \frac{25}{144} = \frac{169}{144}$$

$$\sec^2 x = \left(\frac{13}{12}\right)^2 \Rightarrow \sec x = \pm \frac{13}{12}$$

$\therefore x$ द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, जिसमें $\tan x$ ऋणात्मक होता है।

अतः हम यहाँ पर केवल ऋणात्मक चिन्ह लेंगे।

\therefore

$$\sec x = -\frac{13}{12}$$

\Rightarrow

$$\cos x = \frac{1}{\sec x} = \frac{-12}{13}$$

अब,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

\Rightarrow

$$-\frac{5}{12} = \frac{\sin x}{\frac{-12}{13}} \Rightarrow \sin x = \frac{5}{13}$$

तथा

$$\csc x = \frac{1}{\sin x} = \frac{13}{5}$$

निर्देश (प्र. सं. 6 - 10) निम्नलिखित चौंच प्रश्नों में त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए।

यदि कोण 360° से अधिक दिया है, तब हमें दिए गए कोण को 360° के गुणक के रूप में बदलने का प्रयास करना चाहिए। जिससे इसको हल करना आसान हो जाता है।

प्रश्न 6. $\sin 765^\circ$

$$\text{हल} \quad \sin 765^\circ = \sin (360 \times 2 + 45)^\circ = \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad [\because \sin(2n\pi + \theta) = \sin \theta]$$

प्रश्न 7. $\operatorname{cosec}(-1410^\circ)$

$$\begin{aligned} \text{हल} \quad \operatorname{cosec}(-1410^\circ) &= -\operatorname{cosec}(1410^\circ) & [\because \operatorname{cosec}(-\theta) = -\operatorname{cosec} \theta] \\ &= -\operatorname{cosec}(360 \times 4 - 30)^\circ \\ &= -(-\operatorname{cosec} 30^\circ) \\ &= \operatorname{cosec} 30^\circ = 2 & [\because \operatorname{cosec}(2n\pi - \theta) = -\operatorname{cosec} \theta] \end{aligned}$$

नोट यह भी आपको प्रश्न में त्रिकोणमितीय फलन के कोण के साथ ऋणात्मक विन्ह दिया होता है, तब सबसे पहले आप सूत्र $\sin(-x) = -\sin x$ तथा $\cos(-x) = \cos x$ का प्रयोग करते हुए ऋणात्मक विन्ह को त्रिकोणमितीय फलन से बाहर ले आना चाहिए, यह आपकी गणना को आसान बना देता है।

प्रश्न 8. $\tan \frac{19\pi}{3}$

$$\begin{aligned} \text{हल} \quad \tan \frac{19\pi}{3} &= \tan \left(6\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \tan \left(2\pi \times 3 + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} & [\because \tan(2n\pi + \theta) = \tan \theta] \end{aligned}$$

प्रश्न 9. $\sin\left(-\frac{11\pi}{3}\right)$

$$\begin{aligned} \text{हल} \quad \sin\left(-\frac{11\pi}{3}\right) &= -\sin\left(\frac{11\pi}{3}\right) & [\because \sin(-\theta) = -\sin \theta] \\ &= -\sin\left(4\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(2\pi \times 2 - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= -\left(-\sin \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} & [\because \sin(2n\pi - \theta) = -\sin \theta] \end{aligned}$$

प्रश्न 10. $\cot\left(-\frac{15\pi}{4}\right)$

$$\begin{aligned} \text{हल} \quad \cot\left(-\frac{15\pi}{4}\right) &= -\cot\left(\frac{15\pi}{4}\right) & [\because \cot(-\theta) = -\cot \theta] \\ &= -\cot\left(4\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\cot\left(2\pi \times 2 - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= -\left(-\cot \frac{\pi}{4}\right) = \cot \frac{\pi}{4} = 1 & [\because \cot(2n\pi - \theta) = -\cot \theta] \end{aligned}$$

प्रश्नावली 3.3

प्रश्न 1. सिद्ध कीजिए $\sin^2 \frac{\pi}{6} + \cos^2 \frac{\pi}{3} - \tan^2 \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2}$

हल सिद्ध करना है $\sin^2 \frac{\pi}{6} + \cos^2 \frac{\pi}{3} - \tan^2 \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2}$

$$\text{बायीं पक्ष} = \sin^2 \frac{\pi}{6} + \cos^2 \frac{\pi}{3} - \tan^2 \frac{\pi}{4} \\ = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - (1)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} = \text{दायीं पक्ष}$$

\therefore बायीं पक्ष = दायीं पक्ष इति सिद्धम्

प्रश्न 2. सिद्ध कीजिए $2 \sin^2 \frac{\pi}{6} + \operatorname{cosec}^2 \frac{7\pi}{6} \cos^2 \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}$

यदि प्रश्न में किसी त्रिकोणमितीय फलान का कोण $\frac{\pi}{2}$ से अधिक होता है, तब यस्तुर्धा निकाय का प्रयोग करके हम उस कोण को विभक्त कर लेते हैं। तत्पश्चात् आसानी से सरल करते हैं।

हल सिद्ध करना है $2 \sin^2 \frac{\pi}{6} + \operatorname{cosec}^2 \frac{7\pi}{6} \cos^2 \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \text{बायीं पक्ष} &= 2 \sin^2 \frac{\pi}{6} + \operatorname{cosec}^2 \frac{7\pi}{6} \cos^2 \frac{\pi}{3} \\ &= 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \operatorname{cosec}^2 \left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) \cos^2 \frac{\pi}{3} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} + \operatorname{cosec}^2 \frac{\pi}{6} \cos^2 \frac{\pi}{3} \quad [\because \operatorname{cosec}(\pi + \theta) = -\operatorname{cosec} \theta] \\ &= \frac{1}{2} + (2)^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} = \text{दायीं पक्ष} \end{aligned}$$

\therefore बायीं पक्ष = दायीं पक्ष इति सिद्धम्

प्रश्न 3. सिद्ध कीजिए $\cot^2 \frac{\pi}{6} + \operatorname{cosec} \frac{5\pi}{6} + 3 \tan^2 \frac{\pi}{6} = 6$

हल सिद्ध करना है $\cot^2 \frac{\pi}{6} + \operatorname{cosec} \frac{5\pi}{6} + 3 \tan^2 \frac{\pi}{6} = 6$

$$\begin{aligned} \text{बायीं पक्ष} &= \cot^2 \frac{\pi}{6} + \operatorname{cosec} \frac{5\pi}{6} + 3 \tan^2 \frac{\pi}{6} \\ &= (\sqrt{3})^2 + \operatorname{cosec} \left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) + 3 \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \\ &= 3 + \operatorname{cosec} \frac{\pi}{6} + 3 \times \frac{1}{3} \quad [\because \operatorname{cosec}(\pi - \theta) = \operatorname{cosec} \theta] \\ &= 3 + 2 + 1 = 6 = \text{दायीं पक्ष} \end{aligned}$$

\therefore बायीं पक्ष = दायीं पक्ष इति सिद्धम्

प्रश्न 4. सिद्ध कीजिए $2 \sin^2 \frac{3\pi}{4} + 2 \cos^2 \frac{\pi}{4} + 2 \sec^2 \frac{\pi}{3} = 10$

हल सिद्ध करना है $2 \sin^2 \frac{3\pi}{4} + 2 \cos^2 \frac{\pi}{4} + 2 \sec^2 \frac{\pi}{3} = 10$

$$\begin{aligned}\text{दायीं पक्ष} &= 2 \sin^2 \frac{3\pi}{4} + 2 \cos^2 \frac{\pi}{4} + 2 \sec^2 \frac{\pi}{3} \\&= 2 \sin^2 \left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) + 2 \cos^2 \frac{\pi}{4} + 2 \sec^2 \frac{\pi}{3} \\&= 2 \sin^2 \frac{\pi}{4} + 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 2(2)^2 \quad [\because \sin(\pi - \theta) = \sin \theta] \\&= 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 2 \times \frac{1}{2} + 2 \times 4 = 1 + 1 + 8 = 10 = \text{दायीं पक्ष}\end{aligned}$$

∴ दायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 5. निम्न के मान ज्ञात कीजिए। (i) $\sin 75^\circ$ (ii) $\tan 15^\circ$

दिए हुए त्रिकोणमितीय फलनों के बीचों कोण $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ तथा $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ लिखने पर, क्योंकि कोण 45° तथा 30° त्रिकोणमितीय फलनों में आसानी से याद रखे जा सकते हैं। इसके बाद सूत्र $\sin(A+B)$ तथा $\tan(A-B)$ का प्रयोग करते हैं।

हल

$$\begin{aligned}(i) \quad \sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) \quad [\because \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B] \\&= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\&= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(ii) \quad \tan 15^\circ &= \tan(45^\circ - 30^\circ) \quad \left[\because \tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}\right] \\&= \frac{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 30^\circ} \\&= \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} \\&= \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} \times \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1} = \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{3-1} \\&= \frac{3+1-2\sqrt{3}}{2} = \frac{4-2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}\end{aligned}$$

प्रश्न 6. सिद्ध कीजिए $\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - y\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - y\right)$

$$= \sin(x+y)$$

यहाँ पर दिए हुए व्यजक के दायीं पक्ष को संपूर्ण करने के लिए सर्वसमिका

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$
 का उपयोग कीजिए।

हल सिद्ध करना है $\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - y\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - y\right) = \sin(x + y)$

\therefore दायीं पक्ष $= \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - y\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - y\right)$

माना $\frac{\pi}{4} - x = A$ तथा $\frac{\pi}{4} - y = B$

तब, दायीं पक्ष $= \cos A \cos B - \sin A \sin B = \cos(A + B)$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{4} - x + \frac{\pi}{4} - y\right)$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} - x - y\right) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - (x + y)\right]$$

$$= \sin(x + y) = \text{दायीं पक्ष}$$

\therefore दायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 7. सिद्ध कीजिए $\frac{\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} = \frac{(1 + \tan x)^2}{(1 - \tan x)}$

दिए हुए अंजक के बाएँ पक्ष को विस्तारित करने के लिए हम सर्वसमिका

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$
 का प्रयोग कर सकते हैं, जहां $\frac{\pi}{4}$ को A तथा x को B की

तरह मानते हैं।

हल सिद्ध करना है $\frac{\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} = \frac{(1 + \tan x)^2}{(1 - \tan x)}$

$$\text{दायीं पक्ष} = \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} = \frac{\tan\frac{\pi}{4} + \tan x}{1 - \tan\frac{\pi}{4} \tan x} \times \frac{1 + \tan\frac{\pi}{4} \tan x}{\tan\frac{\pi}{4} - \tan x}$$

$$\left[\because \tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} \text{ तथा } \tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B} \right]$$

$$= \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} \times \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = \frac{(1 + \tan x)^2}{(1 - \tan x)} = \text{दायीं पक्ष}$$

\therefore दायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 8. सिद्ध कीजिए $\frac{\cos(\pi + x) \cos(-x)}{\sin(\pi - x) \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} = \cot^2 x$

हल सिद्ध करना है $\frac{\cos(\pi + x) \cos(-x)}{\sin(\pi - x) \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} = \cot^2 x$

$$\begin{aligned} \text{बायीं पक्ष} &= \frac{\cos(\pi+x)\cos(-x)}{\sin(\pi-x)\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)} = \frac{(-\cos x)(\cos x)}{(\sin x)(-\sin x)} \\ &= \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = \cot^2 x = \text{दायीं पक्ष} \\ \therefore \quad \text{बायीं पक्ष} &= \text{दायीं पक्ष} \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{l} \because \cos(\pi+\theta) = -\cos\theta \\ \cos(-\theta) = \cos\theta \\ \sin(\pi-\theta) = \sin\theta \\ \sin(-\theta) = -\sin\theta \end{array} \right]$$

इति सिद्धम्

प्रश्न 9. सिद्ध कीजिए

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)\cos(2\pi+x)\left[\cot\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)+\cot(2\pi+x)\right] = 1$$

$$\text{हल} \quad \text{सिद्ध करना है} \quad \cos\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)\cos(2\pi+x)\left[\cot\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)+\cot(2\pi+x)\right] = 1$$

$$\begin{aligned} \text{बायीं पक्ष} &= \cos\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)\cos(2\pi+x)\left[\cot\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)+\cot(2\pi+x)\right] \\ &= (\sin x)(\cos x)[\tan x + \cot x] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \sin x \cos x \left(\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} \right) \quad \left[\begin{array}{l} \because \cot\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right) = \tan\theta \\ \cos\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right) = \sin\theta \end{array} \right] \\ &= \sin x \cos x \left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x \sin x} \right) = 1 = \text{दायीं पक्ष} \end{aligned}$$

$$\therefore \quad \text{बायीं पक्ष} = \text{दायीं पक्ष}$$

इति सिद्धम्

प्रश्न 10. सिद्ध कीजिए

$$\sin(n+1)x \sin(n+2)x + \cos(n+1)x \cos(n+2)x = \cos x$$

बायीं पक्ष को सरल करने के लिए $\cos(A-B) = \cos A \cdot \cos B + \sin A \cdot \sin B$
सूत्र का प्रयोग कीजिए।

$$\text{हल} \quad \text{सिद्ध करना है} \quad \sin(n+1)x \sin(n+2)x + \cos(n+1)x \cos(n+2)x = \cos x$$

$$\begin{aligned} \text{बायीं पक्ष} &= \sin(n+1)x \sin(n+2)x + \cos(n+1)x \cos(n+2)x \\ &= \cos((n+2)x - (n+1)x) \quad [\because \cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B] \\ &= \cos(nx + 2x - nx - x) = \cos x = \text{दायीं पक्ष} \end{aligned}$$

$$\therefore \quad \text{बायीं पक्ष} = \text{दायीं पक्ष}$$

इति सिद्धम्

प्रश्न 11. सिद्ध कीजिए $\cos\left(\frac{3\pi}{4}+x\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{4}-x\right) = -\sqrt{2} \sin x$

यहाँ पर हम परिणाम को आसानी से प्राप्त करने के लिए

$$\cos C - \cos D = -2 \sin\left(\frac{C+D}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{C-D}{2}\right), \text{ सूत्र का प्रयोग करेंगे।}$$

हल सिद्ध करना है $\cos\left(\frac{3\pi}{4} + x\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{4} - x\right) = -\sqrt{2} \sin x$

$$\text{बायीं पक्ष} = \cos\left(\frac{3\pi}{4} + x\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{4} - x\right)$$

$$= -2 \sin \frac{\frac{3\pi}{4} + x + \frac{3\pi}{4} - x}{2} \sin \frac{\frac{3\pi}{4} + x - \frac{3\pi}{4} + x}{2}$$

(सूत्र द्वारा)

$$= -2 \sin \frac{3\pi}{4} \sin x = -2 \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \sin x$$

$$= -2 \sin \frac{\pi}{4} \sin x = -2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x = -\sqrt{2} \sin x = \text{दायीं पक्ष}$$

∴ बायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 12. सिद्ध कीजिए $\sin^2 6x - \sin^2 4x = \sin 2x \sin 10x$

व्यंजक के बाएँ पक्ष को सरल करने के लिए हम सूत्र

$$\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A+B) \sin(A-B)$$

का प्रयोग करेंगे, जिससे परिणाम आसानी से प्राप्त होगा।

हल सिद्ध करना है $\sin^2 6x - \sin^2 4x = \sin 2x \sin 10x$

$$\text{बायीं पक्ष} = \sin^2 6x - \sin^2 4x = \sin(6x+4x) \sin(6x-4x)$$

$$= \sin 10x \sin 2x = \text{दायीं पक्ष}$$

∴ बायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 13. सिद्ध कीजिए $\cos^2 2x - \cos^2 6x = \sin 4x \cdot \sin 8x$

यहाँ पर ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है जो $\cos^2 A - \cos^2 B$ के रूप का हो, इसलिए सबसे पहले हमें व्यंजक के बाएँ पक्ष को $\sin^2 A - \sin^2 B$ के रूप में परिवर्तित करना होगा, जिसके लिए हमें सर्वसमिका $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ की आवश्यकता होगी, इसके बाद हम इसे आसानी से सरल कर सकते हैं।

हल सिद्ध करना है $\cos^2 2x - \cos^2 6x = \sin 4x \sin 8x$

$$\text{बायीं पक्ष} = \cos^2 2x - \cos^2 6x$$

$$= (1 - \sin^2 2x) - (1 - \sin^2 6x) \quad (\because \sin^2 A + \cos^2 A = 1)$$

$$= \sin^2 6x - \sin^2 2x$$

$$= \sin(6x+2x) \sin(6x-2x) \quad [\because \sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A+B) \sin(A-B)]$$

$$= \sin 8x \sin 4x = \text{दायीं पक्ष}$$

∴ बायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 14. सिद्ध कीजिए $\sin 2x + 2 \sin 4x + \sin 6x = 4 \cos^2 x \cdot \sin 4x$

हल सिद्ध करना है $\sin 2x + 2 \sin 4x + \sin 6x = 4 \cos^2 x \sin 4x$

$$\text{बायीं पक्ष} = \sin 2x + 2 \sin 4x + \sin 6x = \sin 6x + \sin 2x + 2 \sin 4x$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \sin \frac{6x+2x}{2} \cos \frac{6x-2x}{2} + 2 \sin 4x \\
 &\quad \left[\because \sin A + \sin B = 2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) \right] \\
 &= 2 \sin 4x \cos 2x + 2 \sin 4x = 2 \sin 4x (\cos 2x + 1) \\
 &= 2 \sin 4x (2 \cos^2 x - 1 + 1) = 2 \sin 4x 2 \cos^2 x = 4 \cos^2 x \sin 4x \\
 &= \text{दायरी पक्ष}
 \end{aligned}$$

बायरी पक्ष = दायरी पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 15. सिद्ध कीजिए $\cot 4x (\sin 5x + \sin 3x) = \cot x (\sin 5x - \sin 3x)$

कभी-कभी बाईं पक्ष को दाईं पक्ष के बराबर आसानी से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में, हम दोनों पक्षों को अलग-अलग सरल करते हैं, तत्परतात् दोनों पक्षों को बराबर दिखा देते हैं।

हल सिद्ध करना है $\cot 4x (\sin 5x + \sin 3x) = \cot x (\sin 5x - \sin 3x)$

$$\text{दायरी पक्ष} = \cot 4x (\sin 5x + \sin 3x) = \cot 4x \cdot 2 \sin \frac{5x+3x}{2} \cos \frac{5x-3x}{2}$$

$$\left(\because \sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2} \right)$$

$$= \frac{\cos 4x}{\sin 4x} \times 2 \sin 4x \cos x = 2 \cos 4x \cos x$$

$$\text{दायरी पक्ष} = \cot x (\sin 5x - \sin 3x) = \cot x \cdot 2 \cos \frac{5x+3x}{2} \sin \frac{5x-3x}{2}$$

$$\left(\because \sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2} \right)$$

$$= \frac{\cos x}{\sin x} \times 2 \cos 4x \sin x = 2 \cos 4x \cos x$$

बायरी पक्ष = दायरी पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 16. सिद्ध कीजिए $\frac{\cos 9x - \cos 5x}{\sin 17x - \sin 3x} = - \frac{\sin 2x}{\cos 10x}$

दिए गए व्यंजक के बाईं पक्ष में, अंश में cos तथा हर में sin उपस्थित है, इसलिए हम पिछा सूत्रों

$$\cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}$$

$$\text{तथा } \sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}$$

का प्रयोग करता: अंश और हर में बनेंगे।

$$\text{हल सिद्ध करना है } \frac{\cos 9x - \cos 5x}{\sin 17x - \sin 3x} = - \frac{\sin 2x}{\cos 10x}$$

$$\text{दायरी पक्ष} = \frac{\cos 9x - \cos 5x}{\sin 17x - \sin 3x} = \frac{-2 \sin \frac{9x+5x}{2} \sin \frac{9x-5x}{2}}{2 \cos \frac{17x+3x}{2} \sin \frac{17x-3x}{2}}$$

(खंड द्वारा)

$$= \frac{-\sin 7x \sin 2x}{\cos 10x \sin 7x}$$

$$= -\frac{\sin 2x}{\cos 10x} = \text{दायीं पक्ष}$$

\therefore बायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 17. सिद्ध कीजिए $\frac{\sin 5x + \sin 3x}{\cos 5x + \cos 3x} = \tan 4x$

ब्यजक का बायीं पक्ष भिन्न रूप का है जिसके अंश में sin तथा हर में cos है, अंश तथा हर को संयुक्त करने के लिए हम क्रमशः

$$\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$$

$$\text{तथा } \cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$$

सूत्रों का प्रयोग अंश व हर में करेगे।

हल सिद्ध करना है $\frac{\sin 5x + \sin 3x}{\cos 5x + \cos 3x} = \tan 4x$

$$\text{बायीं पक्ष} = \frac{\sin 5x + \sin 3x}{\cos 5x + \cos 3x} = \frac{2 \sin \frac{5x+3x}{2} \cos \frac{5x-3x}{2}}{2 \cos \frac{5x+3x}{2} \cos \frac{5x-3x}{2}}$$

$$= \frac{\sin 4x \cdot \cos x}{\cos 4x \cdot \cos x} = \tan 4x = \text{दायीं पक्ष}$$

\therefore बायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 18. सिद्ध कीजिए $\frac{\sin x - \sin y}{\cos x + \cos y} = \tan \frac{x-y}{2}$

ब्यजक के बाएं पक्ष को सरल करने के लिए, हम निम्न सूत्रों का प्रयोग करेगे।

$$\sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cdot \sin \frac{C-D}{2}$$

$$\text{तथा } \cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cdot \cos \frac{C-D}{2}$$

हल सिद्ध करना है $\frac{\sin x - \sin y}{\cos x + \cos y} = \tan \frac{x-y}{2}$

$$\text{बायीं पक्ष} = \frac{\sin x - \sin y}{\cos x + \cos y} = \frac{2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}}{2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}}$$

$$= \tan \frac{x-y}{2} = \text{दायीं पक्ष}$$

\therefore बायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 19. सिद्ध कीजिए. $\frac{\sin x + \sin 3x}{\cos x + \cos 3x} = \tan 2x$

हल सिद्ध करना है $\frac{\sin x + \sin 3x}{\cos x + \cos 3x} = \tan 2x$

$$\begin{aligned}\text{बायें पक्ष} &= \frac{\sin x + \sin 3x}{\cos x + \cos 3x} = \frac{\sin 3x + \sin x}{\cos 3x + \cos x} \\ &= \frac{2 \sin \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2}}{2 \cos \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2}} \\ &= \frac{\sin 2x \cos x}{\cos 2x \cos x} = \tan 2x = \text{दायें पक्ष}\end{aligned}$$

(सूत्र द्वारा)

$\therefore \text{बायें पक्ष} = \text{दायें पक्ष}$

इति सिद्धम्

नोट चिन्ह की गलती को छोड़ने के लिए हम यहाँ पर बढ़े कोण $3x$ को C तथा छोटे कोण x को D की तरह मानेंगे।

प्रश्न 20. सिद्ध कीजिए. $\frac{\sin x - \sin 3x}{\sin^2 x - \cos^2 x} = 2 \sin x$

व्यंजक के बाएँ पक्ष को सरल करने के लिए हमें,

$$\sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cdot \sin \frac{C-D}{2}$$

तथा $\cos^2 A - \sin^2 B = \cos(A+B) \cdot \cos(A-B)$

सूत्रों का प्रयोग करना पाहिए।

हल सिद्ध करना है $\frac{\sin x - \sin 3x}{\sin^2 x - \cos^2 x} = 2 \sin x$

$$\begin{aligned}\text{बायें पक्ष} &= \frac{\sin x - \sin 3x}{\sin^2 x - \cos^2 x} = \frac{\sin 3x - \sin x}{\cos^2 x - \sin^2 x} \\ &= \frac{2 \cos \frac{3x+x}{2} \sin \frac{3x-x}{2}}{\cos(x+x) \cos(x-x)} \\ &= \frac{2 \cos 2x \sin x}{\cos 2x \cos 0} \\ &= 2 \sin x = \text{दायें पक्ष}\end{aligned}$$

(सूत्र द्वारा)

$\therefore \text{बायें पक्ष} = \text{दायें पक्ष}$

इति सिद्धम्

नोट व्यंजक के बाएँ पक्ष को मानक सूत्रों के लिए बदलने के लिए अंश तथा हर दोनों में से शृणामक चिन्ह उभयनिष्ठ लेते हैं।

प्रश्न 21. सिद्ध कीजिए $\frac{\cos 4x + \cos 3x + \cos 2x}{\sin 4x + \sin 3x + \sin 2x} = \cot 3x$

ब्यांक के बार्ड पक्ष को सरल करने के लिए, हम अंगत तथा हर दोनों में प्रथम तथा तृतीय पद का जोड़ा बनाएंगे, तत्परतात् मानक सूत्रें

$$\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cdot \cos \frac{C-D}{2}$$

$$\text{तथा } \cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cdot \cos \frac{C-D}{2}$$

का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त करेंगे।

यहाँ पर हम प्रथम तथा द्वितीय पदों या द्वितीय तथा तृतीय पदों के मध्य जोड़ा नहीं बना सकते हैं क्योंकि प्रथम तथा तृतीय पद को संयुक्त करने के बाद हम कोण $\frac{4x+2x}{2} = 3x$

प्राप्त करते हैं, जिसे हम द्वितीय पद के रूप में पहले से ही रखते हैं, इस प्रकार हम इसे आसानी से सरल कर सकते हैं।

हल सिद्ध करना है $\frac{\cos 4x + \cos 3x + \cos 2x}{\sin 4x + \sin 3x + \sin 2x} = \cot 3x$

$$\text{बायीं पक्ष} = \frac{\cos 4x + \cos 3x + \cos 2x}{\sin 4x + \sin 3x + \sin 2x} = \frac{(\cos 4x + \cos 2x) + \cos 3x}{(\sin 4x + \sin 2x) + \sin 3x}$$

$$= \frac{2 \cos \frac{4x+2x}{2} \cos \frac{4x-2x}{2} + \cos 3x}{2 \sin \frac{4x+2x}{2} \cos \frac{4x-2x}{2} + \sin 3x} \quad (\text{सूत्र द्वारा})$$

$$= \frac{2 \cos 3x \cos x + \cos 3x}{2 \sin 3x \cos x + \sin 3x}$$

$$= \frac{\cos 3x (2 \cos x + 1)}{\sin 3x (2 \cos x + 1)} = \cot 3x = \text{दायीं पक्ष}$$

∴ बायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 22. सिद्ध कीजिए $\cot x \cot 2x - \cot 2x \cot 3x - \cot 3x \cot x = 1$

यहाँ पर हम कोण को $3x = 2x + x$ लिखेंगे, तत्परतात् सूत्र,

$$\cot(A+B) = \frac{\cot A \cdot \cot B - 1}{\cot A + \cot B}$$

का प्रयोग करके इसे सरल करेंगे।

हल सिद्ध करना है $\cot x \cot 2x - \cot 2x \cot 3x - \cot 3x \cot x = 1$

अब, $\cot 3x = \cot(2x+x)$

$$\cot 3x = \frac{\cot 2x \cot x - 1}{\cot 2x + \cot x} \quad (\text{सूत्र द्वारा})$$

$$\Rightarrow \cot 3x \cot 2x + \cot 3x \cot x = \cot 2x \cot x - 1$$

$$\Rightarrow \cot x \cot 2x - \cot 2x \cot 3x - \cot 3x \cot x = 1$$

इति सिद्धम्

प्र० 23. सिद्ध कीजिए $\tan 4x = \frac{4 \tan x (1 - \tan^2 x)}{1 - 6\tan^2 x + \tan^4 x}$

$\tan 4x$ को विस्तारित करने के लिए हम सूत्र $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$ का दो बार प्रयोग करके हल करेंगे।

हल सिद्ध करना है $\tan 4x = \frac{4 \tan x (1 - \tan^2 x)}{1 - 6\tan^2 x + \tan^4 x}$

$$\begin{aligned} \text{दायीं पक्ष} &= \tan 4x = \tan 2(2x) = \frac{2 \tan 2x}{1 - \tan^2 2x} = \frac{2 \cdot \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}}{1 - \left(\frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}\right)^2} \quad (\text{सूत्र ढारा}) \\ &= \frac{4 \tan x}{1 - \tan^2 x} \times \frac{(1 - \tan^2 x)^2}{(1 - \tan^2 x)^2 - 4 \tan^2 x} \\ &= \frac{4 \tan x (1 - \tan^2 x)}{1 + \tan^4 x - 2 \tan^2 x - 4 \tan^2 x} \\ &= \frac{4 \tan x (1 - \tan^2 x)}{1 - 6 \tan^2 x + \tan^4 x} = \text{दायीं पक्ष} \end{aligned}$$

\therefore दायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्र० 24. सिद्ध कीजिए $\cos 4x = 1 - 8 \sin^2 x \cos^2 x$

$\cos 4x$ को विस्तारित करने के लिए, सर्वप्रथम हम सूत्र $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ का तत्प्रथात् सूत्र $\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$ का प्रयोग करेंगे, जिससे आसानी से हमें आवश्यक परिणाम प्राप्त होगा।

हल सिद्ध करना है $\cos 4x = 1 - 8 \sin^2 x \cos^2 x$

$$\begin{aligned} \text{दायीं पक्ष} &= \cos 4x = 1 - 2 \sin^2 2x = 1 - 2 (\sin 2x)^2 \quad (\text{सूत्र ढारा}) \\ &= 1 - 2 (2 \sin x \cos x)^2 = 1 - 8 \sin^2 x \cos^2 x = \text{दायीं पक्ष} \end{aligned}$$

\therefore दायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्र० 25. सिद्ध कीजिए $\cos 6x = 32 \cos^6 x - 48 \cos^4 x + 18 \cos^2 x - 1$

$\cos 6x$ को सरल करने के लिए, सर्वप्रथम हम सूत्र $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ का तत्प्रथात् $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$ का प्रयोग कर, इसे आसानी से सरल करेंगे।

हल सिद्ध करना है $\cos 6x = 32 \cos^6 x - 48 \cos^4 x + 18 \cos^2 x - 1$

$$\begin{aligned} \text{दायीं पक्ष} &= \cos 6x = \cos 2(3x) = 2 \cos^2 3x - 1 = 2 (\cos 3x)^2 - 1 \quad (\because \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1) \\ &= 2 (4 \cos^3 x - 3 \cos x)^2 - 1 \quad (\because \cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta) \\ &= 2 (16 \cos^6 x + 9 \cos^4 x - 24 \cos^4 x) - 1 \\ &= 32 \cos^6 x - 48 \cos^4 x + 18 \cos^2 x - 1 = \text{दायीं पक्ष} \end{aligned}$$

\therefore दायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्नावली 3.4

निर्देश (प्र. सं. 1 - 4) निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए।

(प्र. सं. 1 - 4) त्रिकोणमितीय समीकरण के हल जिसके लिए $0 \leq x < 2\pi$ होता है, मुख्य हल कहताता है। इन समीकरणों को हल करने के लिए चतुर्धृष्णा निकाय का प्रयोग करेंगे।

प्रश्न 1. $\tan x = \sqrt{3}$

यदि $\tan x = \tan \alpha$

तब, $x = n\pi + \alpha$ इसका व्यापक हल है।

हल दिया है, $\tan x = \sqrt{3}$

$$\tan x = \tan \frac{\pi}{3}$$

$$\text{या } \tan\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow \tan x = \tan \frac{\pi}{3} \text{ या } \tan \frac{4\pi}{3}$$

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ या } \frac{4\pi}{3}$$

यहाँ मुख्य मान $x = \frac{\pi}{3}$ है।

हम जानते हैं कि यदि $\tan x = \tan \alpha$
तब, व्यापक हल $x = n\pi + \alpha$ होता है।

$$\therefore x = n\pi + \frac{\pi}{3} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

प्रश्न 2. $\sec x = 2$

यदि $\cos x = \cos \alpha$

तब, $x = 2n\pi \pm \alpha$ इसका व्यापक हल है। सबसे पहले $\sec x$ को $\cos x$ में परिवर्तित करना होगा, तत्परतात् इसे आसानी से हल करेंगे।

हल दिया है, $\sec x = 2$

$$\Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \text{ या } \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$x = \frac{\pi}{3} \text{ या } \frac{5\pi}{3}$$

यहाँ मुख्य मान $x = \frac{\pi}{3}$ है।

हम जानते हैं कि यदि $\cos x = \cos \alpha$, तब

$$x = 2n\pi \pm \alpha \text{ इसका व्यापक हल होता है।}$$

$$\therefore x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

प्रश्न 3. $\cot x = -\sqrt{3}$

हल दिया है, $\cot x = -\sqrt{3}$

$$\Rightarrow \tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \tan x = -\tan \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \tan x = \tan \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) \text{ या } \tan \left(2\pi - \frac{\pi}{6} \right)$$

[∴ $\tan x$ द्वितीय तथा चतुर्थ चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है तथा $\tan(\pi - \theta) = -\tan\theta$ और $\tan(2\pi - \theta) = -\tan\theta$]

$$\tan x = \tan \frac{5\pi}{6} \text{ या } \tan \frac{11\pi}{6}$$

$$\Rightarrow x = \frac{5\pi}{6} \text{ या } \frac{11\pi}{6}$$

यहाँ, मुख्य मान $x = \frac{5\pi}{6}$ है।

हम जानते हैं कि यदि $\tan x = \tan \alpha$, तब व्यापक हल, $x = n\pi + \alpha$ होता है।

$$\therefore x = n\pi + \frac{5\pi}{6} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

प्रश्न 4. $\operatorname{cosec} x = -2$

यदि $\sin x = \sin \alpha$, तब $x = n\pi + (-1)^n \cdot \alpha$ इसका व्यापक हल होगा। सर्वप्रथम हम $\operatorname{cosec} x$ को $\sin x$ में परिवर्तित करेंगे। तब प्रश्नात् इसको आसानी से हल करेंगे।

हल दिया है, $\operatorname{cosec} x = -2$

$$\Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sin x = -\sin \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \sin x = \sin \left(\pi + \frac{\pi}{6} \right) \text{ या } \sin \left(2\pi - \frac{\pi}{6} \right)$$

[∴ $\sin x$ द्वितीय तथा चतुर्थ चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है,

$$\text{या } \sin(\pi + \theta) = \sin(2\pi - \theta) = -\sin\theta]$$

$$\sin x = \sin \frac{7\pi}{6} \text{ या } \sin \frac{11\pi}{6}$$

यहाँ मुख्य मान $x = \frac{7\pi}{6}$ है।

व्यापक हल,

$$x = n\pi + (-1)^n \cdot \alpha$$

$$\Rightarrow x = n\pi + (-1)^n \cdot \frac{7\pi}{6} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

नोट (प्र. सं. 1 - 4) जब हम व्यापक हल को लिखते हैं, तब हमें मुख्य हलों के मध्य में से न्यूनतम मान का चयन करना चाहिए।

निर्देश (प्र. सं. 5 - 9) निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 5. $\cos 4x = \cos 2x$

सर्वप्रथम हम व्यंजक के दाएँ पक्ष से $\cos 2x$ को उसके बाएँ पक्ष में स्थानान्तरित करेंगे।

$$\text{तत्परतात् सूत्र } \cos C - \cos D = -2 \sin \frac{C+D}{2} \cdot \sin \frac{C-D}{2} \text{ का प्रयोग करेंगे तथा}$$

आसानी से इस समीकरण को हल करेंगे।

हल दिया है, $\cos 4x = \cos 2x$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \cos 4x - \cos 2x = 0 \\ \Rightarrow & -2 \sin \frac{4x+2x}{2} \sin \frac{4x-2x}{2} = 0 \\ \Rightarrow & \sin 3x \sin x = 0 \\ \Rightarrow & \sin 3x = 0 \quad \text{या} \quad \sin x = 0 \\ \Rightarrow & 3x = n\pi \quad \text{या} \quad x = n\pi \\ \Rightarrow & x = \frac{n\pi}{3} \quad \text{या} \quad x = n\pi \quad (n \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

नोट यह भी हम त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सूत्र $\cos x = \cos a$ के पर्दों को हम केवल तभी उपयोग कर सकते हैं जब व्यंजक का एक पक्ष वर तथा दूसरा पक्ष अवर हो।

प्रश्न 6. $\cos 3x + \cos x - \cos 2x = 0$

सर्वप्रथम, हम प्रथम दो पक्षों को सूत्र

$$\cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cdot \cos \frac{C-D}{2}$$

का प्रयोग करके संयुक्त करेंगे। तत्परतात् इसे सरल करेंगे।

हल दिया है, $\cos 3x + \cos x - \cos 2x = 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & 2 \cos \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2} - \cos 2x = 0 \\ & \left(\because \cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2} \right) \\ \Rightarrow & 2 \cos 2x \cos x - \cos 2x = 0 \\ \Rightarrow & \cos 2x (2 \cos x - 1) = 0 \\ \Rightarrow & \cos 2x = 0 \quad \text{या} \quad 2 \cos x - 1 = 0 \\ \Rightarrow & 2x = (2n+1) \frac{\pi}{2} \quad \text{या} \quad \cos x = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow & x = (2n+1) \frac{\pi}{4} \quad \text{या} \quad \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \\ \Rightarrow & x = (2n+1) \frac{\pi}{4} \quad \text{या} \quad x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (n \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

प्रश्न 7. $\sin 2x + \cos x = 0$

हल दिया है, $\sin 2x + \cos x = 0$
 $\Rightarrow 2 \sin x \cos x + \cos x = 0$
 $\Rightarrow \cos x (2 \sin x + 1) = 0$
 $\Rightarrow \cos x = 0 \text{ या } \sin x = -\frac{1}{2}$

($\because \sin 2x = 2 \sin x \cos x$)

जब $\cos x = 0$

$$\Rightarrow x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$$

तथा जब $\sin x = -\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sin x &= -\sin \frac{\pi}{6} \\ \sin x &= \sin \left(\pi + \frac{\pi}{6} \right) \\ \sin x &= \sin \frac{7\pi}{6} \\ \Rightarrow x &= n\pi + (-1)^n \frac{7\pi}{6} \end{aligned}$$

($\because \sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$)

($n \in \mathbb{Z}$)

नोट व्यंजक में उभयानिष्ठ पदों को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए, जो गुणनफल के रूप में होते हैं, इससे जापकर हलों की संख्या जी हासि हो जाती है।

प्रश्न 8. $\sec^2 2x = 1 - \tan 2x$

हल दिया है, $\sec^2 2x = 1 - \tan 2x$
 $1 + \tan^2 2x = 1 - \tan 2x$
 $\Rightarrow \tan^2 2x + \tan 2x = 0$
 $\Rightarrow \tan 2x (\tan 2x + 1) = 0$
 $\Rightarrow \tan 2x = 0 \text{ या } \tan 2x = -1$
 जब $\tan 2x = 0$, तब $2x = n\pi$
 $\Rightarrow x = \frac{n\pi}{2}$

($\because \sec^2 x - \tan^2 x = 1$)

तथा जब $\tan 2x = -1$, तब $\tan 2x = -\tan \frac{\pi}{4}$

$$\begin{aligned} \tan 2x &= \tan \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) = \tan \frac{3\pi}{4} \\ \therefore 2x &= n\pi + \frac{3\pi}{4} \\ \Rightarrow x &= \frac{n\pi}{2} + \frac{3\pi}{8} \end{aligned}$$

($\because \tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$)

प्रश्न 9. $\sin x + \sin 3x + \sin 5x = 0$

हल दिया है, $\sin x + \sin 3x + \sin 5x = 0$
 $\Rightarrow (\sin 5x + \sin x) + \sin 3x = 0$

$$\Rightarrow 2 \sin \frac{5x+x}{2} \cos \frac{5x-x}{2} + \sin 3x = 0$$

$\left[\because \sin C + \sin D = 2 \sin \left(\frac{C+D}{2} \right) \cos \left(\frac{C-D}{2} \right) \right]$

$$\Rightarrow 2 \sin 3x \cos 2x + \sin 3x = 0$$

$$\Rightarrow \sin 3x (2 \cos 2x + 1) = 0$$

$$\sin 3x = 0 \quad \text{या} \quad 2 \cos 2x + 1 = 0$$

जब $\sin 3x = 0$

तब, $3x = n\pi \Rightarrow x = \frac{n\pi}{3}$

तथा जब $2 \cos 2x + 1 = 0$

तब, $\cos 2x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \cos 2x = -\cos \frac{\pi}{3}$

$$\Rightarrow \cos 2x = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) \quad \left[\because \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta \right]$$

$$\Rightarrow \cos 2x = \cos \frac{2\pi}{3} \Rightarrow 2x = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3} \Rightarrow x = n\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

विविध प्रश्नावली

प्रश्न 1. सिद्ध कीजिए $2 \cos \frac{\pi}{13} \cos \frac{9\pi}{13} + \cos \frac{3\pi}{13} + \cos \frac{5\pi}{13} = 0$

यहाँ पर, प्रथम पद में हम सबसे पहले सूत्र

$$2 \cos A \cdot \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$$
 का प्रयोग करेंगे।

तथ्यरथात् सूत्र $\cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cdot \cos \frac{C-D}{2}$ का प्रयोग कर इसे सरल करेंगे।

हल रिक्त करना है, $2 \cos \frac{\pi}{13} \cos \frac{9\pi}{13} + \cos \frac{3\pi}{13} + \cos \frac{5\pi}{13} = 0$

याथी पक्ष = $2 \cos \frac{\pi}{13} \cos \frac{9\pi}{13} + \cos \frac{3\pi}{13} + \cos \frac{5\pi}{13}$

$$= \cos \left(\frac{9\pi}{13} + \frac{\pi}{13} \right) + \cos \left(\frac{9\pi}{13} - \frac{\pi}{13} \right) + \cos \frac{5\pi}{13} + \cos \frac{3\pi}{13} \quad (\text{सूत्र द्वारा})$$

$$= \cos \frac{10\pi}{13} + \cos \frac{8\pi}{13} + \cos \frac{5\pi}{13} + \cos \frac{3\pi}{13}$$

$$= \left(\cos \frac{10\pi}{13} + \cos \frac{3\pi}{13} \right) + \left(\cos \frac{8\pi}{13} + \cos \frac{5\pi}{13} \right)$$

$$= 2 \cos \frac{\frac{10\pi}{13} + \frac{3\pi}{13}}{2} \cos \frac{\frac{10\pi}{13} - \frac{3\pi}{13}}{2} + 2 \cos \frac{\frac{8\pi}{13} + \frac{5\pi}{13}}{2} \cos \frac{\frac{8\pi}{13} - \frac{5\pi}{13}}{2}$$

(सूत्र द्वारा)

(सूत्र द्वारा)

$$= 2 \cos \frac{\pi}{2} \cos \frac{7\pi}{26} + 2 \cos \frac{\pi}{2} \cos \frac{3\pi}{26} = 0 + 0 = 0 = \text{दायीं पक्ष} \quad \left(\because \cos \frac{\pi}{2} = 0 \right)$$

\therefore वायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

नोट यह रखें कि, $\cos \frac{10\pi}{13} + \cos \frac{3\pi}{13} \neq \cos \frac{13\pi}{13}$

प्रश्न 2. सिद्ध कीजिए $(\sin 3x + \sin x) \sin x + (\cos 3x - \cos x) \cos x = 0$

हल सिद्ध करना है, $(\sin 3x + \sin x) \sin x + (\cos 3x - \cos x) \cos x = 0$

$$\therefore \text{वायीं पक्ष} = (\sin 3x + \sin x) \sin x + (\cos 3x - \cos x) \cos x$$

$$= 2 \sin \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2} \sin x$$

$$- 2 \sin \frac{3x+x}{2} \sin \frac{3x-x}{2} \cos x$$

(सूत्र द्वारा)

$$= 2 \sin 2x \cos x \sin x - 2 \sin 2x \sin x \cos x = 0 = \text{दायीं पक्ष}$$

\therefore वायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 3. सिद्ध कीजिए $(\cos x + \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = 4 \cos^2 \frac{x+y}{2}$

हल सिद्ध करना है, $(\cos x + \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = 4 \cos^2 \frac{x+y}{2}$

$$\text{वायीं पक्ष} = (\cos x + \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2$$

$$= \left(2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \right)^2 + \left(2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right)^2$$

(सूत्र द्वारा)

$$= 4 \cos^2 \frac{x+y}{2} \cos^2 \frac{x-y}{2} + 4 \cos^2 \frac{x+y}{2} \sin^2 \frac{x-y}{2}$$

$$= 4 \cos^2 \frac{x+y}{2} \left(\cos^2 \frac{x-y}{2} + \sin^2 \frac{x-y}{2} \right)$$

$$= 4 \cos^2 \frac{x+y}{2}$$

($\because \cos^2 x + \sin^2 x = 1$)

$$= \text{दायीं पक्ष}$$

$$\text{वायीं पक्ष} = \text{दायीं पक्ष}$$

इति सिद्धम्

प्रश्न 4. सिद्ध कीजिए $(\cos x - \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = 4 \sin^2 \frac{x-y}{2}$

हल सिद्ध करना है, $(\cos x - \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = 4 \sin^2 \frac{x-y}{2}$

$$\therefore \text{वायीं पक्ष} = (\cos x - \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2$$

$$= \left(-2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right)^2 + \left(2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right)^2$$

(सूत्र द्वारा)

$$= 4 \sin^2 \frac{x+y}{2} \sin^2 \frac{x-y}{2} + 4 \cos^2 \frac{x+y}{2} \sin^2 \frac{x-y}{2}$$

$$= 4 \sin^2 \frac{x-y}{2} \left(\sin^2 \frac{x+y}{2} + \cos^2 \frac{x+y}{2} \right)$$

$$= 4 \sin^2 \frac{x-y}{2} = \text{दायीं पक्ष}$$

($\because \cos^2 x + \sin^2 x = 1$)

$\therefore \text{दायीं पक्ष} = \text{दायीं पक्ष}$

इति सिद्धम्

नोट यह यद्यपि रखना चाहिए कि, $\sin^2 A \neq \sin A^2$

$$\text{अर्थात् } \left(\sin \frac{x+y}{2} \right)^2 \neq \sin \frac{(x+y)^2}{4}$$

प्रश्न 5. सिद्ध कीजिए, $\sin x + \sin 3x + \sin 5x + \sin 7x = 4 \cos x \cos 2x \sin 4x$

गणना वीजे आसान बनाने के लिए, सर्वप्रथम हम $7x + x = 8x$ तथा $5x + 3x = 8x$ के पुनः प्रयत्न करेंगे। तत्पश्चात् सूत्र

$$\sin C + \sin D = 2 \sin \left(\frac{C+D}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{C-D}{2} \right)$$

का प्रयोग करेंगे।

हल सिद्ध करना है, $\sin x + \sin 3x + \sin 5x + \sin 7x = 4 \cos x \cos 2x \sin 4x$

$$\text{दायीं पक्ष} = \sin x + \sin 3x + \sin 5x + \sin 7x$$

$$= (\sin 7x + \sin x) + (\sin 5x + \sin 3x)$$

$$= 2 \sin \frac{7x+x}{2} \cos \frac{7x-x}{2} + 2 \sin \frac{5x+3x}{2} \cos \frac{5x-3x}{2}$$

(सूत्र द्वारा)

$$= 2 \sin 4x \cos 3x + 2 \sin 4x \cos x$$

$$= 2 \sin 4x (\cos 3x + \cos x)$$

$$= 2 \sin 4x 2 \cos \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2}$$

(सूत्र द्वारा)

$$= 4 \sin 4x \cos 2x \cos x = \text{दायीं पक्ष}$$

$\therefore \text{दायीं पक्ष} = \text{दायीं पक्ष}$

इति सिद्धम्

नोट यद्यपि रखें कि $\sin 7x + \sin x \neq \sin 8x$

प्रश्न 6. सिद्ध कीजिए $\frac{(\sin 7x + \sin 5x) + (\sin 9x + \sin 3x)}{(\cos 7x + \cos 5x) + (\cos 9x + \cos 3x)} = \tan 6x$

हल सिद्ध करना है, $\frac{(\sin 7x + \sin 5x) + (\sin 9x + \sin 3x)}{(\cos 7x + \cos 5x) + (\cos 9x + \cos 3x)} = \tan 6x$

$$\text{दायीं पक्ष} = \frac{(\sin 7x + \sin 5x) + (\sin 9x + \sin 3x)}{(\cos 7x + \cos 5x) + (\cos 9x + \cos 3x)}$$

$$= \frac{2 \sin \frac{7x+5x}{2} \cos \frac{7x-5x}{2} + 2 \sin \frac{9x+3x}{2} \cos \frac{9x-3x}{2}}{2 \cos \frac{7x+5x}{2} \cos \frac{7x-5x}{2} + 2 \cos \frac{9x+3x}{2} \cos \frac{9x-3x}{2}}$$

$$= \frac{\sin 6x \cos 2x + \sin 6x \cos 2x}{\cos 6x \cos 2x + \cos 6x \cos 2x}$$

(सूत्र द्वारा)

$$= \frac{2 \sin 6x \cos x + 2 \sin 6x \cos 3x}{2 \cos 6x \cos x + 2 \cos 6x \cos 3x} \\ = \frac{2 \sin 6x (\cos x + \cos 3x)}{2 \cos 6x (\cos x + \cos 3x)} = \tan 6x = \text{दायरी पक्ष}$$

\therefore दायरी पक्ष = दायरी पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 7. सिद्ध कीजिए $\sin 3x + \sin 2x - \sin x = 4 \sin x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2}$

हल सिद्ध करना है, $\sin 3x + \sin 2x - \sin x = 4 \sin x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2}$

$$\text{दायरी पक्ष} = \sin 3x + \sin 2x - \sin x = (\sin 3x - \sin x) + \sin 2x$$

$$= 2 \cos \frac{3x+x}{2} \sin \frac{3x-x}{2} + \sin 2x$$

$$\left(\because \sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2} \right)$$

$$= 2 \cos 2x \sin x + 2 \sin x \cos x \quad (\because \sin 2x = 2 \sin x \cos x)$$

$$= 2 \sin x (\cos 2x + \cos x) = 2 \sin x 2 \cos \frac{2x+x}{2} \cos \frac{2x-x}{2}$$

$$\left(\because \cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2} \right)$$

$$= 4 \sin x \cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2} = \text{दायरी पक्ष}$$

\therefore दायरी पक्ष = दायरी पक्ष

इति सिद्धम्

निर्देश (प्र. सं. 8 - 10) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में $\sin \frac{x}{2}$, $\cos \frac{x}{2}$ तथा $\tan \frac{x}{2}$ ज्ञात कीजिए।

यहाँ, हमारे पास $\sin \frac{x}{2}$, $\cos \frac{x}{2}$ तथा $\tan \frac{x}{2}$ के मानों थे जो ज्ञात करने के लिए दो विधियाँ हैं

(i) सर्वसमिकां $\sec^2 x - \tan^2 x = 1$ का प्रयोग करके या

(ii) सूत्र $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$ का प्रयोग करके

x को $\frac{x}{2}$ से त्यानातरित करके इसे सरल करेंगे। इसके परामात् चतुर्भुज निकाय का उपयोग

करते हुए थिन्हों को लागू करेंगे।

प्रश्न 8. $\tan x = -\frac{4}{3}$, x द्वितीय चतुर्थांश में है।

हल $\tan x = -\frac{4}{3}$

दिया है, कि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात् $\frac{\pi}{2} < x < \pi$

$$\therefore \tan x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}} = -\frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned}
 & \therefore 3 \tan \frac{x}{2} = -2 \left(1 - \tan^2 \frac{x}{2}\right) \\
 \Rightarrow & 3 \tan \frac{x}{2} = -2 + 2 \tan^2 \frac{x}{2} \\
 \Rightarrow & 2 \tan^2 \frac{x}{2} - 3 \tan \frac{x}{2} - 2 = 0 \\
 \Rightarrow & 2 \tan^2 \frac{x}{2} - (4-1) \tan \frac{x}{2} - 2 = 0 \\
 \Rightarrow & 2 \tan \frac{x}{2} \left(\tan \frac{x}{2} - 2\right) + 1 \left(\tan \frac{x}{2} - 2\right) = 0 \\
 \Rightarrow & \left(2 \tan \frac{x}{2} + 1\right) \left(\tan \frac{x}{2} - 2\right) = 0 \\
 \Rightarrow & \tan \frac{x}{2} = 2 \text{ या } \tan \frac{x}{2} = -\frac{1}{2} \\
 \therefore & \frac{\pi}{2} < x < \pi \Rightarrow \frac{\pi}{4} < \frac{x}{2} < \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

अर्थात् $\frac{x}{2}$ प्रथम चतुर्थांश में होगा।

$$\text{इस प्रकार, } \tan \frac{x}{2} = 2 = \frac{2}{1} = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} = \frac{AC}{AB}$$

पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर,


$$(BC)^2 = (AC)^2 + (AB)^2$$

$$(BC)^2 = 4 + 1 = 5$$

$$BC = \sqrt{5}$$

$$\text{अब, } \sin \frac{x}{2} = \frac{\text{लम्ब}}{\text{कर्ण}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\therefore \cos \frac{x}{2} = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$



नोट विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि धनात्मक तथा क्रमात्मक विन्हें का साप्तरणीयूर्ध्वक प्रयोग करने के लिए चतुर्थांश को व्यान में रखें।

प्रस्तुति 9. $\cos x = -\frac{1}{3}$, x तृतीय चतुर्थांश में है।

$$\text{हल } \cos x = -\frac{1}{3}$$

दिया है, कि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है।

$$\text{अर्थात् } \pi < x < \frac{3\pi}{2}$$

(\because तृतीय चतुर्थांश में $0, \pi$ तथा $3\pi/2$ के मध्य स्थित होता है)

$$\text{सूत्र से, } \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1$$

$$\Rightarrow 2 \cos^2 \frac{x}{2} = 1 + \cos x = 1 - \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow 2 \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \cos \frac{x}{2} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

अब, $\pi < x < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{2} < \frac{x}{2} < \frac{3\pi}{4}$

अर्थात् $\frac{x}{2}$ द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इस प्रकार, $\cos \frac{x}{2}$ ऋणात्मक होगा।

$$\Rightarrow \cos \frac{x}{2} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

अब, $\sin^2 \frac{x}{2} = 1 - \cos^2 \frac{x}{2}$

$$\sin^2 \frac{x}{2} = 1 - \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\Rightarrow \sin \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\Rightarrow \tan \frac{x}{2} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{3}}{-\frac{1}{\sqrt{3}}} = -\sqrt{2} \quad (\because \frac{x}{2} \text{ द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है})$$

प्रश्न 10. $\sin x = \frac{1}{4}$, x द्वितीय चतुर्थांश में है।

हल $\because \sin x = \frac{1}{4}$

दिया है, कि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है।

अर्थात् $\frac{\pi}{2} < x < \pi$

$$\therefore \sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \quad \therefore \frac{1}{4} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$\Rightarrow 1 + \tan^2 \frac{x}{2} = 8 \tan \frac{x}{2} \quad \Rightarrow \tan^2 \frac{x}{2} - 8 \tan \frac{x}{2} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \tan \frac{x}{2} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4}}{2} \quad \Rightarrow \tan \frac{x}{2} = \frac{8 \pm 2\sqrt{15}}{2}$$

$$\Rightarrow \tan \frac{x}{2} = 4 \pm \sqrt{15}$$

$\because \frac{\pi}{2} < x < \pi \Rightarrow \frac{\pi}{4} < \frac{x}{2} < \frac{\pi}{2}$

अर्थात् $\frac{x}{2}$ प्रथम चतुर्थांश में स्थित है।

$$\Rightarrow \tan \frac{x}{2} = 4 + \sqrt{15}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{अब, } \sec^2 \frac{x}{2} = 1 + \tan^2 \frac{x}{2} = 1 + (4 + \sqrt{15})^2 = 1 + 16 + 15 + 8\sqrt{15} \\
 \Rightarrow & \sec^2 \frac{x}{2} = 32 + 8\sqrt{15} \Rightarrow \sec^2 \frac{x}{2} = 8(4 + \sqrt{15}) \\
 \Rightarrow & \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{8(4 + \sqrt{15})} \times \frac{4 - \sqrt{15}}{4 - \sqrt{15}} \\
 \Rightarrow & \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{(4 - \sqrt{15}) \times 2}{8} \Rightarrow \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{8 - 2\sqrt{15}}{8} \\
 \Rightarrow & \cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{8 - 2\sqrt{15}}{8}}
 \end{aligned}$$

अब, $\sin^2 \frac{x}{2} = 1 - \cos^2 \frac{x}{2} = 1 - \frac{8 - 2\sqrt{15}}{8}$
 $\Rightarrow \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{8 - 8 + 2\sqrt{15}}{8}$
 $\Rightarrow \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{2\sqrt{15}}{8} \Rightarrow \sin \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{15}}{2} \quad \left(\because \frac{x}{2} \text{ प्रथम चतुर्थांश में स्थित है} \right)$