

अध्याय 9

अनुक्रम तथा श्रेणी Sequences and Series

प्रश्नावली 9.1

निर्देश (प्र. सं. 1 - 6) प्रत्येक प्रश्न के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम पाँच पद लिखिए, जिनका n वाँ पद दिया गया है।

प्रश्न 1. $a_n = n(n + 2)$

हल दिया है, $a_n = n(n + 2)$

$n = 1, 2, 3, 4, 5$ रखने पर,

$$n = 1 \text{ पर},$$

$$a_1 = 1(1 + 2) = 3$$

$$n = 2 \text{ पर},$$

$$a_2 = 2(2 + 2) = 8$$

$$n = 3 \text{ पर},$$

$$a_3 = 3(3 + 2) = 15$$

$$n = 4 \text{ पर},$$

$$a_4 = 4(4 + 2) = 24$$

$$n = 5 \text{ पर},$$

$$a_5 = 5(5 + 2) = 35$$

प्र० २. $a_n = \frac{n}{n+1}$

हल दिया है, $a_n = \frac{n}{n+1}$

$n = 1, 2, 3, 4, 5$ रखने पर,

$n = 1$ पर,

$$a_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$n = 2$ पर,

$$a_2 = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}$$

$n = 3$ पर,

$$a_3 = \frac{3}{3+1} = \frac{3}{4}$$

$n = 4$ पर,

$$a_4 = \frac{4}{4+1} = \frac{4}{5}$$

$n = 5$ पर,

$$a_5 = \frac{5}{5+1} = \frac{5}{6}$$

प्र० ३. $a_n = 2^n$

हल दिया है, $a_n = 2^n$

$n = 1, 2, 3, 4, 5$ रखने पर,

$n = 1$ पर,

$$a_1 = 2^1 = 2$$

$n = 2$ पर,

$$a_2 = 2^2 = 4$$

$n = 3$ पर,

$$a_3 = 2^3 = 8$$

$n = 4$ पर,

$$a_4 = 2^4 = 16$$

$n = 5$ पर,

$$a_5 = 2^5 = 32$$

प्र० ४. $a_n = \frac{2n - 3}{6}$

हल दिया है, $a_n = \frac{2n - 3}{6}$

$n = 1, 2, 3, 4, 5$ रखने पर,

$n = 1$ पर,

$$a_1 = \frac{2 \times 1 - 3}{6} = \frac{2 - 3}{6} = \frac{-1}{6}$$

$n = 2$ पर,

$$a_2 = \frac{2 \times 2 - 3}{6} = \frac{4 - 3}{6} = \frac{1}{6}$$

$n = 3$ पर,

$$a_3 = \frac{2 \times 3 - 3}{6} = \frac{6 - 3}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$n = 4$ पर,

$$a_4 = \frac{2 \times 4 - 3}{6} = \frac{8 - 3}{6} = \frac{5}{6}$$

$n = 5$ पर,

$$a_5 = \frac{2 \times 5 - 3}{6} = \frac{10 - 3}{6} = \frac{7}{6}$$

प्रश्न 5. $a_n = (-1)^{n-1} 5^{n+1}$

हल दिया है, $a_n = (-1)^{n-1} 5^{n+1}$

$n = 1, 2, 3, 4, 5$ रखने पर,

$$n = 1 \text{ पर}, \quad a_1 = (-1)^{1-1} 5^{1+1} = (-1)^0 5^2 = 25$$

$$n = 2 \text{ पर}, \quad a_2 = (-1)^{2-1} 5^{2+1} = (-1)^1 5^3 = -125$$

$$n = 3 \text{ पर}, \quad a_3 = (-1)^{3-1} 5^{3+1} = (-1)^2 5^4 = 625$$

$$n = 4 \text{ पर}, \quad a_4 = (-1)^{4-1} 5^{4+1} = (-1)^3 5^5 = -3125$$

$$n = 5 \text{ पर}, \quad a_5 = (-1)^{5-1} 5^{5+1} = (-1)^4 5^6 = 15625$$

प्रश्न 6. $a_n = \frac{n(n^2 + 5)}{4}$

हल दिया है, $a_n = \frac{n(n^2 + 5)}{4}$

$n = 1, 2, 3, 4, 5$ रखने पर,

$$n = 1 \text{ पर}, \quad a_1 = \frac{1(1^2 + 5)}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$n = 2 \text{ पर}, \quad a_2 = \frac{2(2^2 + 5)}{4} = \frac{2(4 + 5)}{4} = \frac{9}{2}$$

$$n = 3 \text{ पर}, \quad a_3 = \frac{3(3^2 + 5)}{4} = \frac{3(9 + 5)}{4} = \frac{21}{2}$$

$$n = 4 \text{ पर}, \quad a_4 = \frac{4(4^2 + 5)}{4} = \frac{4(16 + 5)}{4} = 21$$

$$n = 5 \text{ पर}, \quad a_5 = \frac{5(5^2 + 5)}{4} = \frac{5(25 + 5)}{4} = \frac{75}{2}$$

निर्देश (प्र. सं. 7 - 10) प्रत्येक प्रश्न के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए। जिनका नियम पद दिया गया है।

प्रश्न 7. $a_n = 4n - 3, a_{17}, a_{24}$

हल दिया है, $a_n = 4n - 3$

$$n = 17 \text{ रखने पर}, \quad a_{17} = 4 \times 17 - 3 = 68 - 3 = 65$$

$$n = 24 \text{ रखने पर}, \quad a_{24} = 4 \times 24 - 3 = 96 - 3 = 93$$

प्रश्न 8. $a_n = \frac{n^3}{2^n}, a_7$

हल दिया है, $a_n = \frac{n^2}{2^n}$

$$n = 7 \text{ रखने पर}, \quad a_7 = \frac{7^2}{2^7} = \frac{49}{128}$$

प्रश्न 9. $a_n = (-1)^{n-1} n^3$, a_9
हल दिया है, $a_n = (-1)^{n-1} n^3$
 $n=9$ रखने पर,

$$a_9 = (-1)^{9-1} 9^3 = (-1)^8 \times 9 \times 9 \times 9 = 729$$

प्रश्न 10. $a_n = \frac{n(n-2)}{n+3}$, a_{20}
हल दिया है, $a_n = \frac{n(n-2)}{n+3}$

$n=20$ रखने पर, $a_{20} = \frac{20(20-2)}{20+3}$
 $a_{20} = \frac{20 \times 18}{23} = \frac{360}{23}$

निर्देश (प्र. सं. 11 - 13) प्रायेक प्रश्न के प्रायेक अनुक्रम के पाँच पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 11. $a_1 = 3$, $a_n = 3a_{n-1} + 2$ सभी $n > 1$ के लिए

हल दिया है, $a_1 = 3$, $a_n = 3a_{n-1} + 2$, सभी $n > 1$ के लिए

$n=2$ रखने पर, $a_2 = 3a_{2-1} + 2$

$$\Rightarrow a_2 = 3a_1 + 2 = 3 \times (3) + 2 = 9 + 2 = 11$$

$n=3$ रखने पर, $a_3 = 3a_{3-1} + 2 = 3a_2 + 2 = 3(11) + 2 = 33 + 2 = 35$

$n=4$ रखने पर, $a_4 = 3a_{4-1} + 2 = 3a_3 + 2 = 3 \times 35 + 2 = 105 + 2 = 107$

$n=5$ रखने पर, $a_5 = 3a_{5-1} + 2 = 3a_4 + 2 = 3 \times 107 + 2 = 321 + 2 = 323$

\therefore श्रेणी है, $3, 11, 35, 107, 323, \dots$

प्रश्न 12. $a_1 = -1$, $a_n = \frac{a_{n-1}}{n}$, जहाँ $n \geq 2$

हल दिया है, $a_1 = -1$, $a_n = \frac{a_{n-1}}{n}$, $n \geq 2$

$n=2$ रखने पर, $a_2 = \frac{a_{2-1}}{2} = \frac{a_1}{2} = -\frac{1}{2}$

$n=3$ रखने पर, $a_3 = \frac{a_{3-1}}{3} = \frac{a_2}{3} = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}$

$n=4$ रखने पर, $a_4 = \frac{a_{4-1}}{4} = \frac{a_3}{4} = -\frac{1}{6} \times \frac{1}{4} = -\frac{1}{24}$

$$n = 5 \text{ रखने पर, } a_5 = \frac{a_{5-1}}{5} = \frac{a_4}{5} = \frac{-\frac{1}{24}}{5} = -\frac{1}{120}$$

\therefore श्रेणी है, $(-1) + \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{6}\right) + \left(-\frac{1}{24}\right) + \left(-\frac{1}{120}\right) + \dots = -1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{24} - \frac{1}{120} - \dots$

प्रश्न 13. $a_1 = a_2 = 2, a_n = a_{n-1} - 1, n > 2$

हल दिया है, $a_1 = a_2 = 2$

$$\text{तथा } a_n = a_{n-1} - 1 \quad n > 2$$

$$n = 3 \text{ रखने पर, } a_3 = a_{3-1} - 1 = a_2 - 1 = 2 - 1 = 1$$

$$\begin{aligned} n = 4 \text{ रखने पर, } a_4 &= a_{4-1} - 1 \\ &= a_3 - 1 = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

$$n = 5 \text{ रखने पर, } a_5 = a_{5-1} - 1 = a_4 - 1 = 0 - 1 = -1$$

\therefore श्रेणी है, $2 + 2 + 1 + 0 + (-1) + \dots$

प्रश्न 14. फाइबोनेकी (Fibonacci) अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है $1 = a_1 = a_2$

$$\text{तथा } a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, n > 2, \text{ तो } \frac{a_{n+1}}{a_n} \text{ ज्ञात कीजिए, जबकि } n = 1, 2, 3, 4, 5$$

हल यहाँ, $1 = a_1 = a_2$

$$a_3 = a_{3-1} + a_{3-2}, \quad n > 2$$

$n = 3, 4, 5, 6$ रखने पर,

$$\begin{aligned} n = 3 \text{ पर, } a_3 &= a_{3-1} + a_{3-2} \\ &= a_2 + a_1 \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n = 4 \text{ पर, } a_4 &= a_{4-1} + a_{4-2} \\ &= a_3 + a_2 \\ &= 2 + 1 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n = 5 \text{ पर, } a_5 &= a_{5-1} + a_{5-2} \\ &= a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5 \\ n = 6 \text{ पर, } a_6 &= a_{6-1} + a_{6-2} \\ &= a_5 + a_4 = 5 + 3 = 8 \end{aligned}$$

अब, $\frac{a_{n+1}}{a_n}, n = 1, 2, 3, 4, 5$ के लिए.

$$n = 1 \text{ पर, } \frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$n = 2 \text{ पर},$$

$$\frac{a_3}{a_2} = \frac{2}{1} = 2$$

$$n = 3 \text{ पर},$$

$$\frac{a_4}{a_3} = \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

$$n = 4 \text{ पर},$$

$$\frac{a_5}{a_4} = \frac{5}{3}$$

$$n = 5 \text{ पर},$$

$$\frac{a_6}{a_5} = \frac{8}{5}$$

अतः पद 1, 2, $\frac{3}{2}, \frac{5}{3}$ तथा $\frac{8}{5}$ हैं।

प्रश्नावली 9.2

प्रश्न 1. 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए।

सर्वाधम हम 1 से 2001 तक के पदों की संख्या निकालेंगे और इसके बाद सूत्र

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$
 का प्रयोग करेंगे।

हल 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों की श्रेणी है, 1+3+5+7+...+2001

यहाँ, पहला पद $a = 1$

सार्वान्तर $d = 2$

हम जानते हैं कि श्रेणी का n वाँ पद $T_n = a + (n - 1)d$

$$\begin{aligned} & 2001 = 1 + (n - 1)2 && (\because a = 1, T_n = 2001 \text{ दिया है}) \\ \Rightarrow & 2000 = (n - 1)2 &\Rightarrow (n - 1) = \frac{2000}{2} \\ \Rightarrow & n - 1 = 1000 &\Rightarrow n = 1001 \\ \text{अब, } & \text{अभीष्ट योग } S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d] \\ & = \frac{1001}{2} [2 \times 1 + (1001 - 1) \times 2] \\ & = \frac{1001}{2} \times 2 (1 + 1001 - 1) = 1001 \times 1001 = 1002001 \end{aligned}$$

प्रश्न 2. 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों।

सर्वाधम हम सूत्र $T_n = a + (n - 1)d$ द्वारा 100 तथा 1000 के बीच स्थित उन पदों की कुल संख्या निकालेंगे जो 5 के गुणज हैं तथा इसके बाद सूत्र $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$ का प्रयोग करेंगे।

हल प्रश्नानुसार, संख्याएँ हैं 105, 110, 115, ..., 995

यही, पहला पद, $a = 105$

तथा सार्वांतर, $d = 110 - 105 = 5$

अब, n वें पद

$$T_n = a + (n - 1)d$$

$$\Rightarrow 995 = 105 + (n - 1)5 \quad (\because a = 105, T_n = 995)$$

$$\Rightarrow 995 - 105 = (n - 1)5$$

$$\Rightarrow 890 = (n - 1)5$$

$$\Rightarrow n - 1 = \frac{890}{5} \Rightarrow n - 1 = 178$$

$$\Rightarrow n = 178 + 1 = 179$$

$$\begin{aligned}\text{अतः अभीष्ट संख्याओं का योग } S_n &= \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d] \\ &= \frac{179}{2} [2 \times 105 + (179 - 1)5] \\ &= \frac{179}{2} [210 + 178 \times 5] \\ &= \frac{179}{2} [210 + 890] = \frac{179}{2} \times 1100 \\ &= 179 \times 550 = 98450\end{aligned}$$

प्रश्न 3. किसी समांतर श्रेढ़ी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम पाँच पदों का योगफल, अगले पाँच पदों के योगफल का एक-चौथाई है। दर्शाइए कि 20वें पद - 112 है।

हल मान लीजिए समांतर श्रेढ़ी है, $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$

दिया है, $a = 2$

प्रश्नानुसार,

प्रथम पाँच पदों का योग $= \frac{1}{4}$ अगले पाँच पदों का योग

$$a + (a + d) + (a + 2d) + (a + 3d) + a + 4d$$

$$= \frac{1}{4} [a + 5d + a + 6d + a + 7d + a + 8d + a + 9d]$$

$$\Rightarrow 5a + 10d = \frac{1}{4} [5a + 35d]$$

$$4[5a + 10d] = 5a + 35d$$

$$\Rightarrow 20a + 40d = 5a + 35d \Rightarrow 20a - 5a = 35d - 40d$$

$$\Rightarrow 15a = -5d \Rightarrow 15 \times 2 = -5d$$

$$\Rightarrow 30 = -5d$$

$$(\because a = 2)$$

$$\Rightarrow d = \frac{-30}{5} = -6$$

$$\begin{aligned} \text{अब, } T_n &= a + (n-1)d \\ \Rightarrow T_{20} &= 2 + (20-1)(-6) = 2 + 19(-6) \\ &= 2 - 19 \times 6 = 2 - 114 = -112 \end{aligned}$$

प्रश्न 4. समांतर श्रेढ़ी $-6, -\frac{11}{2}, -5 \dots$ के वित्तने पदों का योगफल -25 है?

हल दिया हुआ अनुक्रम $-6, -\frac{11}{2}, -5 \dots$ समांतर श्रेढ़ी में है।

$$\begin{aligned} \text{यहाँ, } a &= -6 & d &= -\frac{11}{2} - (-6) = -\frac{11}{2} + 6 = -\frac{11}{2} + \frac{6}{2} \\ && d &= \frac{-11+12}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{अब, } S_n &= \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] \\ \Rightarrow -25 &= \frac{n}{2}\left[2 \times (-6) + (n-1)\frac{1}{2}\right] \\ \Rightarrow -25 \times 2 &= n\left[\frac{-12}{1} + \frac{(n-1)}{2}\right] \\ \Rightarrow -50 &= n\left[\frac{-24 + n-1}{2}\right] \\ \Rightarrow -50 \times 2 &= n(n-25) \\ \Rightarrow -100 &= n^2 - 25n \\ \Rightarrow n^2 - 25n + 100 &= 0 \\ \text{मध्य पद को विभक्त कर गुणनखंड जारने पर, } \\ n^2 - (20+5)n + 100 &= 0 \\ \Rightarrow n^2 - 20n - 5n + 100 &= 0 \\ \Rightarrow n(n-20) - 5(n-20) &= 0 \Rightarrow n = 5, 20 \end{aligned}$$

प्रश्न 5. किसी समांतर श्रेढ़ी का p वाँ पद $\frac{1}{q}$ तथा q वाँ पद $\frac{1}{p}$ हो, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग $\frac{1}{2}(pq+1)$ होगा, जहाँ $p \neq q$

सर्वप्रथम हम सूत्र $T_n = a + (n-1)d$ का प्रयोग कर a तथा d के मान निकालेंगे तथा इसके काद पदों के योग का सूत्र $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$ का प्रयोग कर योग निकालेंगे।

$$\text{हल } \therefore T_n = a + (n-1)d$$

$$\therefore T_p = a + (p-1)d = \frac{1}{q} \quad (\text{दिया है}) \dots (i)$$

$$\text{तथा } a + (q-1)d = \frac{1}{p} \quad (\text{दिया है}) \dots (ii)$$

समी (ii) में से समी (i) को घटाने पर,

$$d(p - 1 - q + 1) = \frac{1}{q} - \frac{1}{p}$$

$$\Rightarrow d(p - q) = \frac{p - q}{pq} \Rightarrow d = \frac{1}{pq}$$

d का मान समी (i) में रखने पर,

$$a + \frac{(p - 1)}{pq} = \frac{1}{q}$$

$$a = \frac{1}{q} - \frac{p - 1}{pq}$$

$$a = \frac{p - p + 1}{pq} - \frac{1}{pq}$$

अब,

$$S_{pq} = \frac{pq}{2} [2a + (pq - 1)d] \quad \left[\because S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d] \right]$$

$$= \frac{pq}{2} \left[2 \times \frac{1}{q} + (pq - 1) \frac{1}{pq} \right]$$

$$= \frac{pq}{2} \times \frac{1}{pq} (2 + pq - 1) = \frac{1}{2} (pq + 1) \quad \text{इति सिद्धम्}$$

प्र० 6. यदि किसी समातर श्रेणी 25, 22, 19, ... के कुछ पदों का योगफल 116 है, तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए।

सर्वप्रथम हम सूत्र $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$ का प्रयोग कर पदों की संख्या निकालेंगे।

तत्पश्चात् सूत्र $T_n = a + (n - 1)d$ का प्रयोग करेंगे।

हल दी हुई समातर श्रेणी 25, 22, 19, ... है।

यहाँ $a = 25, d = -3$ तथा $S_n = 116$

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

$$116 = \frac{n}{2} [2 \times 25 + (n - 1)(-3)]$$

$$116 \times 2 = n [50 - 3n + 3]$$

$$232 = n [53 - 3n]$$

$$232 = 53n - 3n^2$$

$$3n^2 - 53n + 232 = 0$$

अब, मध्य पद विभक्त कर गुणनखंड करने पर,

$$\Rightarrow 3n^2 - (24 + 29)n + 232 = 0$$

$$\Rightarrow 3n^2 - 24n - 29n + 232 = 0$$

$$\Rightarrow 3n(n - 8) - 29(n - 8) = 0$$

$$\Rightarrow (3n - 29)(n - 8) = 0$$

$$n = \frac{29}{3}, n = 8$$

$n = \frac{29}{3}$ अपान्य है क्योंकि n भिन्न नहीं हो सकता। अतः केवल $n = 8$ मान्य है।

अब,

$$T_n = a + (n - 1)d$$

$$T_8 = 25 + (8 - 1)(-3)$$

$$= 25 + 7 \times (-3) = 25 - 21 = 4$$

प्रश्न 7. उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका K वाँ पद $5K + 1$ है।

सर्वप्रथम हम K वाँ पद की मदद से बोली निकालेंगे तथा इसके बाद n पदों के योग का सूत्र

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$
 का प्रयोग करके योग ज्ञात करेंगे।

हल दिया है, K वाँ पद $T_K = 5K + 1$

$K = 1, 2, 3, 4, \dots$ रखने पर,

$$T_1 = 5 \times 1 + 1 = 6$$

$$T_2 = 5 \times 2 + 1 = 11$$

$$T_3 = 5 \times 3 + 11 = 16$$
 इत्यादि

$$\Rightarrow a = 6, d = 11 - 6 = 5$$

$$\text{अब, } S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d] = \frac{n}{2} [2 \times 6 + (n - 1)5]$$

$$= \frac{n}{2} [12 + 5n - 5] = \frac{n}{2} [5n + 7]$$

प्रश्न 8. यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल $(pn + qn^2)$ है, जहाँ p तथा q अचर हों, तो सार्वान्तर ज्ञात कीजिए।

यहाँ हम $T_n = S_n - S_{n-1}$ का प्रयोग कर T_n ज्ञात करेंगे तथा इसके बाद हम कोई एक पद तथा सार्वान्तर ज्ञात कर सकते हैं।

हल दिया है, $S_n = pn + qn^2$

अब,

$$T_n = S_n - S_{n-1}$$

$$\Rightarrow T_n = (pn + qn^2) - [p(n - 1) + q(n - 1)^2]$$

$$= pn + qn^2 - [pn - p + q(n^2 + 1 - 2n)]$$

$$= pn + qn^2 - (pn - p + qn^2 + q - 2qn)$$

$$= pn + qn^2 - pn + p - qn^2 - q + 2qn = p - q + 2qn$$

अब, $n = 1, 2, 3, \dots$ रखने पर,

$$\begin{aligned} \Rightarrow T_1 &= p - q + 2q \times 1 = p - q + 2q = p + q \\ \Rightarrow T_2 &= p - q + 2q \times 2 = p - q + 4q = p + 3q \\ \Rightarrow T_3 &= p - q + 2q \times 3 = p - q + 6q = p + 5q \\ &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

अतः श्रेणी है $p + q, p + 3q, p + 5q, \dots$

जिसका सार्वान्तर $= (p + 3q) - (p + q) = 2q$

प्रश्न 9. दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात $5n + 4 : 9n + 6$ हो, तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल मान लीजिए दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद तथा सार्वान्तर क्रमशः a_1, a_2 तथा d_1, d_2 हैं। प्रश्नानुसार,

$$\begin{aligned} \frac{S_{n_1}}{S_{n_2}} &= \frac{5n+4}{9n+6} \\ \Rightarrow \frac{\frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d_1]}{\frac{n}{2}[2a_2 + (n-1)d_2]} &= \frac{5n+4}{9n+6} \quad \left[\because S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} \right] \\ \Rightarrow \frac{2a_1 + (n-1)d_1}{2a_2 + (n-1)d_2} &= \frac{5n+4}{9n+6} \end{aligned}$$

(हमें 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है इसलिए 2 उभयनिष्ठ लेकर समीकरण को n वें पद में बदल लेते हैं।)

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{2 \left[a_1 + \frac{n-1}{2}d_1 \right]}{2 \left[a_2 + \frac{n-1}{2}d_2 \right]} &= \frac{5n+4}{9n+6} \\ \Rightarrow \frac{a_1 + \left(\frac{n-1}{2} \right) d_1}{a_2 + \left(\frac{n-1}{2} \right) d_2} &= \frac{5n+4}{9n+6} \quad \dots(i) \end{aligned}$$

हमें $\frac{a_1 + 17d_1}{a_2 + 17d_2}$ का मान ज्ञात करना है।

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{n-1}{2} &= 17 \Rightarrow n-1 = 2 \times 17 \\ \Rightarrow n &= 34 + 1 \Rightarrow n = 35 \end{aligned}$$

अतः समी (i) से,

$$\frac{a_1 + 17d_1}{a_2 + 17d_2} = \frac{5 \times 35 + 4}{9 \times 35 + 6} = \frac{175 + 4}{315 + 6} = \frac{179}{321}$$

प्रश्न 10. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी के प्रथम p एवं का योग, प्रथम q एवं का योगफल के बराबर हो, तो प्रथम $(p+q)$ एवं का योगफल ज्ञात कीजिए।

$$\text{सूत्र } S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \text{ का प्रयोग कर इसे सरल करें।}$$

हल मान लीजिए दी हर्दि समांतर श्रेढ़ी का प्रथम पद a तथा सार्वान्तर d है।

प्रश्नानुसार, जूँकि प्रथम p एवं का योग, प्रथम q एवं का योग के बराबर है।

$$\begin{aligned} & S_p = S_q \\ \Rightarrow & \frac{p}{2} [2a + (p-1)d] = \frac{q}{2} [2a + (q-1)d] \\ & \quad \left[\because S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \right] \\ \Rightarrow & p[2a + (p-1)d] = q[2a + (q-1)d] \\ \Rightarrow & 2ap + p(p-1)d = 2aq + q(q-1)d \\ \Rightarrow & 2ap - 2aq = q(q-1)d - p(p-1)d \\ \Rightarrow & 2a(p-q) = d(q^2 - q - p^2 + p) \\ \Rightarrow & 2a(p-q) = d[(p-q) + (q-p)(q+p)] \\ \Rightarrow & 2a(p-q) = d(p-q)[1 - (p+q)] \\ \Rightarrow & 2a = d[1 - (p+q)] \\ \Rightarrow & 2a = -d[(p+q) - 1] \\ \Rightarrow & 2a + d(p+q - 1) = 0 \quad \dots(i) \\ \text{अब, } & S_{p+q} = \frac{p+q}{2} [2a + (p+q-1)d] \\ & = \frac{p+q}{2} \times 0 \quad [\text{सभी (i) से}] \\ & = 0 \end{aligned}$$

प्रश्न 11. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी के प्रथम p, q, r एवं का योगफल क्रमशः a, b तथा c हो, तो सिद्ध कीजिए कि

$$\frac{a}{p} (q-r) + \frac{b}{q} (r-p) + \frac{c}{r} (p-q) = 0$$

हल मान लीजिए समांतर श्रेढ़ी का प्रथम पद A तथा सार्वान्तर d है।

$$\text{दिया है, } S_p = a \Rightarrow \frac{p}{2} [2A + (p-1)d] = a \quad \left[\because S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \right] \dots(ii)$$

$$S_q = b \Rightarrow \frac{q}{2} [2A + (q-1)d] = b \quad \dots(iii)$$

$$S_r = c \Rightarrow \frac{r}{2} [2A + (r-1)d] = c \quad \dots(iv)$$

अब, हमें

$$\frac{a}{p}(q-r) + \frac{b}{q}(r-p) + \frac{c}{r}(p-q) = 0 \text{ सिद्ध करना है।}$$

$$\text{बायीं पक्ष} = \frac{a}{p}(q-r) + \frac{b}{q}(r-p) + \frac{c}{r}(p-q)$$

सभी (i), (ii) तथा (iii) से क्रमशः a, b तथा c के मान रखने पर,

$$\therefore \text{बायीं पक्ष} = \frac{1}{p} \times \frac{p}{2} [2A + (p-1)d](q-r) + \frac{1}{q} \times \frac{q}{2}$$

$$[2A + (q-1)d](r-p) + \frac{1}{r} \times \frac{r}{2} [2A + (r-1)d](p-q)$$

$$= \frac{1}{2} [(2A + (p-1)d)(q-r) + (2A + (q-1)d)$$

$$(r-p) + (2A + (r-1)d)(p-q)]$$

$$= \frac{1}{2} [2A(q-r) + (p-1)d(q-r) + 2A(r-p)$$

$$+ (q-1)d(r-p) + 2A(p-q) + (r-1)d(p-q)]$$

$$= \frac{1}{2} 2A(q-r+r-p+p-q)$$

$$+ d[(p-1)(q-r) + (q-1)(r-p) + (r-1)(p-q)]$$

$$= \frac{1}{2} [2A \times (0) + d(pq - pr - q + qr - pq - r + p + qp - rq - p + q)]$$

$$= \frac{1}{2} (0 + d \times 0) = 0$$

$$\therefore \text{बायीं पक्ष} = \text{दायीं पक्ष}$$

इति सिद्धम्

नोट: यहाँ शिलार्थी को पहला पद a नहीं लेना चाहिए क्योंकि p पदों का योग a दिया दुआ है।

प्रश्न 12. किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात $m^2 : n^2$ है, तो दर्शाइए कि mवें तथा nवें पदों का अनुपात $(2m-1) : (2n-1)$ है।

हल: मान लीजिए समांतर श्रेणी है, a, a+d, a+2d, a+3d ...

दिया है,

$$\frac{S_m}{S_n} = \frac{m^2}{n^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{m}{2} [2a + (m-1)d]}{\frac{n}{2} [2a + (n-1)d]} = \frac{m^2}{n^2} \quad \left[\because S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{m [2a + (m-1)d]}{n [2a + (n-1)d]} = \frac{m^2}{n^2}$$

$$\Rightarrow \frac{2a + (m-1)d}{2a + (n-1)d} = \frac{m}{n}$$

$$\begin{aligned}
 & \Rightarrow [2a + (m-1)d]n = [2a + (n-1)d]m \\
 & \Rightarrow 2an + (m-1)dn = 2am + (n-1)dm \\
 & \Rightarrow 2an - 2am = (n-1)dm - (m-1)dn \\
 & \Rightarrow 2a(n-m) = d[(n-1)m - (m-1)n] \\
 & \Rightarrow 2a(n-m) = d(mn - m - mn + n) \\
 & \Rightarrow 2a(n-m) = d(n-m) \Rightarrow 2a = d \\
 \text{अब, } & \frac{T_m}{T_n} = \frac{a + (m-1)d}{a + (n-1)d} = \frac{a + (m-1)2a}{a + (n-1)2a} \quad [\because T_n = a + (n-1)d]
 \end{aligned}$$

अंश तथा हर से 2 उभयनिष्ठ लेने पर,

$$\Rightarrow \frac{T_m}{T_n} = \frac{1+2(m-1)}{1+2(n-1)} = \frac{1+2m-2}{1+2n-2} = \frac{2m-1}{2n-1}$$

प्रश्न 13. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी के n वें पद का योगफल $3n^2 + 5n$ है तथा इसका m वाँ पद 164 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए।

जब कभी किसी का योग दिया हुआ होता है, तब हमें सूत्र $T_m = S_m - S_{m-1}$ का प्रयोग कर T_m निकालना चाहिए और बाद में इसे सरल करना चाहिए।

$$\begin{aligned}
 \text{हल} & \text{ दिया है, } \quad S_n = 3n^2 + 5n \\
 \therefore & \quad S_m = 3m^2 + 5m \quad \text{तथा } S_{m-1} = 3(m-1)^2 + 5(m-1)
 \end{aligned}$$

सूत्र $T_m = S_m - S_{m-1}$ का प्रयोग करने पर,

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow T_m &= (3m^2 + 5m) - [3(m-1)^2 + 5(m-1)] \\
 &= (3m^2 + 5m) - [3(m^2 + 1 - 2m) + 5m - 5] \\
 &= (3m^2 + 5m) - (3m^2 + 3 - 6m + 5m - 5) \\
 &= 3m^2 + 5m - 3m^2 - 3 + 6m - 5m + 5 = 6m + 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{किंतु} & \text{ दिया है, } \quad T_m = 164 \\
 \therefore & \quad 6m + 2 = 164 \quad \Rightarrow 6m = 164 - 2 \\
 \Rightarrow & \quad 6m = 162 \quad \Rightarrow m = \frac{162}{6} = 27
 \end{aligned}$$

प्रश्न 14. 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएँ डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेढ़ी बन जाए।

हल मान लीजिए 8 और 26 के बीच 5 संख्याएँ A_1, A_2, A_3, A_4 तथा A_5 हैं, तब $8, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, 26$ समांतर श्रेढ़ी में होंगी।

$$\begin{aligned}
 \therefore & \quad T_n = a + (n-1)d \\
 \therefore & \quad 26 = 8 + (7-1)d \quad (n=7 \because 2 \text{ पद हैं तथा } 5 \text{ संख्याएँ हैं}) \\
 \Rightarrow & \quad 26 - 8 = 6d
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 18 = 6d \Rightarrow d = \frac{18}{6} \Rightarrow d = 3$$

अब, $A_1 = a + d = 8 + 3 = 11$

$$\Rightarrow A_2 = a + 2d = 8 + 2 \times 3 = 14$$

$$A_3 = a + 3d = 8 + 3 \times 3 = 17$$

$$A_4 = a + 4d = 8 + 4 \times 3 = 20$$

तथा $A_5 = a + 5d = 8 + 5 \times 3 = 23$

प्रश्न 15. यदि $\frac{a^n + b^n}{a^{n-1} + b^{n-1}}$, a तथा b के बीच समांतर माध्य हो, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

हम जानते हैं कि दो संख्याएँ a तथा b के बीच समांतर माध्य $\frac{a+b}{2}$ होता है। प्रश्न में दिए

हुए समांतर माध्य को $\frac{a+b}{2}$ के बराबर रखकर इसे हल करते हैं।

हल a तथा b के बीच दिया हुआ समांतर माध्य $\frac{a^n + b^n}{a^{n-1} + b^{n-1}}$ है किंतु हम जानते हैं कि a तथा b के बीच समांतर माध्य $\frac{a+b}{2}$ होता है।

$$\begin{aligned} \therefore \frac{a^n + b^n}{a^{n-1} + b^{n-1}} &= \frac{a+b}{2} \\ \Rightarrow 2(a^n + b^n) &= (a^{n-1} + b^{n-1})(a+b) \\ \Rightarrow 2a^n + 2b^n &= a^{n-1}a + a^{n-1}b + b^{n-1}a + b^{n-1}b \\ \Rightarrow 2a^n + 2b^n &= a^n + a^{n-1}b + b^{n-1}a + b^n \\ \Rightarrow 2a^n + 2b^n - a^n - a^{n-1}b - b^{n-1}a - b^n &= 0 \\ \Rightarrow a^n + b^n - a^{n-1}b - b^{n-1}a &= 0 \\ \Rightarrow (a^n - a^{n-1}b) + (b^n - b^{n-1}a) &= 0 \\ \Rightarrow a^{n-1}(a-b) - b^{n-1}(a-b) &= 0 \\ \Rightarrow (a-b)(a^{n-1} - b^{n-1}) &= 0 \\ \Rightarrow a^{n-1} - b^{n-1} &= 0 \quad (\because a-b \neq 0) \\ \Rightarrow a^{n-1} = b^{n-1} &\Rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^{n-1} = 1 \end{aligned}$$

दोनों ओर $\left(\frac{a}{b}\right)$ के घातों की तुलना करने पर,

$$\Rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^{n-1} = \left(\frac{a}{b}\right)^0 \Rightarrow n-1 = 0 \Rightarrow n = 1$$

प्रश्न 16. m संख्याओं को 1 तथा 31 तक रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और यहीं एवं $(m - 1)$ वाँ संख्याओं का अनुपात 5 : 9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए।

दी हुई संख्याओं के बीच संख्या रखने के बाद, सर्वप्रथम हम सूत्र $T_n = a + (n - 1)d$ का प्रयोग कर d निकालेंगे तथा इसे हुए अनुपात का प्रयोग कर हम m का मान निकालेंगे।

हल मान लीजिए 1 तथा 31 के बीच m संख्याएँ $A_1, A_2, A_3, \dots, A_m$ हैं।

अर्थात् $1, A_1, A_2, A_3, \dots, A_m, 31$ समांतर श्रेणी है।

अब,

$$T_n = a + (n - 1)d$$

$$31 = 1 + (m + 2 - 1)d$$

[$\because n = m + 2$ जहाँ दो पद (1 तथा 31) हैं, m संख्याएँ हैं]

$$\Rightarrow 31 - 1 = (m + 1)d$$

$$\Rightarrow 30 = (m + 1)d \Rightarrow d = \frac{30}{m + 1} \quad \dots (i)$$

दिया है,

$$\frac{T_7}{T_{m-1}} = \frac{5}{9}$$

$$\Rightarrow \frac{a + 7d}{a + (m - 1)d} = \frac{5}{9}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + 7 \times \frac{30}{m+1}}{1 + (m-1) \times \frac{30}{m+1}} = \frac{5}{9} \quad [\text{समी (i) से}]$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{m+1+210}{m+1}}{\frac{(m+1) \times 30(m-1)}{m+1}} = \frac{5}{9} \Rightarrow \frac{m+211}{m+1+30m-30} = \frac{5}{9}$$

$$\Rightarrow 9(m+211) = 5(31m-29)$$

$$\Rightarrow 9m + 1899 = 155m - 145$$

$$\Rightarrow 1899 + 145 = 155m - 9m$$

$$\Rightarrow 146m = 2044$$

$$\Rightarrow m = \frac{2044}{146} = 14$$

प्रश्न 17. एक च्यवित उद्धरण का मुग्धान $\text{₹}100$ की प्रथम किशत से शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किशत में ₹ 5 प्रतिमाह बढ़ाता है, तो 30वीं किशत की राशि क्या होगी?

यहीं प्रथम किशत को समांतर श्रेणी का प्रथम पद लेते हैं तथा प्रतिमाह दृष्टि किशत को समांतर श्रेणी का सार्वान्तर लेते हैं।

हल दिया है, $a = 100, d = 5 \quad \therefore T_n = a + (n - 1)d$

$$\therefore T_{30} = 100 + (30 - 1)5 = 100 + 29 \times 5 = 100 + 145 = 245$$

प्रश्न 18. एक बहुभुज की दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर 5° है। यदि सबसे छोटा कोण 120° हो, तो बहुभुज की मुजाहों की संख्या ज्ञात कीजिए।

यहाँ हम बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के योग का सूत्र $(n - 2) 180^\circ$ का प्रयोग करेंगे।

हल हम जानते हैं कि $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$

परंतु किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के योग के लिए, $S_n = (n - 2) 180^\circ$

$$\therefore (n - 2) 180^\circ = \frac{n}{2} [2 \times 120^\circ + (n - 1)(5)] \quad (\because a = 120^\circ, d = 5)$$

$$\Rightarrow (n - 2) 180 \times 2 = n(240 + 5n - 5)$$

$$\Rightarrow (n - 2) 360 = n(5n + 235)$$

$$\Rightarrow (n - 2) 72 = n(n + 47) \Rightarrow 72n - 144 = n^2 + 47n$$

$$\Rightarrow n^2 + 47n - 72n + 144 = 0 \Rightarrow n^2 - 25n + 144 = 0$$

अब, नव्य पद को विभक्त कर गुणनखंड करने पर,

$$\Rightarrow n^2 - (16 + 9)n + 144 = 0$$

$$\Rightarrow n^2 - 16n - 9n + 144 = 0$$

$$\Rightarrow n(n - 16) - 9(n - 16) = 0$$

$$\Rightarrow (n - 16)(n - 9) = 0$$

$$\Rightarrow n = 9, 16$$

केवल $n = 9$ अभीष्ट मुजाहों की संख्या है।

नोट यदि $n = 16$,

$$\Rightarrow T_n = 120 + (16 - 1) 5 = 120 + 15 \times 5 = 120 + 75 = 195 > 180^\circ$$

जो सम्भव नहीं है।

अतः बहुभुज में मुजाहों की संख्या 9 है।

प्रश्नावली 9.3

प्रश्न 1. गुणोत्तर श्रेणी $\frac{5}{2}, \frac{5}{4}, \frac{5}{8}, \dots$ का 20वाँ तथा n वाँ पद ज्ञात कीजिए।

(प्र. स. 1 - 4) गुणोत्तर श्रेणी के n वें पद का सूत्र $T_n = ar^{n-1}$ का प्रयोग करेंगे।

हल यह श्रेणी है, $\frac{5}{2}, \frac{5}{4}, \frac{5}{8}, \dots$

$$\text{यहाँ, } a = \text{प्रथम पद} = \frac{5}{2} \text{ तथा सार्वनुपात } (r) = \frac{5/4}{5/2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

जब, $T_n = ar^{n-1}$

$$\Rightarrow T_{20} = ar^{20-1} = \left(\frac{5}{2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right)^{20-1} = \frac{5}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{19} = \frac{5}{2} \times \frac{1}{2^{19}} = \frac{5}{2^{20}}$$

पुनः $T_n = ar^{n-1} = \left(\frac{5}{2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{5}{2} \times \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{5}{2^{1+n-1}} = \frac{5}{2^n}$

प्रश्न 2. उस गुणोत्तर श्रेढ़ी का 12वाँ पद ज्ञात कीजिए, जिसका 8वाँ पद 192 तथा सार्वानुपात 2 है।

हल दिया है, 8वाँ पद $T_8 = 192$

तथा सार्वानुपात

$$r = 2$$

$$\Rightarrow ar^{8-1} = 192 \quad (\because T_n = ar^{n-1})$$

$$\Rightarrow a \times (2)^7 = 192$$

$$\Rightarrow a \times 128 = 192$$

$$\Rightarrow a = \frac{192}{128} = \frac{48}{32} = \frac{3}{2}$$

जब, $T_{12} = ar^{12-1} = \frac{3}{2} \times (2)^{11} = \frac{3}{2} \times 2^{11} = 3 \times 2^{10} = 3 \times 1024 = 3072$

प्रश्न 3. किसी गुणोत्तर श्रेढ़ी का 5वाँ, 8वाँ तथा 11वाँ पद क्रमशः p, q तथा s हैं, तो दिखाइए कि $q^2 = ps$

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेढ़ी का प्रथम पद a तथा सार्वानुपात r है।

$$T_5 = p \Rightarrow ar^4 = p \quad \dots(i)$$

$$T_8 = q \Rightarrow ar^7 = q \quad \dots(ii)$$

तथा $T_{11} = s \Rightarrow ar^{10} = s \quad \dots(iii)$

सभी (i) तथा (ii) को गुणा करने पर,

$$ar^4 \times ar^{10} = ps$$

$$a^2 r^{14} = ps$$

$$\Rightarrow [(ar)^7]^2 = ps \quad (\text{सभी (ii) से})$$

$$\Rightarrow q^2 = ps \quad \text{इति शिद्धम्}$$

प्रश्न 4. किसी गुणोत्तर श्रेढ़ी का चौथा पद उसके दूसरे पद का चारगुण है तथा प्रथम पद - 3 है, तो 7वाँ पद ज्ञात कीजिए।

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेढ़ी का प्रथम पद a तथा सार्वानुपात r है।

दिया है, $T_4 = (T_2)^2 \quad (\because T_n = ar^{n-1})$

$$\Rightarrow ar^3 = (ar)^2$$

$$\Rightarrow ar^3 = a^2 r^2$$

$$\Rightarrow r = a$$

किंतु दिया है,

$$a = -3$$

$$\Rightarrow r = -3$$

अब,

$$T_7 = ar^6 = (-3)(-3)^6 = (-3)^7 = -2187$$

प्रश्न 5. अनुक्रम का कौन-सा पद

- (i) $2, 2\sqrt{2}, 4, \dots; 128$ है? (ii) $\sqrt{3}, 3, 3\sqrt{3}, \dots; 729$ है? (iii) $\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots; \frac{1}{19683}$ है?

गुणोत्तर श्रेढ़ी के न्यून पद का सूत्र $T_n = ar^{n-1}$ का प्रयोग कर हम इसका मान निकालेंगे।

हल (i) अभी है, $2, 2\sqrt{2}, 4, \dots$

$$\text{यहाँ, } a = 2, r = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$\text{तथा } T_n = 128$$

(दिया है)

$$\text{अब, } T_n = ar^{n-1}$$

$$\Rightarrow 128 = 2(\sqrt{2})^{n-1} \Rightarrow 2^{\frac{n-1}{2}} = \frac{128}{2}$$

$$\Rightarrow 2^{\frac{n-1}{2}} = 64 \Rightarrow 2^{\frac{n-1}{2}} = 2^6$$

दोनों ओर 2 के पास यी तुलना करने पर,

$$\Rightarrow \frac{n-1}{2} = 6 \Rightarrow n = 12 + 1 \Rightarrow n = 13$$

(ii) $\sqrt{3}, 3, 3\sqrt{3}, \dots$

$$\text{यहाँ, } a = \sqrt{3}, r = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}, T_n = 729$$

(दिया है)

$$\text{अब, } T_n = ar^{n-1}$$

$$\Rightarrow 729 = \sqrt{3}(\sqrt{3})^{n-1}$$

$$\Rightarrow 729 = (\sqrt{3})^n \Rightarrow 3^{\frac{n}{2}} = 3^6$$

दोनों ओर 3 के पास यी तुलना करने पर,

$$\Rightarrow \frac{n}{2} = 6 \Rightarrow n = 12$$

(iii) $\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots$

$$\text{यहाँ, } a = \frac{1}{3}, r = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

(दिया है)

अब,

$$T_n = \frac{1}{19683}$$

$$T_n = a r^{n-1}$$

$$\frac{1}{19683} = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \Rightarrow \frac{1}{6561} = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^8$$

दोनों ओर $(1/3)$ के पात्र की तुलना करने पर,

$$\Rightarrow n-1=8 \Rightarrow n=8+1 \Rightarrow n=9$$

प्रश्न 6. x के किस मान के लिए संख्याएँ $-\frac{2}{7}, x, -\frac{7}{2}$ गुणोत्तर श्रेणी में हैं?

हम जानते हैं कि यदि तीन संख्याएँ a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में हों, तब $b^2 = ac$

हल चूंकि $-\frac{2}{7}, x, -\frac{7}{2}$ गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तब

$$\Rightarrow x^2 = \left(-\frac{2}{7}\right) \times \left(-\frac{7}{2}\right) \Rightarrow x^2 = \frac{2}{7} \times \frac{7}{2}$$

$$\Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

निर्देश (प्र. सं. 7 - 10) निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट यदों तक ज्ञात कीजिए।

(प्र. सं. 7 - 10) यहाँ, हम सूत्र $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$, $r > 1$ या $S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$, $r < 1$ का प्रयोग

कर सरल करेंगे।

प्रश्न 7. $0.15, 0.015, 0.0015, \dots, 20$ यदों तक

हल यहाँ, $a = 0.15$, $r = \frac{0.015}{0.15} = \frac{15}{1000} = \frac{1}{15}$

$$r = \frac{1}{10} < 1 \text{ तथा } n = 20$$

अब,

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

$$\Rightarrow S_{20} = \frac{0.15 \left[1 - \left(\frac{1}{10}\right)^{20} \right]}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{0.15 \left[1 - \frac{1}{10^{20}} \right]}{\frac{9}{10}} = \frac{0.15 \times 10}{9} \left(1 - \frac{1}{10^{20}} \right)$$

$$= \frac{15 \times 10}{900} \left[1 - \left(\frac{1}{10}\right)^{20} \right] = \frac{1}{6} [1 - (0.1)^{20}]$$

प्रश्न 8. $\sqrt{7}, \sqrt{21}, 3\sqrt{7}, \dots, n$ पदों तक

हल यहाँ, $a = \sqrt{7}, r = \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7} \times 3}{\sqrt{7}} = \sqrt{3} > 1$

$$\therefore S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (\because r > 1)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow S_n &= \frac{\sqrt{7} [(\sqrt{3})^n - 1]}{\sqrt{3} - 1} = \frac{\sqrt{7} [(3^{n/2})^n - 1]}{\sqrt{3} - 1} \times \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} + 1} \\ &= \frac{\sqrt{7} (\sqrt{3} + 1) (3^{n/2} - 1)}{3 - 1} \quad [\because a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)] \\ &= \frac{\sqrt{7}}{2} (\sqrt{3} + 1) (3^{n/2} - 1) \end{aligned}$$

प्रश्न 9. $1 - a, a^2, -a^3, \dots, n$ पदों तक (यदि $a \neq -1$)

हल यहाँ, $a = 1, r = -\frac{a}{1} = -a < 1$

$$\therefore S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad (\because r < 1)$$

$$S_n = \frac{1 \{1 - (-a)^n\}}{1 - (-a)} = \frac{1 - (-a)^n}{1 + a}$$

प्रश्न 10. x^2, x^5, x^7, \dots, n पदों तक (यदि $x \neq \pm 1$)

हल यहाँ, $a = x^2, r = \frac{x^5}{x^2} = x^3$

$$\therefore S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad (\because r < 1)$$

$$\therefore S_n = \frac{x^2 [1 - (x^2)^n]}{1 - x^2} = \frac{x^2 (1 - x^{2n})}{1 - x^2}$$

प्रश्न 11. मान ज्ञात कीजिए $\sum_{k=1}^{11} (2 + 3^k)$

$$\begin{aligned} \text{हल. } \sum_{k=1}^{11} 2 + \sum_{k=1}^{11} 3^k &= 2 \times 11 + (3^1 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{11}) \quad \left[\because S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, r > 1 \right] \\ &= 22 + \frac{3(3^{11} - 1)}{3 - 1} = 22 + \frac{3(3^{11} - 1)}{2} \end{aligned}$$

प्रश्न 12. एक गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योगफल $\frac{39}{10}$ है तथा उनका गुणनफल 1 है।

सार्वानुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए।

यहाँ, हम गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्याएँ $\frac{a}{r}, a, ar$ लेकर यी यही शर्त का प्रयोग करेंगे।

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी की तीन संख्याएँ $\frac{a}{r}$, a तथा ar हैं।

$$\therefore \text{प्रश्नानुसार, } \frac{a}{r} + a + ar = \frac{39}{10} \quad \dots(1)$$

$$\text{तथा } \left(\frac{a}{r}\right) \times (a) \times (ar) = 1 \Rightarrow a^3 = 1 \Rightarrow a = 1$$

$$\text{सभी (1) में } a = 1 \text{ रखने पर, } \frac{1}{r} + 1 + r = \frac{39}{10} \Rightarrow \frac{1}{r} + \frac{1}{1} + \frac{r}{1} = \frac{39}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{1+r+r^2}{r} = \frac{39}{10}$$

$$\Rightarrow 10 + 10r + 10r^2 = 39$$

$$\Rightarrow 10r^2 + 10r - 39r + 10 = 0$$

$$\Rightarrow 10r^2 - 29r + 10 = 0$$

अब, नियम पद को विभक्त कर गुणनखंड करने पर,

$$\Rightarrow 10r^2 - 25r - 4r + 10 = 0$$

$$\Rightarrow 5r(2r - 5) - 2(2r - 5) = 0$$

$$\Rightarrow (5r - 2)(2r - 5) = 0$$

$$\Rightarrow 5r - 2 = 0 \quad \text{तथा} \quad 2r - 5 = 0$$

$$\Rightarrow r = \frac{2}{5} \quad \text{तथा} \quad r = \frac{5}{2}$$

जब $a = 1$ तथा $r = \frac{2}{5}$, तब संख्याएँ हैं

$$\frac{a}{r} = \frac{1}{\frac{2}{5}} = \frac{5}{2}, \quad a = 1 \quad \text{तथा} \quad ar = 1 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\therefore \frac{5}{2}, 1, \frac{2}{5}$$

जब $a = 1$ तथा $r = \frac{5}{2}$, तब संख्याएँ हैं

$$\frac{a}{r} = \frac{1}{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5}, \quad a = 1 \quad \text{तथा} \quad ar = 1 \times \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\therefore \frac{2}{5}, 1, \frac{5}{2}$$

प्रश्न 13. गुणोत्तर श्रेणी $3, 3^2, 3^3, \dots$ के कितने पद आवश्यक हैं, ताकि उनका योगफल 120 हो जाए?

यहाँ, हम सूत्र $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$, $r > 1$ का प्रयोग कर n का मान निकालेंगे।

हल यहाँ, $a = 3, r = 3, S_n = 120$

अब,

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, r > 1$$
$$\Rightarrow 120 = \frac{3(3^n - 1)}{3 - 1}$$
$$\Rightarrow 120 = \frac{3(3^n - 1)}{2}$$
$$\Rightarrow 120 \times 2 = 3(3^n - 1)$$
$$\Rightarrow \frac{240}{3} = 3^n - 1$$
$$\Rightarrow 3^n - 1 = 80 \Rightarrow 3^n = 80 + 1$$
$$\Rightarrow 3^n = 81 \Rightarrow 3^n = 3^4$$

दोनों ओर 3 के घातों की तुलना करने पर,

$$\Rightarrow n = 4$$

प्रश्न 14. किसी गुणोत्तर श्रेढ़ी के प्रथम तीन पदों का योगफल 16 है तथा अगले तीन पदों का योग 128 है, तो गुणोत्तर श्रेढ़ी का प्रथम पद, सार्वानुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए।

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेढ़ी है, a, ar, ar^2, ar^3, \dots

दिया है, $a + ar + ar^2 = 16 \quad \dots(i)$

तथा $ar^3 + ar^4 + ar^5 = 128 \quad \dots(ii)$

समी (i) को समी (ii) से भाग करने पर, $\frac{a + ar + ar^2}{ar^3 + ar^4 + ar^5} = \frac{16}{128}$

$$\Rightarrow \frac{a(1 + r + r^2)}{ar^3(1 + r + r^2)} = \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{1}{r^3} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{1}{r}\right)^3$$

दोनों ओर घात 3 के आधार की तुलना करने पर,

$$\Rightarrow r = 2$$

$r = 2$ समी (i) में रखने पर,

$$\Rightarrow a + 2a + 4a = 16$$

$$\Rightarrow 7a = 16$$

$$\Rightarrow a = \frac{16}{7}$$

अब, $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (\because r = 2 > 1)$

$$= \frac{\frac{16}{7}(2^n - 1)}{2 - 1} = \frac{16}{7}(2^n - 1) \quad (\because r > 1)$$

$$a = \frac{16}{7}, r = 2$$

$$\text{तथा } S_n = \frac{16}{7} (2^n - 1)$$

प्रश्न 15. एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद $a = 729$ तथा 7वाँ पद 64 है, तो S_7 ज्ञात कीजिए।

हल दिया है, $a = 729, T_7 = 64$

$$\Rightarrow ar^{7-1} = 64$$

$$\Rightarrow 729r^6 = 64$$

$$\Rightarrow r^6 = \frac{64}{729} = \left(\frac{2}{3}\right)^6$$

दोनों ओर घात 6 के आधार की तुलना करने पर,

$$\Rightarrow r = \frac{2}{3} < 1$$

$$\text{अब, } S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

$$S_7 = \frac{729 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^7 \right]}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{729 \left(1 - \frac{2^7}{3^7} \right)}{\frac{1}{1} - \frac{2}{3}}$$

$$= \frac{729 \left(\frac{1}{1} - \frac{128}{2187} \right)}{\frac{3-2}{3}} = \frac{729 \times 3}{1} \times \frac{2187 - 128}{2187}$$

$$= \frac{1}{1} \times 2059 = 2059$$

प्रश्न 16. एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। जिसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 है तथा 5 वाँ पद तृतीय पद का 4 गुना है।

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी है, a, ar, ar^2, ar^3, \dots

$$\text{दिया है, } a + ar = -4 \quad \dots(i)$$

$$\text{तथा } T_5 = 4T_3$$

$$\Rightarrow ar^{5-1} = 4ar^{3-1}$$

$$\Rightarrow r^4 = 4r^2$$

$$\Rightarrow r^2 = 4$$

$$\Rightarrow r = \pm 2$$

यदि $r = 2$, तब सभी (i) से, $a + ar(2) = -4$

$$3a = -4$$

$$\Rightarrow a = -\frac{4}{3}$$

अतः गुणोत्तर श्रेढ़ी है $-\frac{4}{3}, \left(-\frac{4}{3}\right)(2), \left(-\frac{4}{3}\right)(2)^2, \dots, -\frac{4}{3}, -\frac{8}{3}, -\frac{16}{3}, \dots$

यदि $r = -2$, तब सभी (i) से,

$$a + ar(-2) = -4$$

$$\Rightarrow -a = -4$$

$$\Rightarrow a = 4$$

अतः गुणोत्तर श्रेढ़ी है, $4, 4(-2), 4(-2)^2, \dots, 4, -8, 16, \dots$

प्रश्न 17. यदि किसी गुणोत्तर श्रेढ़ी का 4वाँ, 10वाँ तथा 16वाँ पद क्रमसः x, y तथा z हैं, तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं।

हल दिया है, $T_4 = x \Rightarrow ar^{4-1} = x \Rightarrow ar^3 = x \quad \dots(i)$

$T_{10} = y \Rightarrow ar^{10-1} = y \Rightarrow ar^9 = y \quad \dots(ii)$

$T_{16} = z \Rightarrow ar^{16-1} = z \Rightarrow ar^{15} = z \quad \dots(iii)$

सभी (i) को सभी (iii) से गुणा करने पर,

$$\Rightarrow ar^3 \times ar^{15} = x \times z$$

$$\Rightarrow a^2 r^{3+15} = xz$$

$$\Rightarrow a^2 r^{18} = xz$$

$$\Rightarrow (ar^9)^2 = xz$$

$$\Rightarrow y^2 = xz$$

[सभी (i) से]

अतः x, y तथा z गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं।

इति सिद्धम्

प्रश्न 18. अनुक्रम $8, 88, 888, 8888, \dots$ के n पदों का योग ज्ञात कीजिए।

निम्न प्रकार के प्रश्नों में (जैसे-5, 55, 555, ... तथा 7, 77, 777 ...) हम उभयनिष्ठ गुणनश्चांड को बाहर लेते हैं तथा इसके बाद प्रत्येक पद को 9 से गुणा तथा भाग कर गुणोत्तर श्रेढ़ी बना लेते हैं।

हल मान लीजिए $S = 8 + 88 + 888 + 8888 + \dots + n$ पदों तक

$$\Rightarrow S = 8(1 + 11 + 111 + 1111 + \dots + n \text{ पदों तक})$$

$$= \frac{8}{9}(9 + 99 + 999 + 9999 + \dots + n \text{ पदों तक})$$

$$= \frac{8}{9}[(10 - 1) + (100 - 1) + (1000 - 1) + \dots + n \text{ पदों तक}]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{8}{9} [(10 + 100 + 1000 + \dots + n \text{ पदों तक}) \\
 &\quad - (1 + 1 + 1 + \dots + n \text{ पदों तक})] \\
 &= \frac{8}{9} \left[10 \frac{(10^n - 1)}{10 - 1} - n \right] \quad \left[\because S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, r > 1 \right] \\
 &= \frac{8}{9} \left[\frac{10(10^n - 1)}{9} - n \right] = \frac{8}{9} \times \frac{10}{9} \times (10^n - 1) - \frac{8}{9} \times n \\
 &= \frac{80}{81} (10^n - 1) - \frac{8n}{9}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 19. अनुक्रम $2, 4, 8, 16, 32$ तथा $128, 32, 8, 2, \frac{1}{2}$ के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए।

हल दिया हुआ अनुक्रम है, $2, 4, 8, 16, 32$

... (i)

तथा $128, 32, 8, 2, \frac{1}{2}$

... (ii)

सभी (i) तथा (ii) के संगत पदों को गुणा कर एक नया अनुक्रम बना लेते हैं।

$256, 128, 64, 32, 16$

मान लीजिए

$$S = 256 + 128 + 64 + 32 + 16$$

यहाँ, $a = 256, r = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{वर्णीय योग } S &= \frac{256 \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^5 \right]}{1 - \frac{1}{2}} = 256 \times 2 \left(1 - \frac{1}{2^5} \right) \quad \left[\because S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, r < 1 \right] \\
 &= 512 \times \left(1 - \frac{1}{32} \right) = 512 \left(\frac{32 - 1}{32} \right) \\
 &= 16 \times 31 = 496
 \end{aligned}$$

प्रश्न 20. दिखाइए कि अनुक्रम $a, ar, ar^2, \dots, ar^{n-1}$ तथा $A, AR, AR^2, \dots, AR^{n-1}$ के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेढ़ी होती है तथा सार्वानुपात ज्ञात कीजिए।

हल दिया हुआ अनुक्रम है, $a, ar, ar^2, \dots, ar^{n-1}$

... (i)

तथा $A, AR, AR^2, \dots, AR^{n-1}$

... (ii)

सभी (i) तथा (ii) के संगत पदों को गुणा करने पर,

$$aA, arAR, ar^2AR^2, \dots, ar^{n-1}AR^{n-1}$$

$$\therefore \text{सार्वानुपात} = \frac{arAR}{aA} = rR$$

प्रश्न 21. ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हों, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो।

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी है, $a, ar, ar^2, ar^3 \dots$

दिया है,

$$\text{तीसरा पद} = \text{पहला पद} + 9$$

$$T_3 = a + 9 \Rightarrow ar^2 = a + 9$$

$$ar^2 - a = 9$$

युन:

$$\text{दूसरा पद} = \text{चौथा पद} + 18$$

$$T_2 = T_4 + 18 \Rightarrow ar = ar^3 + 18$$

$$\Rightarrow ar - ar^3 = 18$$

... (i)

सभी (i) को सभी (ii) से भाग देने पर,

$$\frac{ar^2 - a}{ar - ar^3} = \frac{9}{18}$$

$$\frac{a(r^2 - 1)}{ar(1 - r^2)} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{-1(1 - r^2)}{r(1 - r^2)} = \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{r} = \frac{1}{2} \Rightarrow r = -2$$

सभी (ii) में $r = -2$ रखने पर,

$$a(-2) - a(-2)^3 = 18$$

$$-2a + 8a = 18$$

$$6a = 18 \Rightarrow a = 3$$

गुणोत्तर श्रेणी है, $3, 3(-2), 3(-2)^2, 3(-2)^3, \dots$

$$\Rightarrow 3, -6, 12, -24, \dots$$

प्रश्न 22. यदि किसी समांतर श्रेणी का p वाँ, q वाँ तथा r वाँ पद क्रमशः a, b तथा c हो, तो सिद्ध कीजिए कि $a^{q-p} b^{r-p} c^{p-q} = 1$

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वानुपात R है।

दिया है,

$$p\text{वाँ पद} = T_p = a \Rightarrow AR^{p-1} = a \quad \dots (i)$$

$$q\text{वाँ पद} = T_q = b \Rightarrow AR^{q-1} = b \quad \dots (ii)$$

$$r\text{वाँ पद} = T_r = c \Rightarrow AR^{r-1} = c \quad \dots (iii)$$

अब, हमें सिद्ध करना है कि $a^{q-p} b^{r-p} c^{p-q} = 1$

$$\text{लाइंग पद} = A^{q-p} B^{r-p} C^{p-q}$$

तभी (i), (ii) तथा (iii) से a, b तथा c का मान रखने पर,

$$\begin{aligned}
 \text{दायरी पद} &= (AR^{p-1})^{q-1} (AR^{q-1})^{r-1} (AR^{r-1})^{p-1} \\
 &= A^{q-1} R^{(p-1)(q-1)} A^{r-1} R^{(q-1)(r-1)} A^{p-1} R^{(r-1)(p-1)} \\
 &= A^{q-1} R^{q-1} + r - p + p - q R^{(p-1)(q-1)} + (q-1)(r-p) + (r-1)(p-q) \\
 &= A^0 R^{pq-pq+q+r+p+rp-rq-p+q} \\
 &= A^0 R^0 = 1 \times 1 = 1 = \text{दायरी पद}
 \end{aligned}$$

इति सिद्धम्

नोट यहाँ पर गुणोत्तर श्रेढ़ी के प्रथम पद तथा सार्वनुपात क्रमशः A तथा R लेते हैं, ज्योंकि a तथा r प्रश्न में दिया हुआ है।

प्रश्न 23. यदि किसी गुणोत्तर श्रेढ़ी का प्रथम तथा n वाँ पद क्रमशः a तथा b है एवं P, n पदों का गुणनफल हो, तो सिद्ध कीजिए कि $P^2 = (ab)^n$

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेढ़ी है, A, AR, AR^2, AR^3, \dots

दिया है, पहला पद $A = a$

... (i)

n वाँ पद $AR^{n-1} = b$

... (ii)

अब, $P = n$ पदों का गुणनफल

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow P &= A \times AR \times AR^2 \times AR^3 \times \dots \times n \text{ पदों तक} \\
 P &= A^{1+1+1+\dots+n} \text{ पदों तक } R^{1+2+3+\dots+(n-1)} \\
 P &= A^n R^{\frac{n(n-1)}{2}} \left[\because \text{प्रथम } n \text{ प्राकृत संख्याओं का योग} = \frac{n(n+1)}{2} \right]
 \end{aligned}$$

दोनों ओर वर्ग करने पर,

$$\begin{aligned}
 P^2 &= A^{2n} R^{n(n-1)} \\
 \Rightarrow P^2 &= A^n A^n R^{n(n-1)} = A^n (AR^{n-1})^n \\
 \Rightarrow P^2 &= a^n b^n \quad [\text{सभी (i) तथा (ii) से}] \\
 \Rightarrow P^2 &= (ab)^n \quad \text{इति सिद्धम्}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 24. दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेढ़ी के प्रथम n पदों का योगफल तथा $(n+1)$ वें पद से $(2n)$ वें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात $\frac{1}{r^n}$

यहाँ, हम गुणोत्तर श्रेढ़ी को $2n$ पदों तक लेते हैं।

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेढ़ी है

$$\frac{ar, ar^2, ar^3, ar^4, ar^5, \dots, ar^{n-1}}{n \text{ पदों तक}}, \quad \frac{ar^n, ar^{n+1}, \dots, ar^{2n-1}}{n \text{ पदों तक}}$$

अब,

$$\begin{aligned} \text{अभीष्ट अनुपात} &= \frac{\text{प्रथम } n \text{ पदों का योग}}{(n+1) \text{वें पद से } (2n) \text{वें पदों का योग}} \\ &= \frac{s(r^n - 1)}{ar^n(r^n - 1)} = \frac{1}{r^n} \end{aligned}$$

इति सिद्धम्

प्रश्न 25. यदि a, b, c तथा d गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं, तो दिखाइए कि

$$(a^2 + b^2 + c^2)(b^2 + c^2 + d^2) = (ab + bc + cd)^2$$

हल $\because a, b, c, d$ गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं।

$$\begin{aligned} \therefore \quad \frac{b}{a} &= \frac{c}{b} = \frac{d}{c} = r && (\text{मान लीजिए}) \\ \Rightarrow \quad b &= ar, c = br, d = cr \\ \Rightarrow \quad b &= ar, c = (ar)r, d = (br)r \\ \Rightarrow \quad b &= ar, c = ar^2, d = br^2 \\ \Rightarrow \quad b &= ar, c = ar^2, d = (ar)^2 = ar^3 && \dots(i) \end{aligned}$$

अब, हमें सिद्ध करना है कि

$$(a^2 + b^2 + c^2)(b^2 + c^2 + d^2) = (ab + bc + cd)^2$$

$$\begin{aligned} \text{दायीं पक्ष} &= (a^2 + b^2 + c^2)(b^2 + c^2 + d^2) \\ &= (a^2 + a^2r^2 + a^2r^4)(a^2r^2 + a^2r^4 + a^2r^6) \\ &= a^2(1 + r^2 + r^4)a^2r^2(1 + r^2 + r^4) \\ &= a^4r^2(1 + r^2 + r^4)^2 \\ &= [a^2r(1 + r^2 + r^4)]^2 \\ &= (a^2r + a^2r^3 + a^2r^5)^2 \\ &= (a \cdot ar + ar \cdot ar^2 + ar^2 \cdot ar^3)^2 \\ &= (ab + bc + cd)^2 && [\text{समी (i) से}] \\ &= \text{दायीं पक्ष} \end{aligned}$$

प्रश्न 26. ऐसी थी संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेढ़ी बन जाए।

दो दी हुई संख्याओं के बीच संख्याएँ रखने पर हम सूत्र T_n का प्रयोग कर सार्वानुपात निकालेंगे।

हल मान लीजिए दो संख्याएँ a तथा b हैं, तब $3, a, b, 81$ गुणोत्तर श्रेढ़ी में होंगी।

$$\text{दायीं पक्ष } T_n = AR^n - 1$$

$$\begin{aligned}
 & \therefore R^4 = 3R^4 - 1 \\
 \Rightarrow & R^3 = \frac{81}{3} \\
 \Rightarrow & R^3 = 27 \Rightarrow R^3 = 3^3 \Rightarrow R = 3 \\
 \text{दोनों ओर घात } 3 \text{ के आधार की तुलना करने पर,} \\
 \Rightarrow & a = AR = 3 \times 3 = 9, \quad b = AR^2 = 3 \times 3^2 = 27
 \end{aligned}$$

प्र० 27. n का मान ज्ञात कीजिए ताकि $\frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n}$, a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो।

हम जानते हैं कि दो संख्याएँ a तथा b के बीच समातर माध्य \sqrt{ab} होता है, हम इसे दी गई गुणोत्तर माध्य के बराबर रखकर n के लिए हल करेंगे। इस संबंध का प्रयोग कर इसे सरल करेंगे।

$$\begin{aligned}
 \text{हल} & \text{ दिया है,} \quad \frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} = \sqrt{ab} \\
 \Rightarrow & \frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} = \frac{a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{2}}}{1} \\
 \Rightarrow & a^{n+1} + b^{n+1} = (a^n + b^n) (a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{2}}) \\
 \Rightarrow & a^{n+1} + b^{n+1} = a^{n+\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{2}} b^{n+\frac{1}{2}} \\
 \Rightarrow & a^{n+1} + b^{n+1} - a^{n+\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{2}} - a^{\frac{1}{2}} b^{n+\frac{1}{2}} = 0 \\
 \Rightarrow & (a^{n+1} - a^{n+\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{2}}) + (b^{n+1} - a^{\frac{1}{2}} b^{n+\frac{1}{2}}) = 0 \\
 \Rightarrow & a^{n+\frac{1}{2}} [a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}] - b^{n+\frac{1}{2}} [a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}] = 0 \\
 \Rightarrow & (a^{n+\frac{1}{2}} - b^{n+\frac{1}{2}}) (a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}) = 0 \\
 \Rightarrow & a^{n+\frac{1}{2}} - b^{n+\frac{1}{2}} = 0 \quad \left(\because a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}} \neq 0 \right) \\
 \Rightarrow & a^{n+\frac{1}{2}} = b^{n+\frac{1}{2}} \\
 \Rightarrow & \left(\frac{a}{b}\right)^{n+\frac{1}{2}} = 1 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{n+\frac{1}{2}} = \left(\frac{a}{b}\right)^0 \\
 \text{दोनों ओर आधार } (a/b) \text{ के घात की तुलना करने पर,} \\
 \Rightarrow & n + \frac{1}{2} = 0 \\
 \Rightarrow & n = -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 28. दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएँ $(3 + 2\sqrt{2}) : (3 - 2\sqrt{2})$ के अनुपात में हैं।

दी हुई शर्त लेने के बाद हम योगांतर निष्पत्ति का प्रयोग करेंगे।

$$\text{अर्थात्} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

हल मान लीजिए संख्याएँ a तथा b हैं।

दिया है,

$$a+b = 6\sqrt{ab}$$

$$\Rightarrow \frac{a+b}{2\sqrt{ab}} = \frac{3}{1}$$

अब, योगांतर निष्पत्ति का प्रयोग करने पर,

$$\Rightarrow \frac{a+b+2\sqrt{ab}}{a+b-2\sqrt{ab}} = \frac{3+1}{3-1}$$

$$\Rightarrow \frac{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 + 2\sqrt{ab}}{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 - 2\sqrt{ab}} = \frac{4}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2} = \frac{2}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{2}}{1}$$

पुनः योगांतर निष्पत्ति का प्रयोग करने पर,

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b} - (\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{2\sqrt{a}}{2\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}$$

दोनों ओर वर्ग करने पर,

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{(\sqrt{2} + 1)^2}{(\sqrt{2} - 1)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{2 + 1 + 2\sqrt{2}}{2 + 1 - 2\sqrt{2}}$$

$$\left[\because (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \right]$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{3 - 2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow a:b = (3 + 2\sqrt{2}) : (3 - 2\sqrt{2})$$

प्रश्न 29. यदि A तथा G दो अनाशक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हों, तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएँ $A \pm \sqrt{(A+G)(A-G)}$

यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं, तब द्विघात समीकरण

$$x^2 - (\text{मूलों का योग})x + \text{मूलों का गुणनफल} = 0$$

हल मान लीजिए संख्याएँ α तथा β हैं।

$$\text{दिया है, मूलों का योग}, \frac{\alpha + \beta}{2} = A \text{ (समांतर माध्य)}$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = 2A$$

$$\text{तथा मूलों का गुणनफल} \quad \sqrt{\alpha\beta} = G \text{ (गुणोत्तर माध्य)} \Rightarrow \alpha\beta = G^2$$

अब, द्विघात समीकरण जिनके मूल α तथा β हैं,

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 2Ax + G^2 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{2A \pm \sqrt{4A^2 - 4 \times 1 \times G^2}}{2 \times 1} \quad \left(\because x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right)$$

$$= \frac{2A \pm 2\sqrt{A^2 - G^2}}{2}$$

$$= A \pm \sqrt{(A+G)(A-G)} \quad [\because a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)]$$

इति सिद्धम्

प्रश्न 30. यदि किसी कल्पर में बैकटीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे परवात दोगुनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैकटीरिया उपस्थित हों, तो बैकटीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा n में घंटों बाद क्या होगी?

यहाँ, हम गुणोत्तर माध्य के सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि बैकटीरिया प्रत्येक घंटे छहल-गुणज में बढ़ती है।

हल कल्पर में उपस्थित बैकटीरिया की संख्या एक गुणोत्तर श्रेणी का निर्माण करती है जिसका पहला पद $a = 30$ तथा सार्वानुपात $r = 2$

$$\text{दूसरे घंटे बाद उपस्थित बैकटीरिया} = ar^2 = 30 \times (2)^2 = 120 \quad (\because T_n = ar^{n-1})$$

$$\text{चौथे घंटे बाद उपस्थित बैकटीरिया} = ar^4 = 30 \times (2)^4 = 30 \times 16 = 480$$

$$n\text{वें घंटे बाद उपस्थित बैकटीरिया} = ar^n = 30 \times 2^n = (30) \cdot (2^n)$$

प्रश्न 31. ₹ 500 बनराति 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, जात कीजिए?

हल मान लीजिए A बनराति, P मूलधन, r ब्याज की दर तथा t समय काल वर्षों में दिया हुआ है। तब, बनराति A निम्न सूत्र से प्राप्त होता है। अर्थात्

$$\begin{aligned}
 A &= P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t = 500 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^{10} \\
 &= 500 \left(1 + \frac{1}{10}\right)^{10} = 500 (1 + 0.1)^{10} \\
 &= 500 \times (1.1)^{10}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 32. यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमसे: 8 तथा 5 हैं, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए।

यदि द्विघात समीकरण के दो मूल दिए हुए हों, तब द्विघात समीकरण होती है।

$$x^2 - (\text{मूलों का योग})x + \text{मूलों का गुणनफल} = 0$$

हल मान लीजिए द्विघात समीकरण के मूल α तथा β हैं, तब

$$(\text{समांतर माध्य}) \frac{\alpha + \beta}{2} = 8 \quad \text{तथा} \quad (\text{गुणोत्तर माध्य}) \sqrt{\alpha \beta} = 5$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = 16 \quad \text{तथा} \quad \alpha \beta = 25$$

यदि द्विघात समीकरण के मूल α तथा β दिए हुए हों, तब द्विघात समीकरण

$$x^2 - (\text{मूलों का योग})x + (\text{मूलों का गुणनफल}) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha \beta = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 16x + 25 = 0$$

प्रश्नावली 9.4

निर्देश (प्र. सं. 1 - 7) निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए।

(प्र. सं. 1 - 7) जब हम विन्सी श्रेणी के n पदों का योग निकालते हैं, तब सर्वप्रथम n वीं पद T_n निकालते हैं तथा योग $S = \sum_n T_n$ निकालने में निम्न सूत्र

$$\Sigma n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\Sigma n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{तथा} \quad \Sigma n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \text{ का प्रयोग करते हैं।}$$

प्रश्न 1. $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + \dots$

हल मान लीजिए दी हुई श्रेणी है।

$$S = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + \dots$$

सर्वप्रथम, हम दी हुई श्रेणी को दो भागों में विभक्त करते हैं जो हैं, 1, 2, 3, 4, 5... तथा 2, 3, 4, 5,... दी हुई श्रेणी का n वीं पद निकालने के लिए प्रत्येक भाग का n वीं पद अलग-अलग निकालते हैं।

$$T_n = (1, 2, 3, \dots \text{ का } n\text{वीं पद}) \times (2, 3, 4, \dots \text{ का } n\text{वीं पद})$$

$$\begin{aligned} &= [1 + (n - 1)1] \times [2 + (n - 1)1] \\ &= (1 + n - 1)(2 + n - 1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T_n = n(n + 1)$$

$$\text{अब, } S = \sum T_n = \sum (n^2 + n) = \sum n^2 + \sum n$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\left[\because \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \sum n = \frac{n(n+1)}{2} \right]$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \left(\frac{2n+1}{3} + \frac{1}{1} \right)$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{(2n+1+3)}{3} \right]$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \left(\frac{2n+4}{3} \right) - \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$\text{प्रश्न 2. } 1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + 3 \times 4 \times 5 + \dots$$

हल मान लीजिए दी हुई श्रेणी है,

$$S = 1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + 3 \times 4 \times 5 + \dots$$

सर्वप्रथम हम दी हुई श्रेणी को तीन भागों में विभक्त करते हैं जो हैं 1, 2, 3, ... तथा 2, 3, 4, ... तथा 3, 4, 5, ... दी हुई श्रेणी का n वीं पद निकालने के लिए प्रत्येक भाग का n वीं पद अलग-अलग निकालते हैं।

$$\text{अर्थात् } T_n = (1, 2, 3, \dots \text{ का } n\text{वीं पद}) \times (2, 3, 4, \dots \text{ का } n\text{वीं पद}) \times (3, 4, 5, \dots \text{ का } n\text{वीं पद})$$

$$= [1 + (n - 1)1][2 + (n - 1)1][3 + (n - 1)1] \quad [\because T_n = a + (n-1)d]$$

$$= (1 + n - 1)(2 + n - 1)(3 + n - 1)$$

$$\Rightarrow T_n = n(n + 1)(n + 2) = n[n^2 + 2n + n + 2] = n(n^2 + 3n + 2)$$

$$\Rightarrow T_n = n^3 + 3n^2 + 2n$$

$$\text{अब, } S = \sum T_n = \sum (n^3 + 3n^2 + 2n)$$

$$= \sum n^3 + 3\sum n^2 + 2\sum n$$

$$= \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 + \frac{3n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{2n(n+1)}{2}$$

$$\left[\because \sum n = \frac{n(n+1)}{2}, \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{n(n+1)}{2} + (2n+1)+2 \right]$$

$$\left[\sum n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \right]$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{n(n+1)}{2} + \frac{2n+1}{1} + \frac{2}{1} \right]$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{n^2 + n + 4n + 2 + 4}{2} \right]$$

$$= \frac{n(n+1)(n^2 + 5n + 6)}{4} = \frac{n(n+1)(n^2 + 2n + 3n + 6)}{4}$$

$$= \frac{n(n+1)[n(n+2) + 3(n+2)]}{4} = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

प्रश्न 3. $3 \times 1^2 + 5 \times 2^2 + 7 \times 3^2 + \dots$

हल मान लीजिए दी हुई श्रेणी है

$$S = 3 \times 1^2 + 5 \times 2^2 + 7 \times 3^2 + \dots$$

तरीकथम हम दी हुई श्रेणी को दो भागों में विभक्त करते हैं जो $3, 5, 7, \dots$ तथा $1^2, 2^2, 3^2, \dots$ हैं। दी हुई श्रेणी का n वाँ पद निकालने के लिए प्रत्येक भाग का n वाँ पद अलग-अलग निकालते हैं।

$$\begin{aligned}T_n &= (3, 5, 7, \dots \text{ का } n\text{वाँ पद}) \times (1, 2, 3, \dots \text{ का } n\text{वाँ पद})^2 \\&= [3 + (n-1)2][1 + (n-1)1]^2 \\&= (3 + 2n - 2)(n)^2 = (2n+1)n^2 = 2n^3 + n^2\end{aligned}$$

अब,

$$S = \sum T_n = 2 \sum n^3 + \sum n^2$$

$$\begin{aligned}&= 2 \left[\frac{n(n+1)^2}{2} \right] + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\&= \frac{n(n+1)}{2} \left[2 \times \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2n+1}{3} \right] \\&= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{3n(n+1) + 2n+1}{3} \right] \\&= \frac{n(n+1)}{6} \times (3n^2 + 3n + 2n + 1) \\&= \frac{n(n+1)(3n^2 + 5n + 1)}{6}\end{aligned}\quad \left[\because \sum n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \right]$$

$$\left[\sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]$$

प्रश्न 4. $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots$

हल मान लीजिए दी हुई श्रेणी है

$$S = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots$$

यहाँ, हम दी हुई श्रेणी के हर को दो भागों में बीटेंगे अर्थात्

$$\begin{aligned}T_n &= \frac{1}{(1, 2, 3, \dots \text{ का } n\text{वाँ पद}) \times (2, 3, 4, \dots \text{ का } n\text{वाँ पद})} \\&= \frac{1}{[1 + (n-1)1][2 + (n-1)1]} \\&= \frac{1}{n(n+1)}\end{aligned}$$

[$\because T_m = a + (m-1)d$]

$$= \frac{(n+1)-n}{n(n+1)}$$

$$= \frac{n+1}{n(n+1)} - \frac{n}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

(इस चरण पर ध्यान दें)

अब, $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ रखने पर,

$$T_1 = \frac{1}{1} - \frac{1}{2}$$

$$T_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$T_3 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$$

.....

$$T_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

अब, इन पदों को जोड़ने पर,

$$\begin{aligned} S &= T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_n \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &\quad - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} - \frac{n+1-1}{n+1} \\ \Rightarrow S &= \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

नोट यह दी हुई स्थिरी मिला में हो, तब हम सूत्र $\Sigma n, \Sigma n^2, \Sigma n^3$ का प्रयोग नहीं कर सकते।

प्रश्न 5. $5^2 + 6^2 + 7^2 + \dots + 20^2$

हल मान लीजिए दी हुई स्थिरी है,

$$S = 5^2 + 6^2 + 7^2 + \dots + 20^2$$

$$= (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + \dots + 20^2) - (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2)$$

$$= \frac{20 \times (20+1) \times (2 \times 20+1)}{6} - \frac{4(4+1)(2 \times 4+1)}{6}$$

$$\left[\because \Sigma n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]$$

$$= \frac{20 \times 21 \times 41}{6} - \frac{4 \times 5 \times 9}{6} = \frac{17220}{6} - \frac{180}{6}$$

$$= \frac{17220 - 180}{6} = \frac{17040}{6} = 2840$$

प्रश्न 6. $3 \times 8 + 6 \times 11 + 9 \times 14 + \dots$

हल मान लीजिए वी हुई थेणी है,

$$S = 3 \times 8 + 6 \times 11 + 9 \times 14 + \dots$$

$$T_n = [3, 6, 9 \dots \text{का } n\text{वीं पद}] \times [8, 11, 14 \dots \text{का } n\text{वीं पद}]$$

$$T_n = [3 + (n-1)3] [8 + (n-1)3]$$

$$= (3 + 3n - 3)(8 + 3n - 3)$$

$$= 3n(3n + 5) = 9n^2 + 15n$$

$$[\because T_m = a + (m-1)d]$$

$$\text{अब, } S = \sum T_n$$

$$= \sum (9n^2 + 15n) = 9 \sum n^2 + 15 \sum n$$

$$= \frac{9n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{15n(n+1)}{2}$$

$$\left[\because \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]$$

$$\sum n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{9(2n+1)}{3} + 15 \right] = \frac{n(n+1)}{2} [3(2n+1) + 15]$$

$$= \frac{n(n+1)3(2n+1+5)}{2} = \frac{3n(n+1)(2n+6)}{2} = 3n(n+1)(n+3)$$

प्रश्न 7. $1^2 + (1^2 + 2^2) + (1^2 + 2^2 + 3^2) + \dots$

हल मान लीजिए वी हुई थेणी है,

$$S = 1^2 + (1^2 + 2^2) + (1^2 + 2^2 + 3^2) + \dots$$

यहाँ, प्रथम पद में 1 पद है, दूसरे पद में 2 पद हैं, तीसरे पद में 3 पद हैं इत्यादि। इसलिए वी हुई थेणी का n वीं पद होगा

अर्थात्

$$T_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$$

$$T_n = \sum n^2$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\Rightarrow T_n = \frac{n(2n^2 + n + 2n + 1)}{6}$$

$$\Rightarrow T_n = \frac{n(2n^2 + 3n + 1)}{6}$$

$$\Rightarrow T_n = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}$$

$$\text{अब, } S = \sum T_n = \frac{1}{6} (2n^3 + 3n^2 + n)$$

$$= \frac{1}{6} [2\sum n^3 + 3\sum n^2 + \sum n]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{6} \left[2 \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 + 3 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right] \\
 &\quad \left(\because \sum n = \frac{n(n+1)}{2}, \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \sum n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \right) \\
 &= \frac{1}{6} \times \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{2n(n+1)}{2} + \frac{2n+1}{1} + \frac{1}{1} \right] \\
 &= \frac{n(n+1)}{12} \times (n^2 + n + 2n + 1 + 1) \\
 &= \frac{n(n+1)}{12} (n^2 + 3n + 2) \\
 &= \frac{n(n+1)(n^2 + 2n + n + 2)}{12} \\
 &= \frac{n(n+1)(n+2)(n+1)}{12} - \frac{n(n+1)^2(n+2)}{12}
 \end{aligned}$$

नोट यह दी हुई श्रेणी के पद समूह में हैं, तब गर्व पद निकालने के लिए श्रेणी के योग के सूत्र का प्रयोग करेंगे।

निर्देश (प्र. सं. 8 - 10) निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका n वाँ पद दिया है।

यहाँ, हम सूत्र $\sum n = \frac{n(n+1)}{2}$, $\sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ तथा $\sum n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$ का प्रयोग करेंगे।

प्रश्न 8. $n(n+1)(n+4)$

हल मान लीजिए $T_n = n(n+1)(n+4)$

$$\begin{aligned}
 &= n(n^2 + 4n + n + 4) \\
 &= n(n^2 + 5n + 4) \\
 &= n^3 + 5n^2 + 4n
 \end{aligned}$$

अब,

$$\begin{aligned}
 S &= \sum T_n = \sum (n^3 + 5n^2 + 4n) \\
 &= \sum n^3 + 5 \sum n^2 + 4 \sum n \\
 &= \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 + \frac{5n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{4n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{n(n+1)}{2} + \frac{5(2n+1)}{3} + \frac{4}{1} \right] \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{3n(n+1) + 10(2n+1) + 24}{6} \right]
 \end{aligned}$$

$$= \frac{n(n+1)(3n^2 + 3n + 20n + 10 + 24)}{12}$$

$$= \frac{n(n+1)(3n^2 + 23n + 34)}{12}$$

प्रश्न 9. $n^2 + 2^n$

हल मान लीजिए $T_n = n^2 + 2^n$

$$\Rightarrow S = \sum T_n = \sum (n^2 + 2^n) 0 = \sum n^2 + \sum 2^n$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^n)$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{2(2^n - 1)}{2-1} \left[\because S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r-1}, r > 1 \right]$$

$$S = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2(2^n - 1)$$

नोट यह क्षेत्री में किसी पद की घात n हो, तब हम Σn का प्रयोग नहीं करेंगे अर्थात् $\Sigma 2^n \neq 2^{2n}$

प्रश्न 10. $(2n-1)^2$

हल मान लीजिए

$$\Rightarrow T_n = (2n-1)^2$$

$$T_n = 4n^2 + 1 - 4n \quad [\because (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab]$$

$$\text{अब, } S = \sum T_n = \sum (4n^2 + 1 - 4n)$$

$$= 4\sum n^2 + \sum 1 - 4\sum n$$

$$= \frac{4n(n+1)(2n+1)}{6} + n - \frac{4n(n+1)}{2} \quad (\because \sum 1 = n)$$

$$= n \left[\frac{2(n+1)(2n+1)}{3} + \frac{1}{1} - \frac{2(n+1)}{1} \right]$$

$$= n \left[\frac{2(2n^2 + n + 2n + 1) + 3 - 6(n+1)}{3} \right]$$

$$= \frac{n(4n^2 + 6n + 2 + 3 - 6n - 6)}{3}$$

$$= \frac{n(4n^2 - 1)}{3} = \frac{n}{3}(2n+1)(2n-1)$$

$$[\because (a^2 - b^2) = (a-b)(a+b)]$$

विविध प्रश्नावली

प्रश्न 1. दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेढ़ी के $(m+n)$ वें तथा $(m-n)$ वें पदों का योग m वें पद का दोगुना है।

प्रश्नावली, हमें शिष्ट करना है,

$$T_{m+n} + T_{m-n} = 2T_m$$

हल अब, दोषी पद = $T_{m+n} + T_{m-n}$

$$\begin{aligned} &= a + (m+n-1)d + a + (m-n-1)d \quad [:: T_n = a + (n-1)d] \\ &= 2a + d(m+n-1+m-n-1) = 2a + d(2m-2) \\ &= 2[a + d(m-1)] = 2T_m = \text{दोषी पद} \end{aligned}$$

इसि शिष्टण्य

प्रश्न 2. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी की तीन संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है, तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

हल यानी लीजिए तीन संख्याएँ $a-d, a, a+d$ हैं।

दिया हुआ है, संख्याओं का योग = 24

$$\therefore a - d + a + a + d = 24$$

$$\Rightarrow 3a = 24 \Rightarrow a = 8$$

तथा संख्याओं का गुणनफल = 440

$$\therefore (a-d)a(a+d) = 440$$

$$\Rightarrow a(a^2 - d^2) = 440$$

$$\Rightarrow 8(64 - d^2) = 440$$

$$\Rightarrow 64 - d^2 = 55$$

$$\Rightarrow d^2 = 64 - 55$$

$$\Rightarrow d^2 = 9 \Rightarrow d = \pm 3$$

जब $a = 8$ तथा $d = 3$, तब संख्याएँ हैं,

$$a - d = 8 - 3 = 5$$

$$a = 8$$

$$a + d = 8 + 3 = 11 \Rightarrow 5, 8, 11$$

जब $a = 8$ तथा $d = -3$, तब संख्याएँ हैं,

$$a - d = 8 + 3 = 11$$

$$a = 8$$

$$a + d = 8 - 3 = 5$$

$$11, 8, 5$$

अतः संख्याएँ हैं, 5, 8, 11 या 11, 8, 5

प्रश्न 3. मान लीजिए कि किसी समातर श्रेढ़ी के n , $2n$ तथा $3n$ पदों का योगफल क्रमशः S_1 , S_2 तथा S_3 है, तो दिखाइए कि $S_3 = 3(S_2 - S_1)$

हल मान लीजिए समातर श्रेढ़ी का पहला पद a तथा सार्वान्तर d है।

$$\text{दिया है, } S_1 = n \text{ पदों का योग} = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \quad \dots(i)$$

$$S_2 = 2n \text{ पदों का योग} = \frac{2n}{2} [2a + (2n-1)d] \quad \dots(ii)$$

$$\text{तथा } S_3 = 3n \text{ पदों का योग} = \frac{3n}{2} [2a + (3n-1)d] \quad \dots(iii)$$

$$\text{अब, हमें सिद्ध करना है } S_3 = 3(S_2 - S_1)$$

$$\text{अब, दायीं पक्ष} = 3(S_2 - S_1)$$

$$= 3 \left[\frac{2n}{2} [2a + (2n-1)d] - \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \right] \quad [\text{सभी (i) तथा (ii) से}]$$

$$= \frac{3n}{2} [2 \{2a + (2n-1)d\} - \{2a + (n-1)d\}]$$

$$= \frac{3n}{2} [4a + 2(2n-1)d - 2a - (n-1)d]$$

$$= \frac{3n}{2} [(4a - 2a) + d(4n - 2 - n + 1)]$$

$$= \frac{3n}{2} [2a + (3n-1)d]$$

$$= S_3 = \text{दायीं पक्ष} \quad [\text{सभी (iii) से}]$$

$$\therefore \text{दायीं पक्ष} = \text{दायीं पक्ष} \quad \text{इति सिद्धम्}$$

प्रश्न 4. 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हों।

हल 200 तथा 400 के मध्य आने वाली संख्याएँ जो 7 से विभाज्य हैं निम्न हैं

$$203, 210, 217, \dots, 399$$

स्पष्ट है, ये संख्याएँ समातर श्रेढ़ी में हैं।

$$\text{जहाँ, } a = 203, d = 7 \text{ तथा } T_n = 399$$

$$\text{अब, } T_n = a + (n-1)d$$

$$399 = 203 + (n-1)7$$

$$(n-1)7 = 399 - 203$$

$$(n-1)7 = 196$$

$$n-1 = \frac{196}{7}$$

$$n-1 = 28$$

$$n = 28 + 1$$

$$n = 29$$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

$$\therefore S_n = \frac{29}{2} [2 \times 203 + (29 - 1)7]$$

$$= \frac{29}{2} [406 + 28 \times 7]$$

$$= \frac{29}{2} [406 + 196]$$

$$= \frac{29}{2} \times 602 = 29 \times 301 = 8729$$

नोट: विद्यार्थियों को ध्यान बैना चाहिए कि संख्याएँ 200 तथा 400 सम्मिलित नहीं हैं।

प्रश्न 5. 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हों।

यहाँ, हम 2 तथा 5 से विभाजित संख्याओं का योग अलग-अलग निकालते हो तथा इनके योगों को जोड़ने के पश्चात् 2 साथ ही साथ 5 से विभाजित अर्थात् (अर्थात् 2 तथा 5 का लघुतम समापवर्त्य) संख्याओं के योग को पहले वाले योग में से घटायेंगे।

इन 1 से 100 तक की संख्याएँ जो 2 से विभाज्य हैं 2, 4, 6, 8, ... 100 हैं।

संख्याएँ 2, 4, 6, 8, ... 100 समातर श्रेढ़ी में हैं, जहाँ $a = 2, d = 4 - 2 = 2$

$$\therefore T_n = a + (n - 1)d \Rightarrow 100 = 2 + (n - 1)2$$

$$\Rightarrow 100 - 2 = (n - 1)2 \Rightarrow 98 = (n - 1)2$$

$$\Rightarrow 49 = n - 1 \Rightarrow n = 50$$

इसलिए 50 संख्याओं का योग,

$$S_{50} = \frac{50}{2} [2 \times 2 + (50 - 1)2] \quad \left[\because S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d] \right]$$

$$= 25 [4 + 49 \times 2]$$

$$= 25 [4 + 98] = 25 \times 102$$

$$\Rightarrow S_{50} = 2550 \quad \dots(1)$$

अब, 1 से 100 तक की संख्याएँ, जो 5 से विभाज्य हैं, हैं,

$$5, 10, 15, 20, \dots, 100$$

ये सभी संख्याएँ समातर श्रेढ़ी में हैं, जहाँ $a = 5, d = 10 - 5 = 5$

$$\therefore T_n = a + (n - 1)d$$

$$100 = 5 + (n - 1)5$$

$$\Rightarrow 100 - 5 = (n - 1)5$$

$$\Rightarrow (n - 1) = \frac{95}{5}$$

$$\Rightarrow n - 1 = 19$$

$$\begin{aligned}
 & \Rightarrow n = 19 + 1 = 20 \\
 \text{अब, } & S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d] \\
 & \Rightarrow S_{20} = \frac{20}{2} [2 \times 5 + (20 - 1)5] \\
 & = 10(10 + 19 \times 5) \\
 & = 10(10 + 95) = 10(105) \\
 & S_{20} = 1050 \quad \dots \text{(ii)}
 \end{aligned}$$

अब, 1 से 100 तक की संख्याएँ, जो 10 से (अर्थात् 2 तथा 5 का लघुतम समापवर्तक) विभाज्य हों, हैं, 10, 20, 30, ..., 100
गे सभी संख्याएँ समांतर श्रेढ़ी में हैं, जहाँ $a = 10, d = 20 - 10 = 10$ तथा $n = 10$

$$\begin{aligned}
 & \therefore S_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d] \\
 & \therefore S_{10} = \frac{10}{2} [2 \times 10 + (10 - 1)10] \\
 & = 5(20 + 9 \times 10) = 5(20 + 90) \\
 & = 5 \times 110 = 550 \quad \dots \text{(iii)}
 \end{aligned}$$

अतः 1 से 100 तक आने वाले सभी पूर्णांकों का योग जो 2 या 5 से विभाज्य हो
 $= (2550 + 1050) - 550 \quad (\text{सभी (i), (ii) तथा (iii) से})$
 $= 3600 - 550 = 3050$

प्रश्न 6. दो अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो।

हल् दो अंकों की संख्याएँ जिन्हें 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो, तब प्रत्येक संख्या 4 के गुणज से 1 अधिक होती

$$13, 17, 21, \dots, 97$$

$$\begin{aligned}
 & \text{स्पष्ट है, ये सभी संख्याएँ समांतर श्रेढ़ी में हैं, जहाँ} \\
 & a = 13, d = 4, T_n = 97 \\
 & T_n = a + (n - 1)d \\
 & 97 = 13 + (n - 1)4 \\
 & 97 - 13 = (n - 1)4 \\
 & 84 = (n - 1)4 \\
 & 21 = n - 1 \\
 & n = 21 + 1 = 22 \\
 \text{अब, } & S_{22} = \frac{22}{2} [2 \times 13 + (22 - 1)4] \\
 & = 11[26 + 21 \times 4] = 11(26 + 84) \\
 & = 11 \times 110 = 1210
 \end{aligned}$$

प्रश्न 7. सभी $x, y \in N$ के लिए $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$ को संतुष्ट करता हूआ / एक ऐसा फलन है कि $f(1) = 3$ तथा $\sum_{x=1}^n f(x) = 120$, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

दिया हुआ फलन संबंध से सर्वप्रथम हम $f(1), f(2), f(3), f(4), \dots$ इत्यादि का मान निकालेंगे तथा इन मालों को इनके बीच अर्थात् 120 में रख देंगे।

हल दिया है, $f(x+y) = f(x)f(y)$... (i)

सभी (i) में $x = y = 1$ रखने पर,

$$\begin{aligned} & f(1+1) = f(1)f(1) \\ \Rightarrow & f(2) = 3 \times 3 \\ \Rightarrow & f(2) = 9 \end{aligned} \quad [\because f(1) = 3]$$

सभी (i) में $x = 2, y = 1$ रखने पर,

$$\begin{aligned} & f(2+1) = f(2)f(1) \\ \Rightarrow & f(3) = 9 \times 3 \\ \Rightarrow & f(3) = 27 \end{aligned} \quad [\because f(2) = 9, f(1) = 3]$$

सभी (i) में $x = 3, y = 1$ रखने पर,

$$\begin{aligned} & f(3+1) = f(3)f(1) \\ \Rightarrow & f(4) = 27 \times 3 \\ \Rightarrow & f(4) = 81 \end{aligned} \quad [\because f(3) = 27]$$

अब, $\sum_{x=1}^n f(x) = 120$

$$\begin{aligned} & f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n) = 120 \\ \Rightarrow & 3 + 9 + 27 + \dots + n \text{ पदों तक} = 120 \end{aligned}$$

यहाँ, $a = 3, r = \frac{9}{3} = 3$

$$\therefore \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{3(3^n - 1)}{3 - 1} = 120 \quad (\because r > 1)$$

$$3(3^n - 1) = 120 \times 2$$

$$3(3^n - 1) = 240$$

$$3^n - 1 = \frac{240}{3}$$

$$3^n - 1 = 80$$

$$3^n = 80 + 1$$

दोनों ओर 3 की घात की तुलना करने पर,

$$3^n = 81$$

$$3^n = 3^4 \Rightarrow n = 4$$

प्रश्न 8. गुणोत्तर श्रेढ़ी के कुछ पदों का योग 315 है, उसका प्रथम पद तथा सार्वानुपात क्रमशः 5 तथा 2 है। अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेढ़ी के n पद हैं। $a, ar, ar^2, ar^3, \dots, ar^{n-1}$

दिया है, $a = 5, r = 2$ तथा $S_n = 315$

$$\therefore 315 = \frac{5(2^n - 1)}{2 - 1} \Rightarrow \frac{315}{5} = 2^n - 1 \quad \left[\because S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, r > 1 \right]$$

$$\Rightarrow 2^n - 1 = 63 \quad \Rightarrow \quad 2^n = 63 + 1 \Rightarrow 2^n = 64$$

योनों और 2 की घात की तुलना करने पर,

$$\Rightarrow 2^n = 2^6 \quad \Rightarrow \quad n = 6$$

पुनः अंतिम पद के लिए,

$$T_n = ar^{n-1} = 5 \times (2)^{6-1} = 5 \times 2^5 = 5 \times 32 = 160$$

प्रश्न 9. किसी गुणोत्तर श्रेढ़ी का प्रथम पद 1 है। तीसरे एवं पाँचवें पदों का योग 90 हो, तो गुणोत्तर श्रेढ़ी का सार्वानुपात ज्ञात कीजिए।

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेढ़ी है,

$$a, ar, ar^2, ar^3, \dots$$

दिया है,

$$a = 1 \text{ तथा } T_3 + T_5 = 90$$

$$\therefore ar^2 + ar^4 = 90 \quad (\because T_n = ar^{n-1})$$

$$\Rightarrow r^2 + r^4 = 90$$

$$\Rightarrow r^4 + r^2 - 90 = 0$$

अब, मध्य पद को विभक्त कर गुणनखंड करने पर,

$$\Rightarrow r^4 + 10r^2 - 9r^2 - 90 = 0$$

$$\Rightarrow r^2(r^2 + 10) - 9(r^2 + 10) = 0$$

$$\Rightarrow (r^2 + 10)(r^2 - 9) = 0$$

$$\therefore r^2 + 10 \neq 0 \Rightarrow r^2 - 9 = 0$$

$$\Rightarrow r^2 = 9 \Rightarrow r = \pm 3$$

प्रश्न 10. किसी गुणोत्तर श्रेढ़ी के तीन पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से हन संख्याओं में से 1, 7, 21 घटाएँ, तो हमें एक समात्तर श्रेढ़ी प्राप्त होती है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेढ़ी में तीन संख्याएँ, a, ar, ar^2 हैं।

दिया है, $a + ar + ar^2 = 56 \quad \dots (i)$

पुनः $a = 1, ar = 7, ar^2 = 21$ गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं।

$$\Rightarrow 2(ar - 7) = (a - 1) + (ar^2 - 21) \quad (\because \text{यदि } a, b, c \text{ समात्तर श्रेढ़ी में हों, तब } 2b = a + c)$$

$$\Rightarrow 2ar - 14 = a + ar^2 - 22$$

$$\Rightarrow a + ar^2 - 2ar = -14 + 22$$

$$\Rightarrow a + ar^2 - 2ar = 8$$

समीक्षा (i) को समीक्षा (ii) से भाग देने पर,

$$\frac{a + ar + ar^2}{a + ar^2 - 2ar} = \frac{56}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + r + r^2}{1 + r^2 - 2r} = \frac{7}{1}$$

$$\Rightarrow 1 + r + r^2 = 7 + 7r^2 - 14r$$

$$\Rightarrow 6r^2 - 15r + 6 = 0$$

3 से भाग देने पर,

$$\Rightarrow 2r^2 - 5r + 2 = 0$$

आव मध्य पद विभक्त कर गुणनखंड करने पर,

$$\Rightarrow 2r^2 - (4 + 1)r + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2r^2 - 4r - r + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2r(r - 2) - (r - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (r - 2)(2r - 1) = 0$$

$$\Rightarrow r = 2, \frac{1}{2}$$

यदि $r = 2$, तब समीक्षा (i) से,

$$a + 2a + 4a = 56$$

$$\Rightarrow 7a = 56$$

$$\Rightarrow a = 8$$

तब संख्याएँ हैं,

$$a = 8$$

$$ar = 8 \times 2 = 16$$

$$ar^2 = 8 \times 4 = 32$$

$$8, 16, 32$$

यदि $r = \frac{1}{2}$, तब समीक्षा (i) से, $\frac{a}{1} + \frac{a}{2} + \frac{a}{4} = 56$

$$\frac{4a + 2a + 1}{4} = 56$$

$$\frac{7a}{4} = 56$$

$$\Rightarrow a = 32$$

तब संख्याएँ हैं,

$$a = 32$$

$$ar = 32 \times \frac{1}{2} = 16$$

$$ar^2 = 32 \times \frac{1}{4} = 8$$

या

$$\Rightarrow 32, 16, 8$$

अतः अभीष्ट संख्याएँ हैं, 8, 16, 32 या 32, 16, 8

प्रश्न 11. किसी गुणोत्तर श्रेढ़ी के पदों की संख्या सम है। यदि उसके सभी पदों का योगफल, विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है, तो सार्वानुपात ज्ञात कीजिए।

हल मान लीजिए गुणोत्तर श्रेढ़ी है, $a, ar, ar^2, ar^3, ar^4, \dots, ar^{2n-2}, ar^{2n-1}$

जहाँ $a, ar^2, ar^4, ar^6, \dots$ विषम स्थान पर रखे हैं तथा $ar, ar^3, ar^5, ar^7, \dots$ सम स्थान पर रखे हैं।

दिया है, सभी पदों का योग = $5 \times$ विषम स्थान पर रखे पदों का योगफल

अर्थात्

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{2n-1}$$

$$= 5 \times (a + ar^2 + ar^4 + \dots + ar^{2n-2})$$

$$\Rightarrow \frac{ar^{2n} - 1}{r - 1} = \frac{5a[(r^2)^n - 1]}{r^2 - 1} \quad \left[\because S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, r > 1 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{r^{2n} - 1}{r - 1} = \frac{5(r^2)^n - 1}{(r - 1)(r + 1)}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{5}{r + 1} \Rightarrow r + 1 = 5 \Rightarrow r = 4$$

नोट विद्यार्थी को प्याज देना चाहिए कि यदि गुणोत्तर श्रेढ़ी में पदों की संख्या $2n$ है अर्थात् सम है, तब इनमें n विषम पद तथा n सम पद होंगे।

प्रश्न 12. एक समात्तर श्रेढ़ी के प्रथम चार पदों का योगफल 56 है। अंतिम चार पदों का योगफल 112 है। यदि इसका प्रथम पद 11 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल मान लीजिए वी तुझे समात्तर श्रेढ़ी है, $a, a + d, a + 2d, \dots$

दिया है, प्रथम चार पदों का योगफल = 56

अर्थात् $T_1 + T_2 + T_3 + T_4 = 56$

$$\Rightarrow a + a + d + a + 2d + a + 3d = 56$$

$$\Rightarrow 4a + 6d = 56$$

$$\Rightarrow 4 \times 11 + 6d = 56$$

$$\Rightarrow 6d = 56 - 44 = 12$$

$$\Rightarrow d = \frac{12}{6} \Rightarrow d = 2$$

($\because a = 11$)

यदि अंतिम पद T_n है, तब अंतिम चार पदों का योगफल = 112

$$T_n + T_{n-1} + T_{n-2} + T_{n-3} = 112$$

$$(\because T_n = a + (n - 1)d)$$

$$\begin{aligned}
 & \therefore a + (n-1)d + a + (n-1-1)d + a + (n-2-1)d + a + (n-3-1)d = 112 \\
 \Rightarrow & 4a + d(n-1+n-2+n-3+n-4) = 112 \\
 \Rightarrow & 4 \times 11 + 2(4n-10) = 112 \\
 \Rightarrow & 44 + 8n - 20 = 112 \\
 \Rightarrow & 8n = 112 - 44 + 20 \\
 \Rightarrow & 8n = 132 - 44 \\
 \Rightarrow & 8n = 88 \\
 \Rightarrow & n = \frac{88}{8} = 11
 \end{aligned}$$

अतः श्रेणी में कुल पदों की संख्या = 11

प्रश्न 13. यदि $\frac{a+bx}{a-bx} = \frac{b+cx}{b-cx} = \frac{c+dx}{c-dx}$ ($x \neq 0$) हो, तो दिखाइए कि a, b, c तथा d गुणोत्तर श्रेणी में हैं।

यहाँ, हम योगांतर निपत्ति का प्रयोग करेंगे

$$\text{अर्थात् } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

$$\text{हल दिया है, } \frac{a+bx}{a-bx} = \frac{b+cx}{b-cx} = \frac{c+dx}{c-dx}$$

योगांतर निपत्ति का प्रयोग करने पर,

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow & \frac{a+bx+a-bx}{a+bx-(a-bx)} = \frac{b+cx+b-cx}{b+cx-(b-cx)} = \frac{c+dx+c-dx}{c+dx-(c-dx)} \\
 \Rightarrow & \frac{2a}{2bx} = \frac{2b}{2cx} = \frac{2c}{2dx} \\
 \Rightarrow & \frac{a}{bx} = \frac{b}{cx} = \frac{c}{dx}
 \end{aligned}$$

प्रत्येक पद को x से गुणा करने पर,

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$$

इसलिए, a, b, c, d गुणोत्तर श्रेणी में हैं।

प्रश्न 14. किसी गुणोत्तर श्रेणी में S, n पदों का योग, P उनका गुणनफल तथा R उनके व्युत्कर्मों का योग हो, तो सिद्ध कीजिए कि $P^2 R^n = S^n$

हल. मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी है, $a, ar, ar^2, ar^3, \dots, ar^{n-1}$

दिया है, $S = n$ पदों का योग = $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^{n-1}$

$$= \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (\text{यदि } r > 1)$$

...()

तथा $n = n$ पदों के व्युत्क्रमों का योग

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{a} + \frac{1}{ar} + \frac{1}{ar^2} + \dots + \frac{1}{ar^{n-1}} \quad \left(\frac{1}{r} < 1 \right) \\
 &= \frac{\frac{1}{a} \left[1 - \left(\frac{1}{r} \right)^n \right]}{1 - \frac{1}{r}} = \frac{1}{a} \left[\frac{1}{1} - \frac{1}{r^n} \right] \times \frac{1}{r-1} \\
 &= \frac{1}{a} \left[\frac{r^n - 1}{r^n} \right] \times \frac{r}{r-1} \\
 \Rightarrow P &= \frac{(r^n - 1)r}{a r^n (r - 1)} \quad \dots (ii)
 \end{aligned}$$

तथा

$$P = n \text{ पदों का गुणनफल} = a \times ar \times ar^2 \times ar^3 \times \dots \times ar^{n-1}$$

$$= a^1 + 1 + 1 + \dots + n \text{ एवं तर } r^1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) \text{ एवं तर}$$

$$\begin{aligned}
 &= a^n r^{\frac{n(n-1)}{2}} \quad \left[\because \sum n = \frac{n(n+1)}{2} \right]
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P^2 = a^2 r^{n(n-1)} \quad \dots (iii)$$

अब, हमें सिद्ध करना है, $P^2 R^n = S^n$

$$\text{या} \quad P^2 = \frac{S^n}{R^n} \text{ या } P^2 = \left(\frac{S}{R} \right)^n$$

$$\begin{aligned}
 \text{याची पक्ष} &= \left(\frac{S}{R} \right)^n = \left[\frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \times \frac{a r^n (r - 1)}{(r^n - 1)r} \right]^n \quad [\text{सभी (i) तथा (ii) से}] \\
 &= [a^2 r^n r^{-1}]^n = [a^2 r^{n-1}]^n = [a^2 r^{n(n-1)}] \\
 &= P^2 = \text{याची पक्ष} \quad [\text{सभी (iii) से}]
 \end{aligned}$$

इति सिद्धम्

नोट विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि यदि S में $r < 1$ लेते हैं, तब R में $r > 1$ लंगे।

प्रश्न 15. किसी समांतर श्रेढ़ी का p वाँ, q वाँ तथा r वाँ पद क्रमशः a, b तथा c हैं, तो सिद्ध कीजिए

$$(q - r)a + (r - p)b + (p - q)c = 0$$

हल यान लीजिए समांतर श्रेढ़ी है, $A, A + D, A + 2D, A + 3D, \dots$

दिया है,

$$p\text{वाँ पद} = A + (p-1)D = a \quad \dots (i)$$

$$q\text{वाँ पद} = A + (q-1)D = b \quad \dots (ii)$$

$$r\text{वाँ पद} = A + (r-1)D = c \quad \dots (iii)$$

अब, हमें सिद्ध करना है $(q - r)a + (r - p)b + (p - q)c = 0$

$$\text{बायीं पक्ष} = (q - r)a + (r - p)b + (p - q)c \quad \dots \text{(v)}$$

सभी (i), (ii) तथा (iii) से क्रमशः a, b, c का मान लेकर सभी (iv) में रखने पर,

$$\begin{aligned} \text{बायीं पक्ष} &= (q - r)[A + (p - 1)D] + (r - p)[A + (q - 1)D] + (p - q)[A + (r - 1)D] \\ &= (q - r)A + (q - r)(p - 1)D + (r - p)A + (r - p)(q - 1)D \\ &\quad + (p - q)A + (p - q)(r - 1)D \\ &= A(q - r + r - p + p - q) + D[(q - r)(p - 1) + (r - p)(q - 1) \\ &\quad + (p - q)(r - 1)] \\ &= A(0) + D(qp - q - rp + r + rq - r - pq + p + pr - p - qr + q) \\ &= 0 + 0 = 0 = \text{दायीं पक्ष} \end{aligned}$$

∴ बायीं पक्ष = दायीं पक्ष

इति सिद्धम्

नोट समांतर श्रेढ़ी का पहला पद a के स्थान पर A लेते हैं क्योंकि p वाँ पद a दिया हुआ है। विद्यार्थियों को इसे समांतर श्रेणी मानते समय व्याप्ति में रखना चाहिए।

प्रश्न 16. यदि $a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$, $b\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right)$, $c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$ समांतर श्रेढ़ी में हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a, b, c समांतर श्रेढ़ी में हैं।

हम समांतर श्रेढ़ी के सारे गुणों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे।

हल दिया है. $a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$, $b\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right)$, $c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$ समांतर श्रेढ़ी में हैं।

$\Rightarrow b\left(\frac{b+c}{bc}\right)$, $b\left(\frac{a+c}{ac}\right)$, $c\left(\frac{b+c}{ab}\right)$ समांतर श्रेढ़ी में हैं।

$\Rightarrow \frac{ab+ac}{bc}$, $\frac{ba+bc}{ac}$, $\frac{cb+ca}{ab}$ समांतर श्रेढ़ी में हैं।

प्रत्येक पद में 1 जोड़ने पर,

$\Rightarrow \frac{ab+ac}{bc} + 1$, $\frac{ba+bc}{ac} + 1$, $\frac{cb+ca}{ab} + 1$ समांतर श्रेढ़ी में हैं।

$\Rightarrow \frac{ab+ac+bc}{bc}$, $\frac{ba+bc+ac}{ac}$, $\frac{cb+ca+ab}{ab}$ समांतर श्रेढ़ी में हैं।

प्रत्येक पद को $ab + bc + ac$ से भाग करने पर,

$\Rightarrow \frac{1}{bc}, \frac{1}{ac}, \frac{1}{ab}$ समांतर श्रेढ़ी में हैं।

प्रत्येक पद को abc से गुणा करने पर,

$\Rightarrow \frac{abc}{bc}, \frac{abc}{ac}, \frac{abc}{ab}$ समांतर श्रेढ़ी में हैं।

$\Rightarrow a, b, c$ समांतर श्रेढ़ी में हैं।

इति सिद्धम्

प्रश्न 17. यदि a, b, c, d गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो सिद्ध कीजिए कि

$$(a^n + b^n), (b^n + c^n), (c^n + d^n) \text{ गुणोत्तर श्रेणी में हैं।}$$

हम जानते हैं कि यदि तीन संख्याएँ a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में हों, तब $b^2 = ac$

इस परिणाम का प्रयोग कर सत्यापित करें।

हल: ∵ a, b, c, d गुणोत्तर श्रेणी में हैं।

$$\Rightarrow b = ar, c = ar^2, d = ar^3 \quad \dots(i)$$

अब, हमें सिद्ध करना है $a^n + b^n, b^n + c^n, c^n + d^n$ गुणोत्तर अद्वीतीय हों।

$$\Rightarrow (b^n + c^n)^2 = (a^n + b^n)(c^n + d^n)$$

$$\text{दायरी पक्ष} = (a^n + b^n)(c^n + d^n)$$

$$= (a^n + a^n r^n) \times (a^n r^{2n} + a^n r^{3n})$$

[सभी (i) से]

$$= a^n(1 + r^n)a^n r^{2n}(1 + r^n)$$

$$= a^{2n}r^{2n}(1 + r^n)^2 = [a^n r^n(1 + r^n)]^2 = (a^n r^n + a^n r^{2n})^2$$

$$= [(ar)^n + (ar^2)^n]^2 = (b^n + c^n)^2$$

[सभी (i) से]

$$= \text{दायरी पक्ष}$$

$$\text{दायरी पक्ष} = \text{दायरी पक्ष}$$

इसी सिद्धान्त से

प्रश्न 18. यदि $x^2 - 3x + p = 0$ के मूल a तथा b हैं तथा $x^2 - 12x + q = 0$, के मूल c तथा d हैं, जहाँ a, b, c, d गुणोत्तर श्रेणी के रूप में हैं। सिद्ध कीजिए कि $(q + p) : (q - p) = 17 : 15$.

यदि दिया गया समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल α तथा β हैं।

$$\text{तब, मूलों का योग} = \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \text{ तथा मूलों का गुणनफल} = \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

हल: दिया है, समीकरण $x^2 - 3x + p = 0$ के मूल a तथा b हैं।

$$\therefore \text{मूलों का योग, } a + b = -\frac{(-3)}{1} = 3 \quad \dots(i)$$

$$\Rightarrow a + b = 3 \quad \dots(i)$$

$$\text{तथा मूलों का गुणनफल, } ab = p \quad \dots(ii)$$

पुनः दिया है, समीकरण $x^2 - 12x + q = 0$ के मूल c तथा d हैं।

$$\text{मूलों का योग, } c + d = -\frac{(-12)}{1} = 12 \quad \dots(iii)$$

$$\Rightarrow c + d = 12 \quad \dots(iv)$$

$$\text{तथा मूलों का गुणनफल, } cd = q \quad \dots(iv)$$

पुनः यह दिया हुआ है कि a, b, c, d गुणोत्तर श्रेणी में हैं।

$$\Rightarrow b = ar, c = ar^2 \text{ तथा } d = ar^3$$

इन सार्वों को समी (i) तथा (ii) में रखकर समी (i) को समी (ii) से भाग करने पर,

$$\frac{a + ar}{ar^2 + ar^3} = \frac{3}{12} \Rightarrow \frac{a(1+r)}{ar^2(1+r)} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow r^2 = 4$$

$$\Rightarrow r = \pm 2$$

पुनः समी (i) से,

$$a + ar = 3 \Rightarrow a + 2a = 3 \quad (\because r = 2)$$

$$\Rightarrow 3a = 3 \Rightarrow a = 1$$

अतः गुणोत्तर श्रेणी है

$$a = 1, b = ar = 1 \times 2 = 2, c = ar^2 = 1 \times 2^2 = 4, d = ar^3 = 1 \times 2^3 = 8$$

समी (ii) से, $p = ab = 1 \times 2 = 2$

समी (iv) से, $q = cd = 4 \times 8 = 32$

$$\therefore \frac{q + p}{q - p} = \frac{32 + 2}{32 - 2} = \frac{34}{30} = \frac{17}{15}$$

अतः $(q + p):(q - p) = 17 : 15$

पुनः समी (i) से, $a + ar = 3 \quad (\because r = -2)$

$$\Rightarrow a - 2a = 3 \Rightarrow a = -3$$

अतः गुणोत्तर श्रेणी है $a = -3, b = ar = (-3)(-2) = 6$

$$c = ar^2 = (-3)(-2)^2 = -12$$

$$d = ar^3 = (-3)(-2)^3 = 24$$

समी (ii) से, $p = ab = (-3)(+6) = -18$

समी (iv) से, $q = cd = (-12)(24) = -288$

$$\therefore \frac{q + p}{q - p} = \frac{-288 - 18}{-288 + 18} = \frac{-306}{-270} = \frac{17}{15}$$

अतः $(q + p):(q - p) = 17 : 15$

प्रश्न 19. दो अवाल्पक संख्याओं a तथा b के बीच समात्तर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात $m:n$ है। दर्शाइए कि $a:b = (m + \sqrt{m^2 - n^2}) : (m - \sqrt{m^2 - n^2})$

हल् मान लीजिए संख्याएँ a तथा b के बीच समात्तर माध्य A है तथा a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य G है।

तब, $A = \frac{a+b}{2}$ तथा $G = \sqrt{ab}$

दिया है, $A : G = m : n$

अर्थात्

$$\frac{A}{G} = \frac{m}{n} \Rightarrow \frac{a+b}{2\sqrt{ab}} = \frac{m}{n}$$

योगांतर विधि का प्रयोग करने पर,

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{a+b+2\sqrt{ab}}{a+b-2\sqrt{ab}} &= \frac{m+n}{m-n} \Rightarrow \frac{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 + 2\sqrt{ab}}{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 - 2\sqrt{ab}} = \frac{m+n}{m-n} \\ \Rightarrow \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2} &= \frac{m+n}{m-n} \Rightarrow \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{m+n}}{\sqrt{m-n}} \end{aligned}$$

पुनः योगांतर विधि का प्रयोग करने पर,

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b}) + (\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b}) - (\sqrt{a} - \sqrt{b})} &= \frac{\sqrt{m+n} + \sqrt{m-n}}{\sqrt{m+n} - \sqrt{m-n}} \\ \Rightarrow \frac{2\sqrt{a}}{2\sqrt{b}} &= \frac{\sqrt{m+n} + \sqrt{m-n}}{\sqrt{m+n} - \sqrt{m-n}} \\ \Rightarrow \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} &= \frac{\sqrt{m+n} + \sqrt{m-n}}{\sqrt{m+n} - \sqrt{m-n}} \end{aligned}$$

दोनों ओर का वर्ग करने पर,

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{a}{b} &= \frac{(\sqrt{m+n} + \sqrt{m-n})^2}{(\sqrt{m+n} - \sqrt{m-n})^2} \quad \left[\because (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \right. \\ &\quad \left. (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab \right] \\ \Rightarrow \frac{a}{b} &= \frac{m+n+m-n+2\sqrt{m+n}\sqrt{m-n}}{m+n+m-n-2\sqrt{m+n}\sqrt{m-n}} \\ \Rightarrow \frac{a}{b} &= \frac{2m+2\sqrt{m^2-n^2}}{2m-2\sqrt{m^2-n^2}} \quad \left[\because (a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \right] \\ \Rightarrow \frac{a}{b} &= \frac{m+\sqrt{m^2-n^2}}{m-\sqrt{m^2-n^2}} \\ \Rightarrow a:b &= (m+\sqrt{m^2-n^2}): (m-\sqrt{m^2-n^2}) \quad \text{इति सिद्धम्} \end{aligned}$$

प्रश्न 20. यदि a, b तथा c समांतर श्रेढ़ी में हैं, b, c तथा d गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं तथा $\frac{1}{c}, \frac{1}{d}$ तथा $\frac{1}{c}$ समांतर श्रेढ़ी में हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a, c तथा e गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं।

हल दिया है, a, b तथा c समांतर श्रेढ़ी में हैं।

$$\Rightarrow 2b = a+c \quad \dots(i)$$

पुनः b, c तथा d गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं।

$$\Rightarrow c^2 = bd \quad \dots(ii)$$

इसी प्रकार, $\frac{1}{c}, \frac{1}{d}$ तथा $\frac{1}{e}$ समांतर श्रेढ़ी में हैं।

$$\Rightarrow \frac{2}{d} = \frac{1}{c} + \frac{1}{e} \Rightarrow \frac{2 - e - c}{d - ce}$$

$$\Rightarrow d = \frac{2ce}{c + e} \quad \dots \text{(iii)}$$

सभी (i) तथा (ii) से d, c का मान सभी (ii) में रखने पर,

$$c^2 = \left(\frac{a+c}{2}\right) \times \left(\frac{2ce}{c+e}\right) \Rightarrow c^2 = \frac{a+c}{2} \times \frac{2ce}{c+e}$$

$$\Rightarrow c^2(c + e) = (a + c)ce$$

$$\Rightarrow c(c + e) = (a + c)e \Rightarrow c^2 + ce = ae + ce$$

$$\Rightarrow c^2 = ae$$

इसलिए a, c तथा e गुणोत्तर श्रेणी में हैं।

प्रश्न 21. निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात कीजिए।

$$(i) 5 + 55 + 555 + \dots \quad (ii) 0.6 + 0.66 + 0.666 + \dots$$

इस प्रकार के प्रश्नों में (जैसे—a, aa, aaa, ...) हमेशा उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर लेकर गुणोत्तर श्रेणी में बनाने के लिए प्रत्येक पद को 9 से गुणा तथा भाग करते हैं।

हल (i) मान लीजिए $S = 5 + 55 + 555 + \dots + n$ पदों तक

$$\begin{aligned} &= 5(1 + 11 + 111 + \dots + n \text{ पदों तक}) \\ &= \frac{5}{9}(9 + 99 + 999 + \dots + n \text{ पदों तक}) \\ &= \frac{5}{9}[(10 - 1) + (100 - 1) + (1000 - 1) + \dots + n \text{ पदों तक}] \\ &= \frac{5}{9}[(10 + 100 + 1000 + \dots + n \text{ पदों तक}) \\ &\quad - (1 + 1 + 1 + \dots + n \text{ पदों तक})] \\ &= \frac{5}{9} \left[\frac{10(10^n - 1)}{10 - 1} - n \right] \quad \left[\because \text{गुणोत्तर श्रेणी का योग} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, r > 1 \right] \\ &= \frac{5}{9} \left[\frac{10(10^n - 1)}{9} - n \right] \quad (\because 10^n = 1) \end{aligned}$$

(ii) मान लीजिए $S = 0.6 + 0.66 + 0.666 + \dots + n$ पदों तक

$$\begin{aligned} S &= 0.6(1 + 0.11 + 0.111 + \dots + n \text{ पदों तक}) \\ &= \frac{6}{9}(0.9 + 0.99 + 0.999 + \dots + n \text{ पदों तक}) \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{9}{10} + \frac{99}{100} + \frac{999}{1000} + \dots + n \text{ पदों तक} \right) \\ &= \frac{2}{3} \left[\left(1 - \frac{1}{10}\right) + \left(1 - \frac{1}{100}\right) + \left(1 - \frac{1}{1000}\right) + \dots + n \text{ पदों तक} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2}{3} \left[(1 + 1 + 1 + \dots + n \text{ पदों तक}) - \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \dots + n \text{ पदों तक} \right) \right] \\
 &= \frac{2}{3} \left[n - \frac{\frac{1}{10} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{10} \right)^n \right\}}{1 - \frac{1}{10}} \right] \quad \left[\because \text{गुणोत्तर श्रेणी का योग} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, r \neq 1 \right] \\
 &= \frac{2}{3} \left[n - \frac{\frac{1}{10} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{10} \right)^n \right\}}{\frac{9}{10}} \right] = \frac{2}{3} \left[n - \frac{1}{9} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{10} \right)^n \right\} \right]
 \end{aligned}$$

प्रश्न 22. श्रेणी का 20वाँ पद ज्ञात कीजिए।

$$2 \times 4 + 4 \times 6 + 6 \times 8 + \dots + n \text{ पदों तक}$$

हल दी हुई श्रेणी है, $2 \times 4 + 4 \times 6 + 6 \times 8 + \dots + n \text{ पदों तक}$

यहाँ, हम दी हुई श्रेणी को दो भागों में विभक्त करते हैं जो $2, 4, 6, \dots$ तथा $4, 6, 8, \dots$ हैं। दी हुई श्रेणी का n वाँ पद निकालने के लिए प्रत्येक भाग का n वाँ पद अलग-अलग निकालते हैं।

$$T_n = (2, 4, 6, \dots \text{ का } n\text{वाँ पद}) \times (4, 6, 8, \dots \text{ का } n\text{वाँ पद})$$

$$\begin{aligned}
 &= [2 + (n-1)2][4 + (n-1)2] \quad [\because T_n = a + (n-1)d] \\
 &= (2 + 2n - 2)(4 + 2n - 2) = 2n(2n + 2)
 \end{aligned}$$

$$n = 20 \text{ रखने पर, } T_{20} = 2 \times 20(2 \times 20 + 2) = 40(40 + 2) = 40 \times 42 = 1680$$

प्रश्न 23. श्रेणी $3 + 7 + 13 + 21 + 31 + \dots$ के n पदों का योग ज्ञात कीजिए।

यहाँ, हम अंतर विधि का प्रयोग करेंगे अर्थात् यदि एक श्रेणी इस प्रकार है कि जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर पा तो समातंतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी में है, तब हम इसका n वाँ पद अंतर विधि द्वारा निकालते हैं एवं इसका योग सूत्र $\Sigma n, \Sigma n^2$ तथा Σn^3 का प्रयोग कर निकालते हैं।

हल मान लीजिए $S = 3 + 7 + 13 + 21 + \dots + T_n$

$$S = 3 + 7 + 13 + \dots + T_n$$

$$0 = (3 + 4 + 6 + 8 + \dots + n \text{ पदों तक}) - T_0$$

$$T_0 = 3 + [4 + 6 + 8 + \dots + (n-1) \text{ पदों तक}]$$

$$= 3 + \frac{n-1}{2} [2 \times 4 + (n-1-1)2] \quad \left[\because S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} \right]$$

(यहाँ, पदों की संख्या = $n-1$)

$$= 3 + \frac{n-1}{2} [8 + (n-2)2]$$

$$= 3 + \frac{n-1}{2}(2n+4) = 3 + \frac{(n-1)}{2} \times 2(n+2)$$

$$= 3 + (n-1)(n+2) = 3 + n^2 + 2n - n - 2$$

$$\Rightarrow T_n = n^2 + n + 1$$

$$\text{अब, } S = \sum T_n = \sum(n^2 + n + 1) = \sum n^2 + \sum n + \sum 1$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} + n$$

$$= n\left(\frac{2n^2+n+2n+1}{6} + \frac{n+1}{2} + 1\right) \quad \left[\because \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \sum n = \frac{n(n+1)}{2}, \sum 1 = n \right]$$

$$= n\left(\frac{2n^2+3n+1+3n+3+6}{6}\right)$$

$$= n\left(\frac{2n^2+6n+10}{6}\right) = \frac{2n(n^2+3n+5)}{6} = \frac{n(n^2+3n+5)}{3}$$

प्रश्न 24. यदि S_1, S_2, S_3 क्रमशः प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, उनके बर्गों का योग तथा घनों का योग है, तो सिद्ध कीजिए कि $9S_2^2 = S_3(1 + 8S_1)$

यहाँ, हम सबूत $\sum n = \frac{n(n+1)}{2}, \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ तथा $\sum n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$ का प्रयोग करेंगे।

हल दिया है. S_1 = प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग = $\sum n$

$$\Rightarrow S_1 = \frac{n(n+1)}{2} \quad \dots(i)$$

तथा S_2 = प्रथम n प्राकृत संख्याओं के बर्गों का योग = $\sum n^2$

$$\Rightarrow S_2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \dots(ii)$$

तथा S_3 = प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग = $\sum n^3$

$$\Rightarrow S_3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 \quad \dots(iii)$$

अब, हमें सिद्ध करना है कि $9S_2^2 = S_3(1 + 8S_1)$

$$\text{दायीं ओर} = S_3(1 + 8S_1)$$

$$= \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 \left[1 + 8 \times \frac{n(n+1)}{2}\right] \quad [\text{समी (i) तथा (ii) से}]$$

$$= \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 [1 + 4n(n+1)] = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 (4n^2 + 4n + 1)$$

$$= \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 (2n+1)^2$$

9 से गुणा तथा भाग करने पर,

$$= 9 \times \frac{n^2 (n+1)^2}{4} \times \frac{(2n+1)^2}{9} = 9 \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]^2$$

$$= 9 \times S_2^2 = 9 S_2^2$$

= वार्षी पक्ष

[समी (ii) से]

∴ वार्षी पक्ष = दार्यों पक्ष

इति सिद्धम्

प्रश्न 25. निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों तक योग ज्ञात कीजिए।

$$\frac{1^3}{1} + \frac{1^3 + 2^3}{1+3} + \frac{1^3 + 2^3 + 3^3}{1+3+5} + \dots$$

यही तुर्हि केणी के n पदों का योग निकालने के लिए हम अंश तथा हर के पदों का योग छन्दः-निकालेंगे।

हल

$$T_n = \frac{\text{अंश का } n\text{वीं पद}}{\text{हर का } n\text{वीं पद}} = \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3}{1+3+5+\dots+n \text{ पदों तक}}$$

$$= \frac{\sum n^3}{\frac{n}{2} [2 \times 1 + (n-1)2]}$$

$$= \frac{\sum n^3}{\frac{n}{2} (2+2n-2)} = \frac{\sum n^3}{\frac{n}{2} \times 2n}$$

$$\left[\because S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\} \right]$$

$$\left[\Sigma n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow T_n = \frac{\sum n^3}{n^2} = \frac{\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2}{n^2} = \frac{n^2 (n+1)^2}{4n^2}$$

$$\Rightarrow T_n = \frac{1}{4} (n+1)^2 \Rightarrow T_n = \frac{1}{4} (n^2 + 1 + 2n)$$

$$\Rightarrow S = \sum T_n = \frac{1}{4} \sum (n^2 + 1 + 2n) = \frac{1}{4} (\sum n^2 + \sum 1 + 2\sum n)$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + n + \frac{2 \times n(n+1)}{2} \right]$$

$$\left[\because \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]$$

$$\left[\sum n = \frac{n(n+1)}{2}, \sum 1 = n \right]$$

$$= \frac{n}{4} \left[\frac{2n^2 + n + 2n + 1}{6} + 1 + n + 1 \right] = \frac{n}{4} \left[\frac{2n^2 + 3n + 1}{6} + \frac{n+2}{1} \right]$$

$$= \frac{n}{4} \left(\frac{2n^2 + 3n + 1 + 6n + 12}{6} \right)$$

$$= \frac{n}{24} (2n^2 + 9n + 13)$$

$$\text{प्रश्न 26. दराइए कि } \frac{1 \times 2^2 + 2 \times 3^2 + \dots + n \times (n+1)^2}{1^2 \times 2 + 2^2 \times 3 + \dots + n^2 \times (n+1)} = \frac{3n+5}{3n+1}$$

दी गई श्रेणी का योग निकालने के लिए, हम अंश तथा हर का अलग-अलग योग निकालेंगे।

मान लीजिए T_n तथा T_n' क्रमशः अंश तथा हर के न्यून यद्य प्रमाण हैं एवं S_n तथा S_n' क्रमशः

अंश तथा हर के n पदों का योग है।

$$\text{हल} \quad \text{अंश के लिए, } T_n = n(n+1)^2 = n(n^2 + 1 + 2n) = n^3 + 2n^2 + n$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow S_n &= \sum T_n = \sum (n^3 + 2n^2 + n) \\ &= \sum n^3 + 2 \sum n^2 + \sum n \\ &\left[\because \sum n^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2, \sum n^3 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \sum n = \frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &= \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 + \frac{2n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(2n+1)}{3} + 1 \right] \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{3n(n+1) + 4(2n+1) + 6}{6} \right] \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \left(\frac{3n^2 + 3n + 8n + 4 + 6}{6} \right) \\ &= \frac{n(n+1)(3n^2 + 11n + 10)}{12} = \frac{n(n+1)(3n^2 + 6n + 5n + 10)}{12} \\ &= \frac{n(n+1)[3n(n+2) + 5(n+2)]}{12} \\ &= \frac{n(n+1)(n+2)(3n+5)}{12} \end{aligned} \quad \dots(i)$$

पुनः हर के लिए,

मान लीजिए

$$T_n' = n^2(n+1) = n^3 + n^2$$

$$\text{अब, } S_n' = \sum T_n' = \sum (n^3 + n^2) = \sum n^3 + \sum n^2$$

$$\begin{aligned} &\left[\because \sum n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2, \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] \\ &= \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{n(n+1)}{2} + \frac{2n+1}{3} \right] \\ &= \frac{n(n+1)(3n^2 + 3n + 4n + 2)}{12} = \frac{n(n+1)(3n^2 + 7n + 2)}{12} \\ &= \frac{n(n+1)(3n^2 + 6n + n + 2)}{12} = \frac{n(n+1)[3n(n+2) + 1(n+2)]}{12} \\ T_n' &= \frac{n(n+1)(3n+1)(n+2)}{12} \end{aligned} \quad \dots(ii)$$

अतः ऐदी का अभीष्ट योग है,

$$\therefore \frac{I_n}{I_n} = \frac{\frac{n(n+1)(n+2)(3n+5)}{12}}{n(n+1)(3n+1)(n+2)} \quad [\text{सभी (i) तथा (ii) से}]$$

$$= \frac{3n+5}{3n+1} \quad \text{इति सिद्धम्}$$

प्रश्न 27. कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को ₹ 12000 में खरीदता है। वह ₹ 6000 का नकद भुगतान करता है और शेष राशि को ₹ 500 की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस घन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल किसी भीमत देनी पड़ेगी?

यहाँ, हम प्रत्येक वर्ष सरल ब्याज का मान निम्न सूत्र

$$\text{सरल ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

झारा निकालेंगे तथा इसके बाद हम ट्रैक्टर की कुल लागत सभी को जोड़कर निकालेंगे।

हल: ट्रैक्टर की भीमत = ₹ 12000

नकद भुगतान = ₹ 6000

शेष राशि = ₹ 6000

$$\text{पहली किस्त पर ब्याज} = \frac{6000 \times 12 \times 1}{100}$$

$$= ₹ 720$$

$$\left(\because I = \frac{P \times R \times T}{100} \right)$$

अब, भुगतान न की गई राशि = ₹ 6000 - ₹ 500 = ₹ 5500

$$\text{दूसरी किस्त पर ब्याज} = \frac{5500 \times 12 \times 1}{100} = ₹ 660$$

तृतीय भुगतान न की गई राशि = ₹ 5500 - ₹ 500 = ₹ 5000

$$\text{तीसरी किस्त पर ब्याज} = \frac{5000 \times 12 \times 1}{100} = ₹ 600$$

किसान झारा भुगतान किया गया कुल ब्याज = ₹ 720 + ₹ 660 + ₹ 600 + ... + 12 वटों तक

जो समातर श्रेणी में है तथा $a = ₹ 720, d = ₹ 660 - ₹ 720 = ₹ - 60$

$$\text{इसलिए, कुल ब्याज} = \frac{12}{2} [2 \times 720 + (12 - 1)(-60)]$$

$$= 6 (1440 - 11 \times 60) = 6 (1440 - 660) = 6 \times 780 = ₹ 4680$$

अतः कुल राशि या वास्तविक राशि = ₹ 12000 + ₹ 4680 = ₹ 16680

प्रश्न 28. शमशाद अली ₹ 22000 में एक स्कूटर खरीदता है। वह ₹ 4000 नकद देता है तथा शेष राशि को ₹ 1000 वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस घन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 10% वार्षिक ब्याज भी देता है। उसे स्कूटर के लिए किसी राशि चुकानी पड़ेगी?

हल स्कूटर की कीमत = ₹ 22000

नकद मुगलान = ₹ 4000, शेष मुगलान = ₹ 18000

$$\text{अब, पहली किस्त पर ब्याज} = \frac{18000 \times 10 \times 1}{100} = ₹ 1800$$

$$\left(\because I = \frac{P \times R \times T}{100} \right)$$

$$\text{मुगलान न की गई राशि} = 18000 - 1000 = 17000$$

$$\text{दूसरी किस्त पर ब्याज} = \frac{17000 \times 10 \times 1}{100} = ₹ 1700$$

$$\text{मुगलान न की गई राशि} = 17000 - 1000 = 16000$$

$$\text{तीसरी किस्त पर ब्याज} = \frac{16000 \times 10 \times 1}{100} = ₹ 1600$$

∴ शमशाद द्वारा मुगलान किया गया कुल ब्याज = $1800 + 1700 + 1600 + \dots + 18$ पदों तक
जो एक समांतर श्रेढ़ी में है तथा $a = 1800, d = 1700 - 1800 = -100$

$$\text{इसलिए कुल ब्याज} = \frac{18}{2} [2 \times 1800 + (18 - 1)(-100)]$$

$$[\because \text{समांतर श्रेढ़ी का योग} = S_n = \frac{n}{2} (2a + (n - 1)d)]$$

$$= 9 (3600 - 1700) = 9 \times 1900 = 17100$$

$$\text{अतः कुल राशि या वास्तविक राशि} = 22000 + 17100 = ₹ 39100$$

प्रश्न 29. एक व्यक्ति अपने चार मिन्टों को पत्र लिखता है। वह प्रत्येक को उसकी नकल करके चार दूसरे व्यक्तियों को भेजने पर निर्देश देता है तथा उनसे यह भी करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस मूर्खला को जारी रखे। यह कल्पना करके कि मूर्खला न दूटे, तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसे है।

हल रखीयतम् एक व्यक्ति अपने चार मिन्टों को चार पत्र भेजता है, तब उन चार व्यक्तियों द्वारा जो दूसरे व्यक्ति को प्रत्येक चार-चार पत्र भेजते हैं अर्थात् कुल $4 \times 4 = 16$ पत्र भेजते हैं।

इसी प्रकार, अगले घण्टे में, $4 \times 4 \times 4 = 64$ पत्र भेजे जाते हैं।

इस प्रकार, एक गुणोत्तर श्रेढ़ी बनेगी।

अर्थात्

$$4, 16, 64, 256, \dots$$

जहाँ, $a = 4$ तथा $r = 4$

अब, 8वें पत्रों के समूह तक कुल संख्या

$$S_8 = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \Rightarrow S_8 = \frac{4(4^8 - 1)}{4 - 1} \Rightarrow S_8 = \frac{4}{3}(4^8 - 1) \quad \left[\because S_n = \frac{a(r^n - 1)}{(r - 1)}, r > 1 \right]$$

एक पत्र का डाक खर्च = ₹ 0.50

$$\text{अतः कुल रब्द } = \frac{4}{3} (4^8 - 1) \times 0.50 = \frac{4}{3} \times (65536 - 1) \times 0.50 \\ = \frac{4}{3} \times 65535 \times 0.50 = ₹ 43690$$

प्रश्न 30. एक आदमी ने एक बैंक में ₹ 10000, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया। अब से रकम बैंक में जमा की गई तब से, 15वें वर्द में उसके खाले में कितनी रकम हो गई तथा 20 वर्षों बाद कुल कितनी रकम हो गई, जात कीजिए?

$$\text{हल } 1 \text{ वर्द बाद ₹ } 10000 \text{ पर ब्याज } = \frac{10000 \times 5 \times 1}{100} \quad \left(\because I = \frac{P \times R \times T}{100} \right) \\ = ₹ 500$$

$$\text{एक वर्द बाद जमा की गई राशि } = 10000 + 500 = ₹ 10500$$

$$\text{अब, दो वर्द बाद ₹ } 10000 \text{ पर ब्याज } = \frac{10000 \times 5 \times 2}{100} = ₹ 1000$$

$$2 \text{ वर्द बाद जमा की गई राशि } = 10000 + 1000 = ₹ 11000$$

$$\text{इसी प्रकार, तीन वर्द बाद ₹ } 10000 \text{ पर ब्याज } = \frac{10000 \times 5 \times 3}{100} = ₹ 1500$$

$$\therefore \text{तीन वर्द बाद जमा की गई राशि } = 10000 + 1500 = ₹ 11500$$

अतः आदमी के खाले में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्द बचत की राशि क्रमशः ₹ 10000, 10500, 11000, ... है।

$$\text{यह समातर श्रेणी में है जहाँ, } a = 10000 \text{ तथा } d = 500$$

$$15 \text{ वर्द में जमा की गई राशि } = T_{15} = a + 14d = 10000 + 14 \times 500 \\ = 10000 + 7000 = ₹ 17000$$

$$20 \text{ वर्द बाद जमा की गई राशि } = 10000 + 20 \times 500 \\ = 10000 + 10000 = ₹ 20000$$

प्रश्न 31. एक नियमित घोषित करता है कि उसकी मशीन विस्तक मूल्य ₹ 15625 है, हर वर्द 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। 5 वर्द बाद मशीन का अनुमानित मूल्य जात कीजिए।

यदि किसी मशीन की कीमत P है जो $r\%$ की दर से प्रतिवर्ष घट जाती है, तब n वर्दों बाद मशीन की कीमत का सूत्र निम्न है अर्थात्

$$A = P \left(1 - \frac{r}{100} \right)^n$$

$$\text{हल } \text{यहाँ, श्रेणी है, } 15625 \left(1 - \frac{20}{100} \right), 15625 \left(1 - \frac{20}{100} \right)^2, 15625 \left(1 - \frac{20}{100} \right)^3, \dots$$

$$5 \text{ वर्द बाद मशीन का अनुमानित मूल } = T_5 = 15625 \left(1 - \frac{20}{100} \right)^5 = 15625 \times \left(1 - \frac{1}{5} \right)^5$$

$$\begin{aligned}
 &= 15625 \times \left(\frac{5-1}{5}\right)^5 \\
 &= 15625 \times \left(\frac{4}{5}\right)^5 \\
 &= \frac{15625 \times 1024}{625 \times 5} \\
 &= \frac{25 \times 1024}{5} = 5 \times 1024 \\
 &= 5120
 \end{aligned}$$

नोट हास में, प्रत्येक वर्ष मूल्य का मान पट्टा है।

प्रश्न 32. किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया तथा इस प्रकार अन्य। अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिनमें कार्य पूर्ण किया गया।

हल मान लीजिए दिनों की संख्या जिनमें कार्य पूर्ण किया जाता है n है। अब प्रस्तानुसार, प्रत्येक दिन चार कर्मचारी कार्य छोड़ देते हैं तो अर्थात् कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है, 150, 146, 142, 138, ... स्पष्ट रूप से, दोनों स्थितियों में कार्य करना समान है।

[यदि कोई कर्मचारी कार्य नहीं छोड़ता है, तब प्रत्येक दिन 150 कर्मचारियों द्वारा $(n - 8)$ दिनों में कार्य पूर्ण होगा। अतः कर्मचारियों की कुल संख्या $150(n - 8)$ होगी जिन्होंने n दिनों तक कार्य किया होगा।]

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 150(n - 8) &= \frac{n}{2} [2 \times 150 + (n - 1)(-4)] & \left[\text{सूत्र } S_n = \frac{n}{2} (2a + (n-1)d) \text{ से} \right] \\
 \Rightarrow 150n - 1200 &= \frac{n}{2} \times 2 (150 - 2n + 2) \\
 \Rightarrow 150n - 1200 &= \frac{n}{2} \times 2 (152 - 2n)
 \end{aligned}$$

प्रत्येक पद को 2 से भाग करने पर,

$$75n - 600 = n(76 - n) \Rightarrow 75n - 600 = 76n - n^2$$

$$n^2 - 76n + 75n - 600 = 0 \Rightarrow n^2 - n - 600 = 0$$

मध्य पद को विभक्त कर गुणनखंड करने पर,

$$\Rightarrow n^2 - (25n - 24n) - 600 = 0 \Rightarrow n^2 - 25n + 24n - 600 = 0$$

$$\Rightarrow n(n - 25) + 24(n - 25) = 0 \Rightarrow (n - 25)(n + 24) = 0$$

$$\Rightarrow n = 25$$

तथा $n \neq -24$ क्योंकि यह संभव नहीं है।

अतः 25 दिनों में कार्य पूर्ण होगा।