

## गुणनखंडन



0853CH14

## 12.1 भूमिका

## 12.1.1 प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड

आपको याद होगा कि आपने गुणनखंडों (factors) के बारे में कक्षा VI में पढ़ा था। आइए, एक प्राकृत संख्या लेते हैं। मान लीजिए यह संख्या 30 है। हम इसे अन्य प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, जैसे

$$30 = 2 \times 15 \\ = 3 \times 10 = 5 \times 6$$

इस प्रकार 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 संख्या 30 के गुणनखंड हैं। इनमें से 2, 3 और 5, संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंड हैं (क्यों?)। जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी हो, तो वह उसका अभाज्य गुणनखंड रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए 30 को अभाज्य गुणनखंड रूप में  $2 \times 3 \times 5$  लिखते हैं।

70 का अभाज्य गुणनखंड रूप  $2 \times 5 \times 7$  है। 90 का अभाज्य गुणनखंड रूप  $2 \times 3 \times 3 \times 5$  है, इत्यादि।

इसी प्रकार, हम बीजीय व्यंजकों (algebraic expression) को भी उनके गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे।

## 12.1.2 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड

हम कक्षा VII में देख चुके हैं कि बीजीय व्यंजकों के पद (terms) गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में बनते हैं। उदाहरणार्थ, बीजीय व्यंजक  $5xy + 3x$  में, पद  $5xy$  गुणनखंडों 5,  $x$  और  $y$  से बना है, अर्थात्

$$5xy = 5 \times x \times y$$

ध्यान दीजिए कि  $5xy$  के गुणनखंड 5,  $x$  और  $y$  को और आगे गुणनखंडित नहीं किया जा सकता है, अर्थात् उन्हें गुणनखंडों के

हम जानते हैं कि 30 को इस रूप में भी लिखा जा सकता है :  
 $30 = 1 \times 30$

इस प्रकार, 1 और 30 भी 30 के गुणनखंड हैं। आप देखेंगे कि 1 प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है उदाहरणार्थ,  $101 = 1 \times 101$  होता है।

परंतु जब भी हम किसी संख्या को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो हम, 1 को गुणनखंड के रूप में तब तक नहीं लिखेंगे। जब तक विशेष रूप से आवश्यक न हो।

ध्यान दीजिए कि 1 पद  $5xy$ , का एक गुणनखंड है, क्योंकि

$$5xy = 1 \times 5 \times x \times y$$

वास्तव में, 1 प्रत्येक पद का एक गुणनखंड होता है। प्राकृत संख्याओं की स्थिति की ही तरह, जब तक विशेष रूप से आवश्यक न हो, हम 1 को किसी भी पद का अलग से गुणनखंड नहीं लिखते हैं।

गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि  $5xy$  के अभाज्य गुणनखंड (prime factors) 5,  $x$  और  $y$  हैं। बीजीय व्यंजकों में, हम 'अभाज्य' के स्थान पर शब्द 'अखंडनीय (irreducible)' का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि  $5xy$  का अखंडनीय रूप  $5 \times x \times y$  है। ध्यान दीजिए कि  $5 \times (xy)$  पद  $5xy$  का अखंडनीय रूप नहीं है, क्योंकि गुणनखंड  $xy$  को और आगे  $x$  एवं  $y$  के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात्  $xy = x \times y$  है।

अब, व्यंजक  $3x(x+2)$  पर विचार कीजिए। इसे गुणनखंडों 3,  $x$  और  $(x+2)$  के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात्

$$3x(x+2) = 3 \times x \times (x+2)$$

व्यंजक  $3x(x+2)$  के अखंडनीय गुणनखंड 3,  $x$  और  $(x+2)$  हैं।

इसी प्रकार, व्यंजक  $10x(x+2)(y+3)$  को अखंडनीय रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है :

$$10x(x+2)(y+3) = 2 \times 5 \times x \times (x+2) \times (y+3)$$

## 12.2 गुणनखंडन क्या है?

जब हम किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं, तो हम उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड, संख्याएँ, बीजीय चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं।  $3xy$ ,  $5x^2y$ ,  $2x(y+2)$ ,  $5(y+1)(x+2)$  जैसे व्यंजक पहले से ही गुणनखंड रूप में हैं। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, हम उपरोक्त व्यंजकों के गुणनखंड इन्हें देखकर ही पढ़ सकते हैं।

इसके विपरीत  $2x+4$ ,  $3x+3y$ ,  $x^2+5x$ ,  $x^2+5x+6$  जैसे व्यंजकों पर विचार कीजिए। यह स्पष्ट नहीं है कि इनके गुणनखंड क्या हैं। इस प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड करने के लिए, हमें क्रमबद्ध विधियाँ विकसित करने की आवश्यकता है। यही अब हम करेंगे।

### 12.2.1 सार्व गुणनखंडों की विधि

- हम एक सरल उदाहरण से प्रारंभ करते हैं :  $2x+4$  के गुणनखंड कीजिए। हम इसके प्रत्येक पद को अखंडनीय गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे :

$$2x = 2 \times x$$

$$4 = 2 \times 2$$

अतः  $2x+4 = (2 \times x) + (2 \times 2)$

ध्यान दीजिए कि गुणनखंड 2 दोनों पदों में उभयनिष्ठ (सार्व) है।

देखिए, बंटन नियम द्वारा

$$2 \times (x+2) = (2 \times x) + (2 \times 2)$$

अतः हम लिख सकते हैं कि

$$2x+4 = 2 \times (x+2) = 2(x+2)$$

इस प्रकार, व्यंजक  $2x+4$  वही है जो  $2(x+2)$  है। अब हम इसके गुणनखंड पढ़ सकते हैं : ये 2 और  $(x+2)$  हैं। ये गुणनखंड अखंडनीय हैं।

अब,  $5xy+10x$  के गुणनखंड कीजिए।

$5xy$  और  $10x$  के अखंडनीय गुणनखंड रूप क्रमशः हैं :

$$5xy = 5 \times x \times y$$

$$10x = 2 \times 5 \times x$$

ध्यान दीजिए कि दोनों पदों में 5 और  $x$  उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। अब,

$$\begin{aligned} 5xy + 10x &= (5 \times x \times y) + (5 \times x \times 2) \\ &= (5x \times y) + (5x \times 2) \end{aligned}$$

हम दोनों पदों को बंटन नियम द्वारा संयोजित करते हैं :

$$(5x \times y) + (5x \times 2) = 5x \times (y + 2)$$

अतः  $5xy + 10x = 5x(y + 2)$  (यही वांछित गुणनखंड रूप है।)

**उदाहरण 1 :**  $12a^2b + 15ab^2$  के गुणनखंड कीजिए।

**हल :** हम पाते हैं :

$$\begin{aligned} 12a^2b &= 2 \times 2 \times 3 \times a \times a \times b \\ 15ab^2 &= 3 \times 5 \times a \times b \times b \end{aligned}$$

इन दोनों पदों में 3,  $a$  और  $b$  सार्व गुणनखंड हैं

अतः

$$\begin{aligned} 12a^2b + 15ab^2 &= (3 \times a \times b \times 2 \times 2 \times a) + (3 \times a \times b \times 5 \times b) \\ &= 3 \times a \times b \times [(2 \times 2 \times a) + (5 \times b)] \\ &= 3ab \times (4a + 5b) \quad (\text{पदों को मिलाने पर}) \\ &= 3ab(4a + 5b) \quad (\text{वांछित गुणनखंड रूप}) \end{aligned}$$

**उदाहरण 2 :**  $10x^2 - 18x^3 + 14x^4$  के गुणनखंड कीजिए।

**हल :**

$$\begin{aligned} 10x^2 &= 2 \times 5 \times x \times x \\ 18x^3 &= 2 \times 3 \times 3 \times x \times x \times x \\ 14x^4 &= 2 \times 7 \times x \times x \times x \times x \end{aligned}$$

इन तीनों पदों में सार्व गुणनखंड 2,  $x$  और  $x$  हैं।

अतः

$$\begin{aligned} 10x^2 - 18x^3 + 14x^4 &= (2 \times x \times x \times 5) - (2 \times x \times x \times 3 \times 3 \times x) \\ &\quad + (2 \times x \times x \times 7 \times x \times x) \\ &= 2 \times x \times x \times [(5 - (3 \times 3 \times x) + (7 \times x \times x))] \\ &= 2x^2 \times (5 - 9x + 7x^2) = \underbrace{2x^2(7x^2 - 9x + 5)}_{\text{(तीनों पदों को मिलाने पर)}} \end{aligned}$$

### प्रयास कीजिए

गुणनखंड कीजिए :

- (i)  $12x + 36$     (ii)  $22y - 33z$     (iii)  $14pq + 35pqr$

क्या आप देख रहे हैं कि एक व्यंजक के गुणनखंड रूप में केवल एक ही पद होता है?

### 12.2.2 पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन

व्यंजक  $2xy + 2y + 3x + 3$  पर विचार कीजिए। आप देखेंगे कि पहले दो पदों में सार्व गुणनखंड 2 और  $y$  हैं तथा अंतिम दो पदों में सार्व गुणनखंड 3 है। परंतु सभी पदों में कोई सार्व गुणनखंड नहीं है। हम किस प्रकार प्रारंभ करेंगे?

आइए,  $(2xy + 2y)$  को गुणनखंड रूप में लिखें।

$$\begin{aligned} 2xy + 2y &= (2 \times x \times y) + (2 \times y) \\ &= (2 \times y \times x) + (2 \times y \times 1) \\ &= (2y \times x) + (2y \times 1) = 2y(x + 1) \end{aligned}$$

इसी प्रकार,

$$\begin{aligned} 3x + 3 &= (3 \times x) + (3 \times 1) \\ &= 3 \times (x + 1) = 3(x + 1) \end{aligned}$$

ध्यान दीजिए : यहाँ हमें 1 को गुणनखंड के रूप में दर्शाने की आवश्यकता है। क्यों?

$$\text{अतः} \quad 2xy + 2y + 3x + 3 = 2y(x + 1) + 3(x + 1)$$

ध्यान दीजिए कि यहाँ दाएँ पक्ष के दोनों पदों में एक सार्व गुणनखंड  $(x + 1)$  है। दोनों पदों को मिलाने पर,

$$2xy + 2y + 3x + 3 = 2y(x + 1) + 3(x + 1) = (x + 1)(2y + 3)$$

अब, व्यंजक  $2xy + 2y + 3x + 3$  गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है। इसके गुणनखंड  $(x + 1)$  और  $(2y + 3)$  हैं। ध्यान दीजिए कि ये गुणनखंड अखंडनीय हैं।

### पुनः समूहन ( regrouping ) क्या है?

मान लीजिए कि उपरोक्त व्यंजक  $2xy + 3 + 2y + 3x$  के रूप में दिया है, तब इसका गुणनखंडन देखना सरल नहीं है। इसी व्यंजक को  $2xy + 2y + 3x + 3$  के रूप में पुनर्व्यवस्थित करने पर, इसके  $(2xy + 2y)$  और  $(3x + 3)$  समूह बनाकर गुणनखंडन किया जा सकता है, यही पुनः समूहन है।

पुनः समूहन एक से अधिक विधियों द्वारा संभव हो सकता है। मान लीजिए कि हम उपरोक्त व्यंजक को  $2xy + 3x + 2y + 3$  के रूप में पुनः समूहन करते हैं। इससे भी हम गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। आइए, प्रयास करें :

$$\begin{aligned} 2xy + 3x + 2y + 3 &= 2 \times x \times y + 3 \times x + 2y + 3 \\ &= x \times (2y + 3) + 1 \times (2y + 3) \\ &= (2y + 3)(x + 1) \end{aligned}$$

गुणनखंड वही हैं (जैसा कि उन्हें होना चाहिए), यद्यपि वे विभिन्न क्रम में दिखाई दे रहे हैं।

**उदाहरण 3 :**  $6xy - 4y + 6 - 9x$  के गुणनखंड कीजिए।

**हल :**

**चरण 1** जाँच कीजिए कि क्या सभी पदों में कोई सार्व गुणनखंड है। यहाँ कोई नहीं है।

**चरण 2** समूहन के बारे में सोचिए। ध्यान दीजिए कि पहले दो पदों में सार्व गुणनखंड  $2y$  है। अतः,

$$6xy - 4y = 2y(3x - 2) \quad (\text{a})$$

अंतिम दो पदों के बारे में क्या कहा जा सकता है? उन्हें देखिए। यदि आप इनका क्रम बदलकर  $-9x + 6$ , लिख लें, तो गुणनखंड  $(3x - 2)$  आ जाएगा।

$$\text{अतः} \quad -9x + 6 = -3(3x) + 3(2)$$

$$= -3(3x - 2) \quad (\text{b})$$

**चरण 3** (a) और (b) को एक साथ रखने पर,

$$\begin{aligned} 6xy - 4y + 6 - 9x &= 6xy - 4y - 9x + 6 \\ &= 2y(3x - 2) - 3(3x - 2) \\ &= (3x - 2)(2y - 3) \end{aligned}$$

इस प्रकार,  $(6xy - 4y + 6 - 9x)$  के गुणनखंड  $(3x - 2)$  और  $(2y - 3)$  हैं।

## प्रश्नावली 12.1



1. दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए :

- (i)  $12x, 36$                       (ii)  $2y, 22xy$                       (iii)  $14pq, 28p^2q^2$   
 (iv)  $2x, 3x^2, 4$                       (v)  $6abc, 24ab^2, 12a^2b$   
 (vi)  $16x^3, -4x^2, 32x$                       (vii)  $10pq, 20qr, 30rp$   
 (viii)  $3x^2y^3, 10x^3y^2, 6x^2y^2z$

2. निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए :

- (i)  $7x - 42$                       (ii)  $6p - 12q$                       (iii)  $7a^2 + 14a$   
 (iv)  $-16z + 20z^3$                       (v)  $20l^2m + 30alm$   
 (vi)  $5x^2y - 15xy^2$                       (vii)  $10a^2 - 15b^2 + 20c^2$   
 (viii)  $-4a^2 + 4ab - 4ca$                       (ix)  $x^2yz + xy^2z + xyz^2$  (तीनों पदों को मिलाने पर)  
 (x)  $ax^2y + bxy^2 + cxyz$

3. गुणनखंड कीजिए :

- (i)  $x^2 + xy + 8x + 8y$                       (ii)  $15xy - 6x + 5y - 2$   
 (iii)  $ax + bx - ay - by$                       (iv)  $15pq + 15 + 9q + 25p$   
 (v)  $z - 7 + 7xy - xyz$

### 12.2.3 सर्वसमिकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन

हम जानते हैं कि

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{(I)}$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \text{(II)}$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad \text{(III)}$$

निम्नलिखित हल किए उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि गुणनखंडन के लिए इन सर्वसमिकाओं (identities) का किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। पहले हम दिए हुए व्यंजक को देखते हैं। यदि यह उपरोक्त सर्वसमिकाओं में से किसी एक के दाएँ पक्ष के रूप का है, तो उस सर्वसमिका के बाएँ पक्ष के संगत व्यंजक से वांछित गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं।

**उदाहरण 4 :**  $x^2 + 8x + 16$  के गुणनखंड कीजिए।

**हल :** इस व्यंजक को देखिए। इसके तीन पद हैं। अतः इसमें सर्वसमिका III का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही, इसके पहले और तीसरे पद पूर्ण वर्ग हैं तथा बीच वाले पद का चिह्न धनात्मक है। अतः यह  $a^2 + 2ab + b^2$  के रूप का है, जहाँ  $a = x$  और  $b = 4$  हैं।

इस प्रकार,

$$a^2 + 2ab + b^2 = x^2 + 2(x)(4) + 4^2$$

$$= x^2 + 8x + 16$$

क्योंकि

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2,$$

तुलना करने पर,

$$x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2 \quad \text{(वांछित गुणनखंडन)}$$

**उदाहरण 5 :**  $4y^2 - 12y + 9$  के गुणनखंड कीजिए।

**हल :** ध्यान दीजिए कि  $4y^2 = (2y)^2$ ,  $9 = 3^2$  और  $12y = 2 \times 3 \times (2y)$

अतः

$$4y^2 - 12y + 9 = (2y)^2 - 2 \times 3 \times (2y) + (3)^2$$

$$= (2y - 3)^2 \quad \text{(वांछित गुणनखंडन)}$$

ध्यान दीजिए कि दिया हुआ व्यंजक  $a^2 - 2ab + b^2$  के रूप का है, जहाँ  $a = 2y$ ,  $b = 3$  तथा  $2ab = 2 \times 2y \times 3 = 12y$  हैं।

**उदाहरण 6 :**  $49p^2 - 36$  के गुणनखंड कीजिए।

**हल :** यहाँ दो पद हैं। दोनों ही पूर्ण वर्ग हैं तथा दूसरा ऋणात्मक है अर्थात् यह व्यंजक  $(a^2 - b^2)$  के रूप का है। यहाँ सर्वसमिका III का प्रयोग किया जाएगा।

$$\begin{aligned} 49p^2 - 36 &= (7p)^2 - (6)^2 \\ &= (7p - 6)(7p + 6) \text{ (वांछित गुणनखंडन)} \end{aligned}$$

**उदाहरण 7 :**  $a^2 - 2ab + b^2 - c^2$  के गुणनखंड कीजिए।

**हल :** दिए हुए व्यंजक के पहले तीन पदों से  $(a - b)^2$  प्राप्त होता है। चौथा पद एक वर्ग है। इसलिए इस व्यंजक को दो वर्गों के अंतर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

$$\begin{aligned} \text{इस प्रकार } a^2 - 2ab + b^2 - c^2 &= (a - b)^2 - c^2 && \text{(सर्वसमिका II से)} \\ &= [(a - b) - c][(a - b) + c] && \text{(सर्वसमिका III से)} \\ &= (a - b - c)(a - b + c) && \text{(वांछित गुणनखंडन)} \end{aligned}$$



ध्यान दीजिए कि वांछित गुणनखंडन प्राप्त करने के लिए, हमने किस प्रकार एक के बाद एक दो सर्वसमिकाओं का प्रयोग किया है।

**उदाहरण 8 :**  $m^4 - 256$  के गुणनखंड कीजिए।

**हल :** हम देखते हैं कि  $m^4 = (m^2)^2$  और  $256 = (16)^2$

अतः दिए हुए व्यंजक में सर्वसमिका III का प्रयोग होगा।

$$\begin{aligned} \text{इसलिए } m^4 - 256 &= (m^2)^2 - (16)^2 \\ &= (m^2 - 16)(m^2 + 16) \quad \text{[(सर्वसमिका (III)से]} \end{aligned}$$

अब  $m^2 + 16$  के आगे गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, परंतु  $(m^2 - 16)$  के सर्वसमिका III के प्रयोग से और भी गुणनखंड किए जा सकते हैं।

$$\begin{aligned} \text{अब } m^2 - 16 &= m^2 - 4^2 \\ &= (m - 4)(m + 4) \end{aligned}$$

$$\text{इसलिए } m^4 - 256 = (m - 4)(m + 4)(m^2 + 16)$$

### 12.2.4 $(x + a)(x + b)$ के रूप के गुणनखंड

आइए अब चर्चा करें कि हम एक चर वाले व्यंजकों, जैसे  $x^2 + 5x + 6$ ,  $y^2 - 7y + 12$ ,  $z^2 - 4z - 12$ ,  $3m^2 + 9m + 6$ , इत्यादि के गुणनखंड किस प्रकार कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ये व्यंजक  $(a + b)^2$  या  $(a - b)^2$  के प्रकार के नहीं हैं, अर्थात् ये पूर्ण वर्ग नहीं हैं। उदाहरणार्थ,  $x^2 + 5x + 6$  में पद 6 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। स्पष्टतः इस प्रकार के व्यंजक  $(a^2 - b^2)$  के प्रकार के भी नहीं हैं।

परंतु ये  $x^2 + (a + b)x + ab$  के प्रकार के प्रतीत होते हैं। इसलिए इस प्रकार के गुणनखंड करने के लिए, हम पिछले अध्याय में अध्ययन की गई सर्वसमिका सात का प्रयोग कर सकते हैं। यह सर्वसमिका है :

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab \quad \text{(IV)}$$

इसके लिए हमें  $x$  के गुणांक (coefficient) और अचर पद को देखना होगा। आइए, निम्नलिखित उदाहरण में देखें कि ऐसा किस प्रकार किया जाता है।

**उदाहरण 9 :**  $x^2 + 5x + 6$  के गुणनखंड कीजिए।

**हल :** यदि हम सर्वसमिका (IV) के दाएँ पक्ष (RHS) से  $x^2 + 5x + 6$  की तुलना करें, तो हम पाएँगे कि  $ab = 6$  और  $a + b = 5$  है। यहाँ से हमें  $a$  और  $b$  ज्ञात करने चाहिए। तब  $(x + a)$  और  $(x + b)$  गुणनखंड होंगे।

यदि  $ab = 6$  है, तो इसका अर्थ है कि  $a$  और  $b$  संख्या 6 के गुणनखंड हैं।

आइए,  $a = 6$  और  $b = 1$  लेकर प्रयास करें। इन मानों के लिए  $a + b = 7$  है और 5 नहीं है। इसलिए यह विकल्प सही नहीं है।

आइए  $a = 2$  और  $b = 3$  लेकर प्रयास करें। इसके लिए,  $a + b = 5$  है, जो ठीक वही है जो हम चाहते हैं।

तब, इस दिए हुए व्यंजक का गुणनखंड रूप  $(x + 2)(x + 3)$  है।

व्यापक रूप में,  $x^2 + px + q$  के प्रकार के बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करने के लिए, हम  $q$  के (अर्थात् अचर पद के) दो गुणनखंड  $a$  और  $b$  इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि

$$ab = q \quad \text{और} \quad a + b = p \quad \text{हो।}$$

तब, यह व्यंजक हो जाता है :  $x^2 + (a + b)x + ab$

या  $x^2 + ax + bx + ab$

या  $x(x + a) + b(x + a)$

या  $(x + a)(x + b)$  जो, वांछित गुणनखंड हैं।

**उदाहरण 10 :**  $y^2 - 7y + 12$  के गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

**हल :** हम देखते हैं कि  $12 = 3 \times 4$  और  $3 + 4 = 7$  है।

$$\begin{aligned} \text{इसलिए} \quad y^2 - 7y + 12 &= y^2 - 3y - 4y + 12 \\ &= y(y - 3) - 4(y - 3) = (y - 3)(y - 4) \end{aligned}$$

ध्यान दीजिए कि इस बार हमने  $a$  और  $b$  ज्ञात करने के लिए, दिए हुए व्यंजक की तुलना सर्वसमिका IV से नहीं की। पर्याप्त अभ्यास के बाद, आपको दिए हुए व्यंजकों के गुणनखंड करने के लिए उनकी तुलना सर्वसमिकाओं के व्यंजकों से करने की आवश्यकता नहीं है तथा आप सीधे ही गुणनखंड कर सकते हैं जैसा हमने ऊपर किया है।

**उदाहरण 11 :**  $z^2 - 4z - 12$  के गुणनखंड प्राप्त कीजिए।

**हल :** यहाँ  $ab = -12$  है। इसका अर्थ है कि  $a$  और  $b$  में से एक ऋणात्मक है। साथ ही,  $a + b = -4$  है। इसका अर्थ है कि बड़े संख्यात्मक मान वाला ऋणात्मक है। हम  $a = -4$  और  $b = 3$ ; लेकर प्रयास करते हैं। परंतु यह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि  $a + b = -1$  है। इनसे अगले संभव मान  $a = -6$  और  $b = 2$  हैं, तब  $a + b = -4$  है, जो हमें चाहिए।

$$\begin{aligned} \text{अतः} \quad z^2 - 4z - 12 &= z^2 - 6z + 2z - 12 \\ &= z(z - 6) + 2(z - 6) \\ &= (z - 6)(z + 2) \end{aligned}$$

**उदाहरण 12 :**  $3m^2 + 9m + 6$  के गुणनखंड प्राप्त कीजिए।

**हल :** हम देखते हैं कि 3 सभी पदों का एक सार्व गुणनखंड है।

अतः  $3m^2 + 9m + 6 = 3(m^2 + 3m + 2)$

अब,  $m^2 + 3m + 2 = m^2 + m + 2m + 2$  (क्योंकि  $2 = 1 \times 2$ )  
 $= m(m + 1) + 2(m + 1)$   
 $= (m + 1)(m + 2)$

अतः  $3m^2 + 9m + 6 = 3(m + 1)(m + 2)$



## प्रश्नावली 12.2

1. निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए :

- (i)  $a^2 + 8a + 16$     (ii)  $p^2 - 10p + 25$     (iii)  $25m^2 + 30m + 9$   
 (iv)  $49y^2 + 84yz + 36z^2$     (v)  $4x^2 - 8x + 4$   
 (vi)  $121b^2 - 88bc + 16c^2$   
 (vii)  $(l + m)^2 - 4lm$  (संकेत : पहले  $(l + m)^2$  को प्रसारित कीजिए।)  
 (viii)  $a^4 + 2a^2b^2 + b^4$

2. गुणनखंड कीजिए :

- (i)  $4p^2 - 9q^2$     (ii)  $63a^2 - 112b^2$     (iii)  $49x^2 - 36$   
 (iv)  $16x^5 - 144x^3$     (v)  $(l + m)^2 - (l - m)^2$   
 (vi)  $9x^2y^2 - 16$     (vii)  $(x^2 - 2xy + y^2) - z^2$   
 (viii)  $25a^2 - 4b^2 + 28bc - 49c^2$

3. निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए :

- (i)  $ax^2 + bx$     (ii)  $7p^2 + 21q^2$     (iii)  $2x^3 + 2xy^2 + 2xz^2$   
 (iv)  $am^2 + bm^2 + bn^2 + an^2$     (v)  $(lm + l) + m + 1$   
 (vi)  $y(y + z) + 9(y + z)$     (vii)  $5y^2 - 20y - 8z + 2yz$   
 (viii)  $10ab + 4a + 5b + 2$     (ix)  $6xy - 4y + 6 - 9x$

4. गुणनखंड कीजिए :

- (i)  $a^4 - b^4$     (ii)  $p^4 - 81$     (iii)  $x^4 - (y + z)^4$   
 (iv)  $x^4 - (x - z)^4$     (v)  $a^4 - 2a^2b^2 + b^4$

5. निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए :

- (i)  $p^2 + 6p + 8$     (ii)  $q^2 - 10q + 21$     (iii)  $p^2 + 6p - 16$

## 12.3 बीजीय व्यंजकों का विभाजन

हम सीख चुके हैं कि बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार जोड़ा और घटाया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि दो व्यंजकों को किस प्रकार गुणा किया जाता है। परंतु हमने एक बीजीय व्यंजक से दूसरे व्यंजक के विभाजन पर अभी तक चर्चा नहीं की है इस अनुच्छेद में, हम यही करना चाहते हैं।



आपको याद होगा कि विभाजन (division) गुणन (multiplication) की प्रतिलोम सक्रिया है। इस प्रकार,  $7 \times 8 = 56$  से  $56 \div 8 = 7$  या  $56 \div 7 = 8$  प्राप्त होता है।

यही हम बीजीय व्यंजकों के विभाजन (या भाग देने) के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरणार्थ,

$$(i) \quad 2x \times 3x^2 = 6x^3$$

$$\text{अतः} \quad 6x^3 \div 2x = 3x^2$$

$$\text{तथा साथ ही,} \quad 6x^3 \div 3x^2 = 2x$$

$$(ii) \quad 5x(x+4) = 5x^2 + 20x$$

$$\text{अतः} \quad (5x^2 + 20x) \div 5x = x + 4$$

$$\text{तथा साथ ही,} \quad (5x^2 + 20x) \div (x + 4) = 5x$$

अब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि एक व्यंजक को अन्य व्यंजक से किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभ करने के लिए, हम एक एकपदी (monomial) का एक अन्य एकपदी से विभाजन पर विचार करेंगे।

### 12.3.1 एकपदी का एक अन्य एकपदी से विभाजन

$6x^3 \div 2x$  पर विचार कीजिए।

हम  $2x$  और  $6x^3$  को अखंडनीय गुणनखंड रूपों में लिख सकते हैं :

$$2x = 2 \times x$$

$$6x^3 = 2 \times 3 \times x \times x \times x$$

अब हम  $2x$  को अलग करने के लिए,  $6x^3$  के गुणनखंडों के समूह बनाते हैं।

$$6x^3 = 2 \times x \times (3 \times x \times x) = (2x) \times (3x^2)$$

इस प्रकार,  $6x^3 \div 2x = 3x^2$

सार्व गुणनखंडों को निरस्त करने की एक संक्षिप्त विधि वह है जो हम संख्याओं के विभाजन में करते हैं।

$$\text{जैसे} \quad 77 \div 7 = \frac{77}{7} = \frac{7 \times 11}{7} = 11$$

$$\begin{aligned} \text{इसी प्रकार,} \quad 6x^3 \div 2x &= \frac{6x^3}{2x} \\ &= \frac{2 \times 3 \times x \times x \times x}{2 \times x} = 3 \times x \times x = 3x^2 \end{aligned}$$

**उदाहरण 13 :** निम्नलिखित विभाजन कीजिए :

$$(i) \quad -20x^4 \div 10x^2$$

$$(ii) \quad 7x^2y^2z^2 \div 14xyz$$

**हल :**

$$(i) \quad -20x^4 = -2 \times 2 \times 5 \times x \times x \times x \times x$$

$$10x^2 = 2 \times 5 \times x \times x$$

$$\text{अतः} \quad (-20x^4) \div 10x^2 = \frac{-2 \times 2 \times 5 \times x \times x \times x \times x}{2 \times 5 \times x \times x} = -2 \times x \times x = -2x^2$$

$$\begin{aligned} \text{(ii) } 7x^2y^2z^2 \div 14xyz &= \frac{7 \times x \times x \times y \times y \times z \times z}{2 \times 7 \times x \times y \times z} \\ &= \frac{x \times y \times z}{2} = \frac{1}{2}xyz \end{aligned}$$



### प्रयास कीजिए

भाग दीजिए :

(i)  $24xy^2z^3$  को  $6yz^2$  से

(ii)  $63a^2b^4c^6$  को  $7a^2b^2c^3$  से

### 12.3.2 एक बहुपद का एक एकपदी से विभाजन

आइए, एक त्रिपद (trinomial)  $4y^3 + 5y^2 + 6y$  का एकपदी  $2y$  से विभाजन पर विचार करें।

$$4y^3 + 5y^2 + 6y = (2 \times 2 \times y \times y \times y) + (5 \times y \times y) + (2 \times 3 \times y)$$

[यहाँ, हम बहुपद (polynomial) के प्रत्येक पद को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं।] हम पाते हैं कि  $2 \times y$  दो पदों में एक सार्व गुणनखंड है साथ ही, हम इसे तीसरे पद  $5y^2$  के लिए भी एक सार्व गुणनखंड के रूप में बदल सकते हैं। तब, हम प्राप्त करते हैं :

$$\begin{aligned} 4y^3 + 5y^2 + 6y &= 2 \times y \times (2 \times y \times y) + 2 \times y \times \left(\frac{5}{2} \times y\right) + 2 \times y \times 3 \\ &= 2y(2y^2) + 2y\left(\frac{5}{2}y\right) + 2y(3) \\ &= 2y\left(2y^2 + \frac{5}{2}y + 3\right) \quad (\text{सार्व गुणनखंड } 2y \text{ को अलग दर्शाया गया है}) \end{aligned}$$

अतः  $(4y^3 + 5y^2 + 6y) \div 2y$

$$= \frac{4y^3 + 5y^2 + 6y}{2y} = \frac{2y(2y^2 + \frac{5}{2}y + 3)}{2y} = 2y^2 + \frac{5}{2}y + 3$$

वैकल्पिक रूप में, हम त्रिपद के प्रत्येक पद को, निरस्तीकरण की विधि का प्रयोग करते हुए, उस एकपदी से भाग दे सकते थे :

यहाँ हम अंश में बहुपद के प्रत्येक पद को हर में एकपदी से भाग देते हैं।

$$\begin{aligned} (4y^3 + 5y^2 + 6y) \div 2y &= \frac{4y^3 + 5y^2 + 6y}{2y} \\ &= \frac{4y^3}{2y} + \frac{5y^2}{2y} + \frac{6y}{2y} = 2y^2 + \frac{5}{2}y + 3 \end{aligned}$$

**उदाहरण 14 :** उपरोक्त दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए,  $24(x^2yz + xy^2z + xyz^2)$  को  $8xyz$  से भाग दीजिए।

हल :  $24(x^2yz + xy^2z + xyz^2)$

$$\begin{aligned} &= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times [(x \times x \times y \times z) + (x \times y \times y \times z) + (x \times y \times z \times z)] \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times x \times y \times z \times (x + y + z) \quad (\text{सार्व गुणनखंड बाहर लेने पर}) \\ &= 8 \times 3 \times xyz \times (x + y + z) \end{aligned}$$

अतः  $24(x^2yz + xy^2z + xyz^2) \div 8xyz$

$$= \frac{8 \times 3 \times xyz \times (x + y + z)}{8 \times xyz} = 3 \times (x + y + z) = 3(x + y + z)$$



$$\begin{aligned} \text{वैकल्पिक रूप में } 24(x^2yz + xy^2z + xyz^2) \div 8xyz &= \frac{24x^2yz}{8xyz} + \frac{24xy^2z}{8xyz} + \frac{24xyz^2}{8xyz} \\ &= 3x + 3y + 3z = 3(x + y + z) \end{aligned}$$

## 12.4 बहुपद का बहुपद से विभाजन

- $(7x^2 + 14x) \div (x + 2)$  पर विचार कीजिए।

हर के साथ  $(7x^2 + 14x)$  के गुणनखंडों की जाँच एवं मिलान करने के लिए, पहले इसके गुणनखंड करेंगे।

$$\begin{aligned} 7x^2 + 14x &= (7 \times x \times x) + (2 \times 7 \times x) \\ &= 7 \times x \times (x + 2) = 7x(x + 2) \end{aligned}$$

$$\text{अब, } (7x^2 + 14x) \div (x + 2) = \frac{7x^2 + 14x}{x + 2}$$

$$= \frac{7x(x + 2)}{x + 2} = 7x \quad (\text{गुणनखंड } (x + 2) \text{ को काटने पर})$$

क्या यह अंश के प्रत्येक पद को हर में दिए द्विपद से भाग देने में कोई सहायता करेगा?

**उदाहरण 15 :**  $44(x^4 - 5x^3 - 24x^2)$  को  $11x(x - 8)$  से भाग दीजिए।

**हल :**  $44(x^4 - 5x^3 - 24x^2)$ , के गुणनखंड करने पर, हमें प्राप्त होता है :

$$44(x^4 - 5x^3 - 24x^2) = 2 \times 2 \times 11 \times x^2(x^2 - 5x - 24)$$

(कोष्ठक में से सार्व गुणनखंड  $x^2$  बाहर करने पर)

$$\begin{aligned} &= 2 \times 2 \times 11 \times x^2(x^2 - 8x + 3x - 24) \\ &= 2 \times 2 \times 11 \times x^2 [x(x - 8) + 3(x - 8)] \\ &= 2 \times 2 \times 11 \times x^2 (x - 8)(x + 3) \end{aligned}$$

अतः  $44(x^4 - 5x^3 - 24x^2) \div 11x(x - 8)$

$$\begin{aligned} &= \frac{2 \times 2 \times 11 \times x \times x \times (x + 3) \times (x - 8)}{11 \times x \times (x - 8)} \\ &= 2 \times 2 \times x(x + 3) = 4x(x + 3) \end{aligned}$$

**उदाहरण 16 :**  $z(5z^2 - 80)$  को  $5z(z + 4)$  से भाग दीजिए।

**हल :** भाज्य =  $z(5z^2 - 80)$   
 $= z[(5 \times z^2) - (5 \times 16)]$   
 $= z \times 5 \times (z^2 - 16)$   
 $= 5z \times (z + 4)(z - 4)$  [सर्वसमिका  $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$  को प्रयोग करने पर]

हम अंश और हर में से सार्व  
गुणनखंड 11,  $x$  और  $(x - 8)$   
को काट देते हैं।

इस प्रकार,  $z(5z^2 - 80) \div 5z(z + 4) = \frac{5z(z - 4)(z + 4)}{5z(z + 4)} = (z - 4)$

### प्रश्नावली 12.3



- निम्नलिखित विभाजन कीजिए :
  - $28x^4 \div 56x$
  - $-36y^3 \div 9y^2$
  - $66pq^2r^3 \div 11qr^2$
  - $34x^3y^3z^3 \div 51xy^2z^3$
  - $12a^8b^8 \div (-6a^6b^4)$
- दिए हुए बहुपद को दिए हुए एकपदी से भाग दीजिए :
  - $(5x^2 - 6x) \div 3x$
  - $(3y^8 - 4y^6 + 5y^4) \div y^4$
  - $8(x^3y^2z^2 + x^2y^3z^2 + x^2y^2z^3) \div 4x^2y^2z^2$
  - $(x^3 + 2x^2 + 3x) \div 2x$
  - $(p^3q^6 - p^6q^3) \div p^3q^3$
- निम्नलिखित विभाजन कीजिए :
  - $(10x - 25) \div 5$
  - $(10x - 25) \div (2x - 5)$
  - $10y(6y + 21) \div 5(2y + 7)$
  - $9x^2y^2(3z - 24) \div 27xy(z - 8)$
  - $96abc(3a - 12)(5b - 30) \div 144(a - 4)(b - 6)$
- निर्देशानुसार भाग दीजिए :
  - $5(2x + 1)(3x + 5) \div (2x + 1)$
  - $26xy(x + 5)(y - 4) \div 13x(y - 4)$
  - $52pqr(p + q)(q + r)(r + p) \div 104pq(q + r)(r + p)$
  - $20(y + 4)(y^2 + 5y + 3) \div 5(y + 4)$
  - $x(x + 1)(x + 2)(x + 3) \div x(x + 1)$
- व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए :
  - $(y^2 + 7y + 10) \div (y + 5)$
  - $(m^2 - 14m - 32) \div (m + 2)$
  - $(5p^2 - 25p + 20) \div (p - 1)$
  - $4yz(z^2 + 6z - 16) \div 2y(z + 8)$
  - $5pq(p^2 - q^2) \div 2p(p + q)$
  - $12xy(9x^2 - 16y^2) \div 4xy(3x + 4y)$
  - $39y^3(50y^2 - 98) \div 26y^2(5y + 7)$

### हमने क्या चर्चा की?

- जब हम किसी व्यंजक का गुणनखंड करते हैं, तो हम उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड, संख्याएँ, बीजीय चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं।
- एक अखंडनीय गुणनखंड वह गुणनखंड है जिसे और आगे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है।
- किसी व्यंजक का गुणनखंड करने की एक क्रमबद्ध विधि सार्व गुणनखंड विधि है। इस विधि के तीन चरण होते हैं : (i) व्यंजक के प्रत्येक पद को अखंडनीय गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। (ii) सार्व

गुणनखंडों का पता लगाइए और उन्हें अलग कर लीजिए। (iii) प्रत्येक पद में शेष गुणनखंडों को बंटन नियम के अनुसार संयोजित कीजिए।

4. कभी-कभी एक दिए हुए व्यंजक के सभी पदों में एक सार्व गुणनखंड नहीं होता है, परंतु इन पदों के कुछ समूह इस प्रकार बनाए जा सकते हैं कि प्रत्येक समूह के सभी पदों में एक सार्व गुणनखंड होता है। जब हम ऐसा करते हैं, तो सभी समूहों में एक सार्व गुणनखंड प्रकट हो जाता है, जिससे हम व्यंजक के गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। यह विधि पुनःसमूहन विधि कहलाती है।
5. पुनःसमूहन द्वारा गुणनखंडन में, यह याद रखना चाहिए कि व्यंजक के पदों के प्रत्येक पुनःसमूहन पुनःव्यवस्था से गुणनखंड प्राप्त नहीं होते हैं। हमें व्यंजक को देखना चाहिए तथा प्रयास और भूल-विधि से वांछित पुनःसमूहन प्राप्त करना चाहिए।
6. गुणनखंडन किए जा सकने वाले व्यंजकों में से अनेक  $a^2 + 2ab + b^2$ ,  $a^2 - 2ab + b^2$ ,  $a^2 - b^2$  और  $x^2 + (a + b)x + ab$  के रूप के होते हैं या उन्हें इस रूप में बदला जा सकता है। इन व्यंजकों के गुणनखंड अध्याय 9 में दी हुई निम्नलिखित सर्वसमिकाओं I, II, III और IV से ज्ञात किए जा सकते हैं :

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b).$$

7. उन व्यंजकों में, जिनके गुणनखंड  $(x + a)(x + b)$  के प्रकार के हैं, याद रखना चाहिए कि संख्यात्मक (अचर) पद से  $ab$  प्राप्त होता है। इसके गुणनखंडों  $a$  और  $b$  को इस प्रकार चुनना चाहिए कि चिह्न को ध्यान में रखते हुए, इनका योग  $x$  के गुणांक के बराबर हो।
8. हम जानते हैं कि संख्याओं की स्थिति में विभाजन, गुणा की प्रतिलोम संक्रिया होती है। यही बात बीजीय व्यंजकों के विभाजन के लिए भी लागू रहती है।
9. एक बहुपद को एक एकपदी से विभाजन की स्थिति में, हम या तो विभाजन, बहुपद के प्रत्येक पद को उस एकपदी से भाग देकर कर सकते हैं या सार्व गुणनखंड विधि से कर सकते हैं।
10. एक बहुपद को एक बहुपद से विभाजन की स्थिति में, हम भाज्य बहुपद के प्रत्येक पद को भाजक बहुपद से भाग देकर विभाजन नहीं कर सकते। इसके स्थान पर, हम प्रत्येक बहुपद के गुणनखंड करते हैं और इनमें सार्वगुणनखंडों को काट देते हैं।
11. इस अध्याय में पढ़े गए बीजीय व्यंजकों के विभाजनों की स्थिति से हमें  
भाज्य = भाजक  $\times$  भागफल प्राप्त होगा।  
परंतु व्यापक रूप में यह संबंध निम्नलिखित है :  
भाज्य = भाजक  $\times$  भागफल + शेषफल  
इस प्रकार, इस अध्याय में हमने केवल उन विभाजनों की चर्चा की है, जिनमें शेषफल शून्य है।



## नोट

© NCERT  
not to be republished